SERIE FAUNA SILVESTRE NEOTROPICAL

V. BIODIVERSIDAD DE LA SIERRA
DE LA MACARENA, META, COLOMBIA.
Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada
y bajo Duda

Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt e Iván D. Escobar-Martínez
(Editores)

MINAMBIENTE

SERIE FAUNA SILVESTRE NEOTROPICAL

V. BIODIVERSIDAD DE LA SIERRA
DE LA MACARENA, META, COLOMBIA.
Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada
y bajo Duda

Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt e Iván D. Escobar-Martínez
(Editores)

© Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena 2018.

Los textos pueden ser citados total o parcialmente citando la fuente.

SERIE EDITORIAL FAUNA SILVESTRE NEOTROPICAL

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Editor: Carlos A. Lasso.

Revisión científica: Josefa C. Señaris y Antonio Machado-Allison.

Revisión de textos: Carlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt.

Fotos portada: Ivan Mikolji, Federico Mosquera-Guerra.

Foto contraportada: Federico Mosquera-Guerra.

Foto portada interior: Jorge E. García-Melo.

Diseño y diagramación: JAVEGRAF-Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas

Impresión: JAVEGRAF-Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas.
700 ejemplares.

CITACIÓN SUGERIDA:

Obra completa: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). 2018. *V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 329 pp.

Capítulos: Núñez-Avellaneda, M. y F. Perdomo. 2018. Ficoperifiton de los ecosistemas acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta. Pp. 83-95. *En:* Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). *V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda / editado por Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt e Iván D. Escobar-Martínez; Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical, V – Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018.

329 p.: il., col.; 16.5 x 24 cm.
Incluye mapas, tablas y fotografías a color

ISBN obra impresa: 978-958-5418-53-0
ISBN obra digital: 978-958-5418-54-7
doi: 10.21068/a2018n02

1. Fauna – Sierra de La Macarena -- Colombia 2. Región Orinoquia– Sierra de La Macarena -- Colombia, 3. Sierra de La Macarena – Meta -- Colombia 4. Región Amazonia– Sierra de La Macarena -- Colombia 5. Macroinvertebrados acuáticos 6. Peces 7. Anfibios 8. Reptiles 9. Aves. 10. Mamíferos I. Lasso, Carlos A. (Ed) II. Morales-Betancourt, Monica A. (Ed) III. Escobar-Martínez, I. D. (Ed) IV. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

CDD: 333.95098619 Ed. 23
Número de contribución: 574
Registro en el catálogo Humboldt: 15013

CEP – Biblioteca Francisco Matis, Instituto Alexander von Humboldt -- Nicolás Gómez

Responsabilidad. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión o juicio alguno por parte del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Así mismo, las opiniones expresadas no representan necesariamente las decisiones o políticas del Instituto. Todos los aportes y opiniones expresadas son de la entera responsabilidad de los autores correspondientes.

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA-CORMACARENA**

BELTSY G. BARRERA MURILLO
Directora General

IVAN DARÍO ESCOBAR-MARTÍNEZ
Supervisor del Convenio

JAVIER FRANCISCO PARRA
Coordinador La Macarena

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT**

BRIGITTE BAPTISTE
Directora General

HERNANDO GARCÍA
Subdirector de Investigaciones

CAROLINA GÓMEZ
Coordinadora
Programa Ciencias de la Biodiversidad

CARLOS A. LASSO
Supervisor del Convenio y Coordinación Científica
Programa Ciencias de la Biodiversidad – Línea de recursos
hidrobiológicos, pesqueros continentales y fauna silvestre

Resultados parciales de los Convenios de Cooperación suscritos entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena-Cormacarena (N° 18-096 y 17-194 Instituto Humboldt) y PE.GDE. 1.4.8.1.18.014 del 2018 y PE.GDE. 1.4.7.17.030 del 2017 Cormacarena), correspondientes a la “Evaluación de la biodiversidad acuática del río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta. Fases I y II”.

Río Guayabero, Cajón del Raudal de Agosturas I. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Comité científico

- Andrés Link (Universidad de los Andes, Colombia)
- Carlos Castaño-Urbe (Fundación Herencia Ambiental Caribe, Colombia)
- Emiliano Ramalho (Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua, Brasil)
- Esteban Payan-Garrido (Fundación Panthera, Colombia)
- Fernando Trujillo (Fundación Omacha, Colombia)
- Hugo López (Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales)
- Isaac Goldstein (Wildlife Conservation Society, Andean Bear Conservation Program)
- Jhon Lynch (Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales)
- Jon Paul Rodríguez (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas & UICN)
- José Vicente Rodríguez (Conservación Internacional, Colombia)
- Josefa Celsa Señaris (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas)
- Galo Zapata-Ríos (Wildlife Conservation Society, Ecuador)
- Giovanni Ulloa (Asocaiman, Colombia)
- Luis German Naranjo (WWF Colombia)
- Manuel Ruiz García (Departamento de Biología, Unidad de Genética Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
- Mariela Superina (IUCN/SSC Anteater, Sloth & Armadillo Specialist Group & IMBECU-CCT Conicet, Mendoza, Argentina)
- Michael Valqui Haase (Centro para la Sostenibilidad Ambiental, Universidad Peruana Cayetano Heredia)
- Nathaly van Vliet (Center for International Forestry Research, CIFOR)
- Olga Montenegro (Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales)
- Rafael Hoogestein (Fundación Panthera, Brasil)
- Roger Pérez-Hernandez (Universidad Central de Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical)
- Salvador Boher (Instituto Experimental Jardín Botánico “Dr. Tobías Lasser” & Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Universidad Central de Venezuela)
- Tula Fang (Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre en América Latina-COMFAUNA)
- Wendy Townsend (Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida, Gainesville FL, USA & Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, Bolivia)

Boana punctata. Foto: Andrés R. Acosta-Galvis.

Tabla de contenido

Prólogo	11
Presentación	15
Participantes, autores y afiliaciones	19
Agradecimientos	23
Resumen ejecutivo	27
Executive summary	31
Introducción	35
Monica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso	
<hr/>	
CAPÍTULO 1	
Área de estudio: Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, Meta, Colombia	39
Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso y Lina M. Mesa S.	
<hr/>	
CAPÍTULO 2	
Limnología de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia	63
Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Cristian Granados-Martínez y Marcela Núñez-Avellaneda	
<hr/>	
CAPÍTULO 3	
Ficoperifiton de los ecosistemas acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia	83
Marcela Núñez-Avellaneda y Felipe Perdomo	
<hr/>	
CAPÍTULO 4	
Macroinvertebrados acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia	97
Cristian Granados-Martínez, Carlos A. Lasso, Marcela Núñez-Avellaneda y Monica A. Morales-Betancourt	
<hr/>	
CAPÍTULO 5	
Peces de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia	121
Carlos DoNascimento, Lina M. Mesa S., Juan G. Albornoz-Garzón, Alejandro Méndez-López, Carlos A. Lasso, Jorge E. García-Melo, Mark H. Sabaj y Mónica A. Morales-Betancourt	

Tabla de contenido

CAPÍTULO 6 Anfibios y reptiles de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia Andrés R. Acosta-Galvis, Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso, Duberney Rayo, Juan Carlos Lomelín y Andrés Lomelín	179
CAPÍTULO 7 Aves del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, con énfasis en los ríos Guayabero medio (sector Raudal de Angosturas I), bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Andrés M. Cuervo, Andrés Lomelín y Juan de la Cruz Amado	211
CAPÍTULO 8 Algas epifitas asociadas a <i>Macarenia clavigera</i> P. Royen, en Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia Sara G. Rodríguez Álvarez, Jhon Ch. Donato-Rondón, María I. Castro-Rebolledo	263
CAPÍTULO 9 Interacciones entre crocodilianos y humanos en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia Rafael A. Moreno-Arias, Nidia Farfán-Ardila y María C. Ardila-Robayo†	273
CAPÍTULO 10 Aspectos poblacionales y biogeográficos de la tonina o delfín de río, <i>Inia geoffrensis humboldtiana</i> Pilleri & Gihl, 1978 (Cetartiodactyla, Iniidae) en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia Federico Mosquera-Guerra, Fernando Trujillo, Carlos A. Parra Sandoval, Juan D. Carvajal-Castro y Hugo Mantilla-Meluk	289
CAPÍTULO 11 Abundancia de primates diurnos y otros elementos de fauna en el Parque Nacional Tinigua, sierra de La Macarena, Meta, Colombia: comparación de métodos y variación anual en los años 1990 Pablo R. Stevenson	307

Morichal, Ciudad Perdida. Foto: Carlos A. Lasso.

Prólogo

LA MACARENA Y SUS ALREDEDORES HOY

En este libro los grupos de investigación del Instituto Humboldt y otros aliados del Sistema Nacional Ambiental, academia, ONG y la comunidad, revelan cómo se encuentra hoy, después de setenta años de guerra, La Macarena, tal vez el conjunto de ecosistemas más emblemático de la discusión ambiental en Colombia y también el sitio en donde el conflicto armado entre el Estado y las FARC tuvo características más sobresalientes. Como ha sucedido en estos meses en otros ecosistemas colombianos, el Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua y fuerte, ha permitido que los científicos regresen al campo y tengan la tranquilidad y el tiempo necesarios para realizar sus muestreos siguiendo las metodologías adecuadas.

Luego de la primera gran expedición que mostró la importancia ecológica mundial de la Sierra, realizada en la década de 1940, se realizaron uno o dos proyectos específicos de investigación de especies seleccionadas, también se hicieron esfuerzos sobresalientes de reinterpretación del conjunto, como el realizado por el mono Hernández y se efectuaron unas cuantas inspecciones rápidas de la situación ambiental, como la que realizamos con Alfredo Molano y Darío Fajardo en 1989, pero hacía falta un esfuerzo integrado que diera cuenta del estado actual del sistema.

En mi libro “Que es Ambientalismo”, “La Visión Ambiental Compleja”, propongo que los que nos llamamos ambientalistas vemos el mundo siguiendo unas formas de mirar que son muy específicas: verlo amplia y profundamente, ver interacciones, ver su pasado y su presente, ver con un deber ser en la mente y ver la otredad con respeto. En otro libro titulado “Colombia Compleja”, editado por el Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Humboldt, desarrollo esa idea; llamo la atención acerca de la existencia,

en lo que llamamos La Macarena, de cuatro sistemas ambientales: el piedemonte sur, la llanura orinoquense, la selva amazónica-orinoquense y el piedemonte norte, todos de diferente complejidad, y sintetizo algunas de las interrelaciones que han caracterizado esos sistemas, especialmente los papeles que las características físico bióticas de los piedemontes, la selva y las llanuras, desempeñaron durante ambas guerras, la de los partidos y la de las FARC, y sus influencias en el crecimiento de la ganadería y en la invasión del narcotráfico.

En este nuevo libro del Humboldt encuentro que sus autores han avanzado en las formas de ver el mundo que caracterizan a los ambientalistas, en verlo amplia y profundamente, ver pasado y presente y ver las interrelaciones. Para esto han escogido el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, que fue establecida en 1989 como respuesta del INDERENA a la situación de modificación acelerada de las áreas planas, debido a las circunstancias socioeconómicas y políticas que afrontaba toda la región. El sur de la AMEM, objeto de este libro, se caracteriza por la presencia de tres grandes ríos, el Guayabero, el Duda y el Losada, que descienden desde la cordillera oriental; los tres bordean al sur la sierra, conformando lo que se llama en el libro la Sierra de la Macarena. En esta región, fue donde se trataron de instalar los colonos que huyeron desde el Sumapaz en la década de 1950, en donde fue más estable la presencia de las FARC casi desde su fundación y también fue esa el área que los paramilitares y el ejército nacional trataron de controlar varias veces durante los últimos años, así como la que es hoy escenario de nuevos enfrentamientos con los grupos disidentes. Por todo lo anterior, los resultados de las últimas investigaciones del Humboldt revisten de especial importancia, muestran algo que antes no habíamos percibido: la enorme resiliencia de

áreas recientemente deforestadas y sujetas a situaciones agudas de conflicto.

Evidentemente esa resiliencia se prueba en los resultados de casi todas las investigaciones realizadas. Se percibe en detalle y en profundidad en el primer inventario de microalgas que realiza el Instituto de Investigaciones Amazónicas Sinchi e introduce al Humboldt, en la diversidad de especies de macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios y aves encontradas, y también en el análisis de estudios anteriores como los de primates, delfines, la *Macarenia clavigera* y la descripción de las interrelaciones entre humanos y cocodrilidos, ejemplo de estudio ambiental que establece hitos para futuros análisis acerca de lo que sucedió en nuestro territorio en estos años terribles. En todos los estudios se comprueba que afortunadamente las circunstancias socioeconómicas y políticas que condujeron a la deforestación casi completa, no fueron suficientes para destruir la biodiversidad de la zona: se identifican hoy 245 especies de peces, de las cuales 12 es posible que sean nuevas para la ciencia y 22 especies endémicas; 34 especies de anfibios, 52 de reptiles y 737 de aves.

¿Cómo ha sido esto posible? Uno de los estudios afirma que la fauna que podría considerarse amazónica solo se encuentra en los espacios relativamente pequeños de selva que han dejado los colonos en algunos sitios, lo cual podría dar lugar a considerar

que en este paisaje de mosaico sin continuidades vegetales, fruto de la actividad ganadera y agrícola en pequeña y mediana escala, todavía permanece parte de la biodiversidad que hizo famosa a la región y que el resultado podría considerarse como un éxito de los conceptos de Área de Manejo Especial y Distritos de Manejo Integrado, innovaciones del Decreto 2811 de 1974 que aceptan la posibilidad de convivencia de actividades económicas y sociales con la conservación de los ecosistemas. Algunos de los datos que trae la investigación, como la cantidad de especies de aves y peces observadas y la calidad de las aguas, podrían apoyar esta aseveración que por su importancia requeriría, para fundamentar cambios en las políticas de protección, la realización de muchas más expediciones del Humboldt en otros lugares.

Muchas conclusiones adicionales, como la enorme importancia de la presencia de ríos como el Losada, el Duda y el Guayabero en la resiliencia de toda el área, podrán extraerse de una lectura más detallada e ilustrada de la que he logrado hacer y por eso, para finalizar, hago una invitación entusiasta a leer este libro. Creo que todos los colombianos interesados en saber que nos resta de nuestra famosa biodiversidad, encontrarán aquí respuestas interesantes.

Julio Carrizosa Umaña
Bogotá, noviembre 2018

Mapaná de agua (*Helicops angulatus*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Pez cuchillo (*Apteronotus magoi*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Presentación

La complejidad ecosistémica que encierra el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, y en específico la sierra de La Macarena, es dada por la concentración de diversidad al interrelacionarse los sistemas andinos y el complejo amazónico-orinoquense de Colombia.

Es así, que desde la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena, hemos considerado realizar una evaluación biológica de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, para lo cual se han aunado esfuerzos con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que permita generar el conocimiento de las especies identificadas, de las aún desconocidas y sus interacciones con el medio natural, tal que den las líneas para estructurar procesos de planificación entorno a su recuperación, preservación, aprovechamiento sostenible y control.

El ejercicio realizado se orientó a la caracterización en la parte alta de la cuenca del Guaviare, que incluye las subcuencas de los ríos Guayabero, Losada y Duda a partir de una evaluación rápida de microalgas, macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles y aves; referenciando las dos estaciones climáticas (época de sequía y de

lluvias). Así, dentro de los resultados compilados en esta publicación evidenciamos que se lograron identificar muchísimas especies, algunas de ellas nuevas ampliaciones de distribución geográfica, otras nuevas para Colombia e incluso nuevas para la ciencia. Algunas de estas son también endémicas del país y en especial del AMEM.

En definitiva estos resultados confirman que el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM sigue siendo un área inexplorada a pesar de los acercamientos a través de procesos de investigación científica, y que con ellos se reafirma que allí se concentran tipologías únicas en biodiversidad de fauna y flora, que requieren de una gestión para su conservación.

Para la Corporación, es importante que se dé la difusión de los resultados obtenidos en esta exploración científica a una de las joyas naturales del departamento y del país, como lo es el AMEM; y que a partir de estos se logren procesos de articulación institucional y comunitaria para contribuir a conservarla y darle un uso sostenible. “...Porque solo se preserva lo que se conoce y valora...”.

Beltsy Barrera / Directora
Cormacarena

La sierra de La Macarena representa desde el punto de vista biológico una región de gran interés, por constituir una de las últimas fronteras de la exploración científica en la Orinoquia y la Amazonia colombiana. Así mismo, es el único corredor biológico natural que conecta el sistema Andino y el complejo Amazónico-Orinoquense en el país. Por ello, en este sistema y en las áreas adyacentes dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, encontramos especies de flora y fauna andinas, llaneras, guayanesas y amazónicas. Aun así, y a pesar de esta extraordinaria riqueza dentro de este crisol de la biodiversidad tropical, el conocimiento de la región era exiguo, por no decir que prácticamente inexistente. Las expediciones contadas a la región, realizadas a mediados del siglo pasado, y tan solo unos pocos esfuerzos puntuales posteriores de algunas instituciones como el propio Indereña, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, entre las más representativas, dan cuenta de ello.

Es por esta razón, que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, unieron esfuerzos desde el 2016, para iniciar los estudios biológicos imprescindibles para un manejo y conservación adecuado de los ecosistemas y especies del AMEM y la Sierra. Así, en 2017 publicamos el primer libro de la Serie, relativo a la Fauna silvestre de Caño Cristales, lugar emblemático de La Macarena y sostén económico del Municipio, como un elemento de desarrollo y apoyo a las comunidades locales que vieron

en el ecoturismo una posibilidad de convivencia en paz hacia el futuro. En aquel momento las condiciones estaban dadas: se llegaba a los acuerdos de paz con las FARC, la comunidad estaba animada, el turismo era cada vez mayor y la economía local crecía. Todos estos factores nos alentaron a seguir investigando y acceder a regiones remotas antes “prohibidas” para las investigaciones científicas u otras actividades del llamado desarrollo. De esta manera, pasamos a implementar una segunda fase con unos objetivos más ambiciosos: llegar a la confluencia de los ríos Duda y Guayabero y estudiar la biodiversidad de un área que había permanecido oculta ante nuestros ojos. Esto lo complementamos también con el trabajo en el río Losada, otro afluente del río Guayabero, que tantos servicios ecosistémicos brinda al departamento del Meta y en especial a la población de La Macarena.

Nuestros investigadores, especialistas de varias disciplinas de las ciencias naturales, junto con la población local y miembros de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales, estudiaron los peces, moluscos, crustáceos, otros macroinvertebrados acuáticos -hasta esponjas de agua dulce-, los anfibios, reptiles y aves. Las dos expediciones realizadas en la época seca y de lluvias del 2018 y recogidas en este libro, fueron complementadas con cuatro estudios de caso relativos a investigaciones realizadas previamente en la región por otras organizaciones aliadas. Así, se reunieron 27 investigadores de 15 instituciones, incluidos institutos de investigación, universidades, ONG, PNN y Cormacarena, más nueve guías locales que participaron en todo el proceso de evaluación y entrena-

miento en campo para el estudio de la biodiversidad. Los resultados fueron elocuentes, con muchos registros biológicos nuevos para la sierra de La Macarena, el departamento del Meta, la Orinoquia y Amazonia, Colombia e incluso en algunos casos, para la ciencia.

Toda esta documentación técnica que mostramos en este libro, va acompañada de información didáctica y pedagógica (afiches, plegable y fotos) sobre la biodiversidad regional (peces, macroinvertebrados acuáticos, anfibios, reptiles, aves y algunos mamíferos) y los diferentes paisajes o ecosistemas de La Macarena, dirigida no solo a un público científico, sino a la sociedad en general y especialmente a la comunidad local, incluyendo por su puesto a las instituciones

educativas, operadores, guías turísticos y autoridades locales. Esperamos que esta nueva contribución sea un paso más en el largo camino que aún nos queda por recorrer para conocer, conservar y utilizar de manera racional y sostenible, la biodiversidad y los servicios que prestan estos ecosistemas, bajo escenarios actuales muy preocupantes por la amenaza creciente de la deforestación en estos confines de la Amazonia y Orinoquia colombiana.

Brigitte Baptiste / Directora General
Carlos A. Lasso / Coordinador
Científico/ Editor

Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt

Danta (*Tapirus terrestris*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Participantes, autores y afiliaciones

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena- Cormacarena

Carlos Alberto Parra Sandoval
Camilo Prada
Felipe Perdomo

Iván D. Escobar-Martínez
ivan.escobar@cormacarena.gov.co

Drexel University, EEUU

Mark H. Sabaj
mhs58@drexel.edu

Fundación Omacha

Fernando Trujillo
fernando@omacha.org.co

Fundación Omacha- Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología, Grupo de Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas-ECOLMOD

Federico Mosquera-Guerra
federico.mosqueraguerra@gmail.com

Guías locales, municipio La Macarena (veredas Boca del Duda y Los Alpes)

Antonio Loaiza
Andrés Lomelín
Darwin Bocanegra
Enith Polanco
Eugenio Lomelín
José Jair Ibarra
Juan Carlos Lomelín
Juan de La Cruz Amado
Ramiro Montealegre

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi

Grupo Ecosistemas Acuáticos
Marcela Núñez-Avellaneda
mnunez@sinchi.org.co

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Subdirección de Investigación Colecciones Biológicas

Alejandro Méndez-López
amendez@humboldt.org.co

Andrés R. Acosta-Galvis
aacosta@humboldt.org.co

Andrés Cuervo
acuervo@humboldt.org.co

Carlos DoNascimento
cdonascimento@humboldt.org.co

Juan Gabriel Albornoz-Garzón
jalbornoz@humboldt.org.co

Programa Ciencias de la Biodiversidad Línea de recursos hidrobiológicos, pesqueros continentales y fauna silvestre

Carlos A. Lasso
classo@humboldt.org.co

Lina M. Mesa S.
lmesa@humboldt.org.co

Monica A. Morales-Betancourt
mmorales@humboldt.org.co

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt / Universidad del Quindío Programa de Biología Juan David Carvajal-Castro

Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena

Duberney Rayo
duberneyrayolopez@gmail.com

Participantes, autores y afiliaciones

Universidad de La Guajira

Cristian E. Granados-Martínez
biolocristiam@gmail.com

Universidad de Los Andes

Departamento de Ciencias Biológicas
Pablo R. Stevenson
pstevens@uniandes.edu.co

Universidad del Quindío

Programa de Biología
Hugo Mantilla-Meluk
hugo.mantillameluk@gmail.com

Universidad del Tolima, Universidad de

Ibague & Biophotonature

Jorge E. García-Melo
jegarcia@ut.edu.co

Universidad de La Salle

Departamento de Ciencias Básicas
Biología
María Isabel Castro-Rebolledo
micastro@unisalle.edu.co

Sara Giuliana Rodríguez-Álvarez
saragrodriguez21@unisalle.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Instituto de Ciencias Naturales
María Cristina Ardila-Robayo†
Nidia Farfán-Ardila
nfarfanardila@gmail.com

Instituto de Ciencias Naturales,
Grupo de Biodiversidad y Sistemática
Molecular

Rafael A. Moreno-Arias
rafamorearias@gmail.com

Departamento de Biología,
Laboratorio de Diatomeas
Jhon Charles Donato-Rondón
jcdonator@unal.edu.co

Río Guayabero, Raudal de Angosturas I. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Cachivera, río Guayabero. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Agradecimientos

Los editores agradecen a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena, especialmente a la Directora Beltsy G. Barrera Murillo por su entusiasmo en la realización de este proyecto. A todo el personal de la Corporación en La Macarena, especialmente a Francisco Parra, Felipe Perdomo y Camilo Prada por su colaboración y apoyo logístico. A los Parques Nacionales Narturales Tinigua (Maria Teresa Sierra) y La Macarena (Olga L. Ruíz), por su apoyo y participación.

A la Directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste, a Ricardo Carrillo y a la Junta Directiva del Instituto Humboldt, por haber respaldado la elaboración de este proyecto en el marco del Plan Operativo Anual 2017-2018 del Programa de Ciencias de la Biodiversidad (Línea de recursos hidrobiológicos, pesqueros continentales y fauna silvestre).

A la Cooperativa Ecoamen (José Sánchez y Eludivia Sánchez), a los habitantes de la vereda Bocas del Duda, José Jair Ibarra, Enith Polanco y Ramiro Montealegre, y de La Macarena, Juan Carlos Lomelín, Eugenio Lomelín, Antonio Loaiza, Andrés F. Lomelín, Darwin Bocanegra y Juan de La Cruz Amado, por su acompañamiento en campo y apoyo logístico. A Ecoturismo La Macarena por su colaboración en el transporte aéreo y envío de carga.

A los investigadores que cedieron sus fotografías para la elaboración del catálogo de especies de los diferentes grupos: Angélica Díaz-Pulido, Astrid Acosta, Aniello Barbarino, Arnaldo Ferrer, Germán Galvis, Juan Carlos Alonso, Camila Duran-Prieto, Fernando Rojas-Runjaic, Lucas S. Barrientos, Sergio Losada, Elkin Tenorio e Ivan Mikolji. Al Banco de Imágenes Ambientales (BIA) del Instituto Humboldt, por su colaboración en la búsqueda del material fotográfico, en

el que se incluyó fotografías de Francisco Nieto, Tatiana Hernández, Lina Ortiz, Mayra Villanueva, José Mauricio Salcedo y Sebastián Krieger.

A Donald Taphorn por sus traducciones al inglés.

Los autores del **Capítulo 1** agradecen a Diego Córdoba y María Fernanda Batista del Instituto Humboldt y Lina Correa, por su apoyo y asesoría en la construcción de los mapas. A Edwin Tamayo y Bryan Ramírez del Instituto Humboldt, por la gestión de la información ante el Ideam (bases de datos hidrológicos de La Macarena).

Los autores del **Capítulo 4** agradecen a Martha Campos y Edgar Linares del ICN-Unal, por su colaboración en la identificación de los cangrejos y moluscos, respectivamente.

Los autores del **Capítulo 7** agradecen a Sergio Losada-Prado y Cristian Gaitán por los comentarios, aportes bibliográficos, bases de datos, identificación de especies y revisión del listado taxonómico de las aves.

Los autores del **Capítulo 8** agradecen al Instituto Humboldt, por apoyar la Expedición a Caño Cristales. Al Instituto Catalán de Investigación del Agua – ICRA- (Girona), profesor Sergi Sabater, por el apoyo en las sesiones de microscopía electrónica.

Los autores del **Capítulo 9** agradecen a los funcionarios de la Defensa Civil del municipio de la Macarena, especialmente a Oscar Díaz, Omar Muñoz y Julián Quintero, por el apoyo logístico y el transporte en el río Guayabero, así como por el acompañamiento durante el trabajo de campo. A Darío Morales por su acompañamiento durante el trabajo de campo en el río Losada. Este trabajo fue realizado bajo el convenio de asociación “*Implementación de acciones prioritarias para el manejo y conservación del caimán llanero en el departamento del Meta PE.GDE.1.4.7.1.16-014 de 2016*”, suscrito

Agradecimientos

entre la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena-Cormacarena.

Los autores del **Capítulo 10** agradecen al Instituto Humboldt, Fundación Omacha, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena-Cormacarena, Parques Nacionales Naturales, Colciencias a través de la Beca Doctorados Nacionales Convocatoria 785, a las comunidades locales, y a los editores y revisores por sus valiosos aportes y comentarios que permitieron mejorar este manuscrito. A Carlos A. Lasso por haber conformado este equipo de investigación y liderado la construcción de la presente publicación.

El autor del **Capítulo 11** agradece a Marcela J. Quiñones, Jorge A. Ahumada, María Clara Castellanos, Andrés Link y Alicia Medina, por momentos muy especiales compartidos en campo. A los profesores Kosei Izawa, Akisato Nishimura, Koshin

Kimura y Carlos Mejía por su autorización para trabajar en las estaciones del CIEM. Al Ministerio del Medio Ambiente por los permisos para trabajar en el PNN Tinigua. También agradece a su padres por su apoyo durante todos esos años de trabajo en condiciones difíciles. A los colegas y amigos que aportaron sus fotos de la fauna del Parque Tinigua, en particular a Sasha Cárdenas, Marcela Santamaría, Nancy Flechas y Sofía Argüello. Este estudio fue posible gracias a la financiación que varias instituciones dieron para el estudio de los primates (Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de La República, Primate Conservation, Lincoln Park Zoo, Margot Marsh Foundation, Idea Wild y Colciencias). El apoyo de la Universidad de Los Andes fue fundamental para sacar tiempo la información, analizar y publicar los datos. A Christian Medina del Laboratorio de Cartografía (Universidad de los Andes), por la elaboración del mapa de área de estudio.

Cahirre (*Paleosuchus trigonatus*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Caño Temblón, afluente del río Guayabero. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Resumen ejecutivo

Carlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt

La región suroriental de la sierra de La Macarena-SLM, municipio de La Macarena, departamento del Meta, Colombia, es un área de gran importancia biológica, ecológica y biogeográfica, pues en ella confluyen elementos bióticos de los Andes, Amazonas y Orinoco (Llanos y Escudo Guayanés). Se encuentra dentro de lo que se ha definido con fines de manejo y conservación, como el Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM. En ejercicios previos de planificación ambiental del territorio, definición, nominación y priorización de áreas para la conservación, la SLM ha sido priorizada por su interés biogeográfico y por las presiones de las cuales es objeto. A pesar de este hecho, no existía una línea base sólida sobre el conocimiento de la biodiversidad de la región. Así, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, decidieron aunar esfuerzos para realizar la evaluación biológica de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, lo que permitirá avanzar en el conocimiento de la biodiversidad y de esta forma planificar adecuadamente la conservación y manejo de los recursos biológicos en esta importante región del departamento del Meta (Convenio N° 17-194 Instituto Humboldt y PE GDE 1.4.7.17.030 de 2017 Cormacarena).

Para dar cumplimiento al convenio se realizó entonces una evaluación rápida de la biodiversidad en la parte alta de la cuenca del río Guaviare, que incluyó las subcuencas de los ríos Guayabero, Losada y Duda, durante dos estaciones climáticas en 2018: época de aguas bajas o sequía (febrero) y aguas altas o lluvias (junio-julio). Para ello se utilizaron diferentes metodologías adaptadas a cada uno de los macrohábitats acuáticos, ecosistemas terrestres y grupos biológicos considerados

(microalgas, macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles y aves). Los tres ríos estudiados, tienen origen andino (Guayabero, Losada y Duda) y también se incluyeron varios tributarios provenientes de la Sierra, con características oligotróficas (pobreza de nutrientes) típicos del Escudo Guayanés. Los resultados de estas evaluaciones fueron complementados con un análisis detallado del componente abiótico del área de estudio (geología, climatología, limnología, etc.), información secundaria y otros casos de estudio particulares: algas epifitas asociadas a *Macarenia clavigera* en Caño Cristales; interacción entre cocodrilos y humanos; población y biogeografía de la tonina o delfín de río, *Inia geoffrensis humboldtiana* y por último, un estudio sobre la abundancia de primates y otros grandes vertebrados -aves y mamíferos- en el Parque Nacional Tinigua.

La investigación sobre las **microalgas** del fycopertifiton, representa el primer trabajo de ese tipo para la SLM, identificando 66 morfoespecies incluidas en 11 clases taxonómicas, 30 familias y 53 géneros. La mayor riqueza de morfoespecies correspondió a las diatomeas de dos clases: Fragillariophyceae, géneros *Ulnaria* y *Synedra* y Bacillariophyceae, género *Encyonema*, así como a las desmidiáceas de los géneros *Cosmarium* y *Closterium*. Las especies identificadas y la información fisicoquímica, reflejan el carácter oligotrófico o de baja mineralización de estos ecosistemas acuáticos de la SLM.

Respecto a los **macroinvertebrados acuáticos** (insectos acuáticos, moluscos y crustáceos), se identificaron 114 taxones. Los órdenes con mayor representación fueron Trichoptera, Diptera y Decapoda y los taxones con mayor abundancia relativa fueron Smicridea, Orthocladinae y el camarón *Macrobrachium amazonicum*. La mayoría de los taxones identificados son indicadores

de buenas condiciones del agua, lo cual es un reflejo del buen estado de conservación que presentan los ríos asociados a la SLM.

Se registraron 245 especies de **peces**, distribuidas en nueve órdenes, de los cuales los Characiformes (sardinias de río, tetras, pirañas, bocachicos, etc.) fueron el grupo mejor representado (46,5%), seguido por los Siluriformes (bagres), con 39,2%. Se reconocen 12 especies probablemente nuevas para la ciencia, cinco nuevos registros para Colombia, diez registros nuevos para la cuenca del Orinoco, 22 especies endémicas de Colombia y 45 especies con valor para el consumo. Para este último grupo, es necesario desarrollar estudios biológicos, ecológicos y pesqueros de las especies objeto de aprovechamiento comercial (pesca artesanal de consumo, ornamental y deportiva), a fin de implementar planes de conservación y manejo. Particularmente, son de especial interés por su uso en la zona, el bagre amarillo (*Zungaro zungaro*) y la payara (*Hydrolicus armatus*), que son objeto de una fuerte presión pesquera. Hay un potencial elevado de especies de interés ornamental, lo cual podría ser una alternativa económica para las poblaciones locales, siempre y cuando su aprovechamiento se haga de manera sostenible. Deben desarrollarse programas de monitoreo pesquero donde participen directamente los actores locales, previo diagnóstico de la pesca comercial y deportiva, con miras a su ordenamiento.

En relación a la herpetofauna, se listan 39 especies de **anfibios** y 68 **reptiles**. Se confirma la presencia de especies recientemente descritas para las zonas selváticas al norte de la SLM, como la rana *Boana maculateralis*, además de varias ampliaciones de distribución geográfica. Se evidencia como los procesos de deforestación han facilitado la entrada de especies típicamente llaneras (orinoquenses), como *Rhinella beebei*, *Scinax wandae*, *Boana xerophylla*, mientras que las especies amazónicas se encuentran restringidas a parches boscosos, especialmente en la cuenca del río Losada. En cuanto a los reptiles se registran tres especies amenazadas, la tortuga terecay (*Podocnemis*

unifilis), el morrocoy (*Chelonoidis carbonarius*) y el caimán llanero (*Crocodylus intermedius*). También es importante mencionar el registro de la tortuga miona (*Mesoclemmys gibba*), una especie categorizada como datos insuficientes-DD. Esta información es de suma importancia ya que aporta elementos técnicos al plan de conservación de tortugas del departamento del Meta que no contaba con datos sobre la SLM.

Para el AMEM se registran 737 especies de **aves** agrupadas en 530 géneros, 71 familias y 27 órdenes. Entre los hallazgos más notables están ampliaciones significativas de la distribución geográfica o grabación de audios de especies muy poco conocidas en Colombia como *Picumnus ruficeps* (Picidae, carpintero telegrafista), *Hylophylax punctulatus* (Thamnophilidae, homiguero punteado), *Schiffornis major* (Tityridae), *Tolmomyias traylori* (Tyrannidae) y *Hemitriccus striatocollis* (Tyrannidae). Se concluye que el AMEM es una de las regiones con mayor riqueza de aves en Colombia, lo cual amerita un estudio más profundo por parte de ornitólogos e instituciones responsables de la conservación en Colombia.

Los resultados de las evaluaciones biológicas o expediciones realizadas durante el 2018, se complementan con cuatro casos de estudio realizados dentro del AMEM y en particular en la SLM, incluyendo datos sobre los dos parques nacionales (Sierra de La Macarena y Tinigua), así como de los ríos Duda, Guayabero y Losada.

El primer caso de estudio describe la composición y la distribución de las comunidades de **algas del epifiton**, asociadas a una especie clave de la Sierra y en particular de Caño Cristales: *Macarenia clavigera*. Se identificaron 20 especies de 13 géneros. Entre las desmídiads, los géneros más abundantes fueron *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Cosmarium* y *Staurostrum* y de las diatomeas, *Brachysira*, *Eunotia* y *Frustulia*. Estos géneros por lo general están asociados a ambientes oligotróficos y son indicadores de una buena calidad del agua. Los resultados demuestran que los substratos de *Macarenia* proporcionan hábitats óptimos que contri-

buyen con el crecimiento de algas y así, con la productividad primaria de los ecosistemas oligotróficos como Caño Cristales.

En el caso de estudio sobre las **interacciones** entre **crocodilianos** (3 sp.) y **humanos** en los ríos Guayabero y Losada, no se detectaron interacciones negativas, aunque las actividades humanas se han incrementado en los últimos años. Se identifican como factores clave, el manejo inadecuado de los desechos en la pesca y actividades turísticas que impliquen dejar desperdicios (“paseos de olla”), la presencia de animales domésticos en las riberas de los ríos, la falta de servicios de agua potable -que obliga a los lugareños a buscarla en los ríos- y la baja tolerancia de los humanos hacia estos animales dado el poco conocimiento que tienen sobre su historia natural. Por ello se recomienda la educación de las comunidades ribereñas.

El estudio poblacional y biogeografía de la **tonina o delfín de río**, *Inia geoffrensis humboldtiana*, recoge los resultados de dos evaluaciones realizadas en 2016 y 2018 a los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales (afluente del Guayabero), con el objetivo de establecer los parámetros poblacionales de *I. g. humboldtiana* durante dos periodos hidrológicos contrastantes. Se encontraron relaciones entre la densidad, estacionalidad y los tipos de hábitats estudiados. Destaca la importancia de las confluencias entre los ríos Guayabero y Losada y el río Guyabero y caño Yarumales, para la ecología de la especie, así como el papel del Raudal Angosturas I como barrera natural en la distribución de la misma.

El último caso de estudio es sobre la abundancia de primates diurnos y otros grandes vertebrados (mamíferos, aves) en el Parque Nacional Tinigua, estudios realizados en el entonces Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena de la Universidad de Los Andes. Los churucos (*Lagothrix lagothricha*) fueron los más abundantes, seguidos por otros primates (*Ateles belzebuth*, *Sapajus apella* y *Alouatta seniculus*). Los saínos (*Pecari tajacu*) fueron los otros mamíferos terrestres más abundantes, mientras que en aves fueron dos especies de paujiles (*Crax allector* y *Mitu salvini*). Destaca la alta abundancia de primates de gran tamaño como churucos y monos araña, los cuales para su coexistencia requieren de una alta productividad de frutos, factores que denotan un buen estado de conservación de la región

En conclusión, este libro aporta conocimiento de primera línea y novedoso de una parte muy importante de la biodiversidad de la SLM, incluidos los ríos Guayabero, Duda y Losada (limnología, algas, macroinvertebrados acuáticos, peces, reptiles, aves y mamíferos acuáticos) y ecosistemas terrestres circundantes (anfibios, reptiles, aves y algunos mamíferos), información de utilidad para la gestión, manejo y conservación del AMEM, así como de dos parques nacionales (PNN Sierra de La Macarena y PNN Tinigua). Aun así, este estudio abarca apenas una pequeña región del AMEM y la SLM, por lo cual es necesario seguir realizando estudios en campo (biología, ecología y monitoreo) y nuevas expediciones o evaluaciones biológicas rápidas.

Río Losada. Foto. Monica A. Morales-Betancourt.

Executive summary

Carlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt

The southeast region of the Sierra de La Macarena (SLM), municipality of La Macarena, department of Meta, Colombia, is an area of great biological, ecological and biogeographical importance, since biotic elements of the Andes, the Amazon and Orinoco River Basins (Llanos and Guiana Shield) converge. It is in an area that has been set aside for management and conservation purposes, as the Special Management Area of La Macarena (AMEM). In previous exercises of ecological planning of the territory, definition, nomination and prioritization of areas for conservation, the SLM has been prioritized due to its biogeographical interest and the pressures to which it is subject. Despite this, there was no solid knowledge of the region's biodiversity to provide a baseline. Thus, the Corporation for the Sustainable Development of the Special Management Area La Macarena (Cormacarena) and the Research Institute of Biological Resources Alexander von Humboldt, decided to join forces to do a biological survey of the middle Guayabero, and lower Losada and Duda river drainages, that will allow us to acquire the knowledge about biodiversity needed to adequately plan the conservation and management of biological resources in this important region of the department of Meta (Agreement N° 17-194 Instituto Humboldt and PE GDE 1.4.7.17.030 of 2017 Cormacarena).

In order to comply with that agreement, during two seasons in 2018: low water or dry season (February) and high water or rainy season (June-July) rapid assessments of biodiversity were made in the upper Guaviare River basin, which includes the drainages of the Guayabero, Losada and Duda rivers. Different methodologies adapted to each of the aquatic macro-habitats, terrestrial ecosystems and biological groups considered

were used (microalgae, aquatic macro-invertebrates, fish, amphibians, reptiles and birds). The rivers studied have Andean origin (Guayabero, Losada and Duda) and includes numerous tributaries from the Sierra, that are oligotrophic (nutrient poor) typical of the Guiana Shield. The results of these surveys were complemented by a detailed analysis of the abiotic component of the study area (geology, climatology, limnology, etc.), secondary information and other case studies: epiphytic algae associated with *Macarenia clavigera* in Caño Cristales; interaction between crocodilians and humans, population and biogeography of the river dolphin, *Inia geoffrensis humboldtiana* and finally, a study on the abundance of primates and other large vertebrates - birds and mammals - in the Tinigua National Park.

The investigation of microalgae of the phycoperiphyton, represents the first work of that type for the SLM. The team identified 66 morphospecies included in 11 taxonomic classes, 30 families and 53 genera. The greatest morphospecies richness corresponded to diatoms of two classes: Fragillariophyceae (genera *Ulnaria* and *Synedra*) and Bacillariophyceae (genus *Encyonema*) as well as desmids of the genera *Cosmarium* and *Closterium*. The species identified and the physicochemical data reflect the oligotrophic and low mineral content of these aquatic ecosystems of the SLM.

Regarding aquatic macro-invertebrates (aquatic insects, mollusks and crustaceans), 114 taxa were identified. The orders with greater representation were Trichoptera, Diptera and Decapoda and the taxa with the highest relative abundance were Smicridea, Orthocladiinae and the shrimp *Macrobrachium amazonicum*. Most of the taxa identified are indicators of good water

quality, which is a reflection of the good state of conservation of the rivers associated with the SLM.

There were 245 species of fish collected, in nine orders, of which the Characiformes (tetras, piranhas, pencil fish, headstanders etc.) were the best represented group (46.5%), followed by the Siluriformes (catfish), with 39.2%. There are 12 species that are probably new to science, five new records for Colombia, ten new records for the Orinoco River basin, 22 endemic species from Colombia and 45 species with value for consumption. For this last group, it is necessary to develop biological, ecological and fishery studies of the species subject to commercial exploitation (artisanal, ornamental and sport fishing), in order to implement conservation and management plans. Because they are heavily harvested in the area, the Gilded Catfish (*Zungaro zungaro*) and the Dog-toothed Characin (*Hydrolycus armatus*) are of particular concern. There is a high potential for commercial harvest of ornamental species, which would be an economic alternative for local populations, as long as their extraction is made in a sustainable manner. After an evaluation of commercial and sport fishing potentials with a view to creating regulations, fisheries monitoring programs should be developed where local stakeholders directly participate.

In relation to the herpetofauna, 39 species of amphibians and 68 reptiles were found. The presence of recently described species is confirmed for the forested areas north of the SLM, such as the frog, *Boana maculateralis*, in addition to several extensions of geographic distribution. It is evident how deforestation has facilitated the entrance of typical llaneran savannah (Orinoco) species, such as *Rhinella beebei*, *Scinax wandae*, *Boana xerophylla*, while the Amazonian species are restricted to forest patches, especially in the Losada River basin. As for reptiles, three threatened species are recorded, the Side-necked Turtle (*Podocnemis unifilis*), the Red-footed Tortoise (*Chelonoidis carbonarius*) and the Orinoco Crocodile (*Crocodylus intermedius*).

It is also important to mention the Toadhead Turtle (*Mesoclemmys gibba*), a species categorized as insufficient data-DD. This information is of utmost importance since it provides technical elements to the turtle conservation plan of the department of Meta that did not have data on the SLM.

For the area, 737 species of birds have been listed, grouped into 530 genera, 71 families and 27 orders. Among the most notable findings are significant expansions of the geographic range or audio recording of very little known species in Colombia such as *Picumnus ruficeps* (Picidae, Rufous Piculet), *Hylophylax punctulatus* (Thamnophilidae, Dot-backed Ant Bird), *Schiffornis major* (Tityridae, Varzea Mourner), *Tolmomyias traylori* (Tyrannidae, Orange-eyed Flycatcher), and *Hemitriccus striaticollis* (Tyrannidae, Stripe-necked Tody-tyrant). Because the AMEN is one of the regions with the greatest bird richness in Colombia, it warrants a deeper look by ornithologists and institutions responsible for conservation in Colombia.

The results of the expeditions carried out in 2018 are complemented by four case studies done in the AMEM and in particular in the SLM, including data on the two national parks (Sierra de La Macarena and Tinigua), as well as the Duda, Guayabero and Losada rivers.

The first case study describes the composition and distribution of algae communities of the epiphyton, associated with a key species of the Sierra and in particular of Caño Cristales: *Macarenia clavigera* in which 20 species from 13 genera were identified. Among the desmids, the most abundant genera were *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Cosmarium* and *Staurostrum* and the diatoms, *Brachysira*, *Eunotia* and *Frustulia*. These genera are usually associated with oligotrophic environments and are indicators of good water quality. The results show that *Macarenia* substrates provide optimal habitats that contribute to the growth of algae and thus, with the primary productivity of oligotrophic ecosystems such as Caño Cristales.

In the case of study on the interactions between crocodilians (3 sp.) and humans in the Guayabero and Losada rivers, no negative interactions were detected, although human activities have increased in recent years. They identify as key factors, the inadequate management of waste from cleaning fish, and tourist activities that involve baiting, the presence of domestic animals on the riverbanks, the lack of potable water which forces the villagers to fetch water from the rivers - and the low tolerance of humans towards these animals given the little knowledge they have about their natural history. Therefore, the education of the riparian communities is recommended.

The population study and biogeography of the river dolphin, *Inia geoffrensis humboldtiana*, is based on results of two evaluations carried out in 2016 and 2018 during two contrasting hydrological periods to the Guayabero, Losada and Caño Yarumales rivers (a tributary of the Guayabero). We found correlations between river dolphin density, seasonality and the types of habitats studied. The study highlights the

importance for the ecology of the species of the confluences between the Guayabero and Losada rivers and the Guayabero and Yarumales rivers, as well as the role of the Angosturas I rapids as a natural barrier in their distribution.

The last case study is about the abundance of diurnal primates and other large vertebrates (mammals, birds) in the Tinigua National Park, studies conducted at the then Center for Ecological Research La Macarena of the University of Los Andes. The Brown Woolly Monkey (*Lagothrix lagothricha*) was the most abundant, followed by other primates (*Ateles belzebuth*, *Sapajus apella* and *Alouatta seniculus*). The most abundant terrestrial mammal was the peccary (*Pecari tajacu*) while in birds two species of curassows (*Crax alector* and *Mitu salvini*) claimed that position. This study highlights the high abundance of large primates such as Brown Woolly and Spider monkeys, which to thrive require a high productivity of fruits, factors that denote a good state of conservation of the region.

Petroglifos, Cajón del Raudal de Angosturas I. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Introducción

Monica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso

El Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM y en especial la sierra de La Macarena-SLM, representan desde la perspectiva ambiental, una región de gran interés biológico, ecológico y biogeográfico, por constituir el único corredor biológico que conecta el sistema Andino y el complejo Amazónico-Orinoquense en Colombia. A este hecho, se une la importancia del componente social, ya que el proceso y la historia de la colonización de La Macarena se remonta a muchos años atrás, previo incluso a la declaración de la SLM como Reserva Natural a finales de la década de los 40. Esta colonización que inició en gran medida con familias que huían de la violencia, aumentó exponencialmente en la década de los ochenta con la llegada de nuevos campesinos a las orillas de los ríos Losada y Guayabero, los cuales implementaron las “técnicas de manejo del territorio” que traían como parte de su cultura, basadas principalmente en la tumba y la quema del bosque. Todo este proceso fue descrito por Molano y colaboradores en 1989, abordando temas básicos como la caracterización físico-biótica de la Reserva (Castañeda 1989, Córdoba 1989), aspectos sociales e históricos (Molano 1989), el avance de la frontera agraria y la colonización (Fajardo 1989), y por último, como todos estos factores modificaron los ecosistemas y la biodiversidad de la SLM (Carrizosa 1989).

Al mismo tiempo, dada a su importancia ecológica y por los impactos a los que estaba sometida la SLM, se declaró en 1989 el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, siendo la primera área en ser protegida en el país (Decreto Ley N° 1989 de 1989). Su importancia a nivel ambiental se ha

mantenido a través del tiempo, y en ejercicios más recientes de planificación ecológica del territorio y definición, nominación y priorización de áreas para la conservación en la Orinoquia, se resalta la importancia de la conservación del AMEM (Lasso *et al.* 2011). La mayor parte del AMEM se ubica en el extremo sur-occidental del departamento del Meta, y su porción sur en el departamento del Guaviare. Está constituida por seis unidades de manejo: dos Parques Nacionales Naturales (Sierra de La Macarena y Tinigua) en su totalidad, dos Parques Nacionales Naturales (Picachos y Sumapaz), incluyendo solo el territorio del departamento del Meta, y dos Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables-DMI (La Macarena y Ariari-Guayabero). Los DMI son espacios geográficos en los que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada, y cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute (Instituto Sinchi 2015). Para poder hacer un manejo sostenible de estas zonas es necesario entonces, tener un conocimiento amplio de la biodiversidad y de su interacción con el ser humano.

El AMEM por su tipo de formación geológica y lo que eso implica para la biota, ha sido de gran interés para zoólogos y botánicos desde el inicio del siglo pasado. Sin embargo, a pesar de su importancia y particularidad, la información biológica de esta área es muy limitada. Después de las primeras expediciones realizadas a mediados del siglo pasado, que incluyeron algunos inventarios

Morales-Betancourt, M. A. y C. A. Lasso. 2018. Introducción. Pp. 35-37. *En*: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

de flora y fauna -especialmente aves-, el siguiente trabajo que es necesario reseñar, es el diagnóstico realizado por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia (CIA-UDEA 1990), sobre los peces y la fauna terrestre de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare.

Por otra parte, en el PNN Tinigua (río Duda), el conocimiento científico de la fauna se concentró principalmente en estudios de comportamiento y ecología de primates, gracias a un convenio de investigación entre la Universidad de Los Andes y primatólogos japoneses, donde se estableció el “Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena” (CIEM). Este Centro generó más de cien publicaciones científicas de gran importancia para la SLM (Mojica-Valencia 2018), incluyendo un libro divulgativo sobre la Fauna de La Macarena (Mejía 1995). Para el resto del área, hay datos puntuales por grupos taxonómicos, los cuales se reseñan al interior de cada uno de los capítulos del presente libro.

Así, dada la falta de conocimiento temático (biológico) en gran parte del AMEM, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena, decidieron aunar esfuerzos para realizar una evaluación de la biodiversidad de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, lo que permitirá no solo avanzar en el conocimiento de algunos componentes de la biodiversidad, sino planificar adecuadamente la conservación y manejo de las especies en esta importante área del departamento del Meta (Convenio N° 17-194 Instituto Humboldt y PE GDE 1.4.7.17.030 de 2017 Cormacarena).

Para cumplir con el objetivo del convenio, se realizó una evaluación rápida de la biodiversidad o RAP (por sus siglas en inglés, *Rapid Assessment Program*) en la cuenca del río Guayabero, incluidos sus dos prin-

cipales afluentes, los ríos Duda y Guayabero. Los RAP están diseñados para que en períodos cortos de tiempo (1,5-4 semanas), un grupo interdisciplinario de investigadores y actores locales, pueda obtener información básica sobre la biodiversidad a objeto de que las instituciones responsables en la toma de decisiones (p. e. comunidades y gobiernos locales, ministerios de ambiente, comunidad internacional), puedan proceder a actuar responsablemente en la conservación del área en cuestión. Esta metodología fue diseñada con la intención de obtener información biológica de una manera rápida y así poder proponer estrategias para catalizar la conservación de los ecosistemas. Ha sido empleada en numerosos países de todo el mundo con resultados exitosos (Alonso *et al.* 2011). En el caso particular del AMEM se realizó recientemente un RAP en el área de Caño Cristales (Lasso y Morales-Betancourt 2017).

El presente libro recoge los resultados de la evaluación biológica realizada en la zona sur del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables La Macarena, destinada para la recuperación y la preservación. También incluye parte de los PNN La Macarena y Tinigua. El trabajo de campo se realizó en lo que correspondería como cuenca alta del río Guaviare, en la subcuenca del río Guayabero y los afluentes, Losada y Duda. Este se realizó durante dos estaciones climáticas en 2018, en la época de aguas bajas o sequía (febrero) y aguas altas o lluvias (junio-julio). En estas áreas se evaluaron las variables fisicoquímicas de los cuerpos de agua (limnología) y se inventariaron ciertos grupos biológicos como algas, macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles y aves. También en el libro se incluyen algunos casos de estudio de investigaciones realizadas por Cormacarena en asocio con otras instituciones e información generada por la Universidad de los Andes.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, L., J. L. Deochmann, S. A. McKenna, P. Naskrecki y S. J. Richards (Eds.). 2011. Still Counting...Biodiversity Exploration for Conservation-The First 20 Years of the Rapid Assessment Progra. Conservation International, Arlington, VA, USA. 316 pp.
- Carrizosa, J. 1989. Modificaciones de los principales ecosistemas de la Serranía de La Macarena. Capítulo III. Pp. 207-228. *En*: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Castañeda, A. E. 1989. Aspectos físicos de la región. Pp. 251-262. *En*: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia (CIA-UDEA). 1990. Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare y los Llanos del Yaré. Proyecto de Colonización. Volumen IIIB, Fauna Íctica (continuación) y Fauna Terrestre. Pp. 2312-323. *En*: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, Secretaria de Integración Popular de la Presidencia de la República – SIP. *Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada Guaviare y los llanos del Yaré*. Proyecto de Colonización. Medellín, Colombia.
- Córdoba, C. 1989. Caracterización físico-biótica de la Reserva. Pp. 229-250. *En*: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Fajardo, D. 1989. La colonización de La Macarena en la historia de la frontera agrícola. Capítulo II. Pp. 185-2016. *En*: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. 2015. Formulación Participativa del Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado “DMI” La Macarena Norte, del Área de Manejo Especial La Macarena “AMEM”, departamento del Meta. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, D. C., Colombia. 304 pp.
- Lasso, C. A., A. Rial, C. Matallana, W. Ramírez, J. Señaris, A. Díaz-Pulido, G. Corzo y A. Machado-Allison (Eds.). 2011. Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. II Áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle de Ciencias Naturales e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá, D. C., Colombia. 304 pp.
- Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). 2017. III. Fauna de Caño Cristales, sierra La Macarena, Meta, Colombia. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia. 187 pp.
- Mejía, C. A. 1995. Fauna de la Serranía de La Macarena. Amazonas Editores-Ediciones Uniandes. Bogotá D. C., Colombia. 174 pp.
- Mojica-Valencia, L. 2018. El legado investigativo del Campamento del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena de la Universidad de los Andes en el Parque Nacional Natural Tinigua. Tesis de pregrado. Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de Los Andes. Bogotá D. C., Colombia. 42 pp.
- Molano, A. 1989. La colonización: voces y caminos. Capítulo I. Pp. 13-184. *En*: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá D. C., Colombia.
- Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). 1989. *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá D. C., Colombia. 266 pp.

Brazo del río Guayabero. Foto: Jorge E. García-Melo.

Área de estudio: Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, Meta, Colombia

Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso y Lina M. Mesa S.

INTRODUCCIÓN

El estudio se realizó en el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, la cual fue creada mediante el decreto Ley 1989 de 1989, para regular las actividades humanas y no afectar la estabilidad ecológica del territorio. Se encuentra ubicada en su gran mayoría en el extremo sur-occidental del departamento del Meta y su porción sur, en el departamento del Guaviare. Incluye las cabeceras municipales de La Macarena, Uribe, San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia. El AMEM tiene una extensión de 3.891.790 hectáreas aproximadamente y está constituida por cinco unidades de manejo: dos Parques Nacionales Naturales (Sierra de La Macarena y Tinigua) en su totalidad, dos Parques Nacionales Naturales (Picachos y Sumapaz) incluyendo solo el territorio del departamento del Meta y dos Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (La Macarena y Ariari-Guayabero) (Figura 1).

Dentro del AMEM se encuentra la sierra de La Macarena-SLM, que es sin lugar a dudas el paisaje geográfico más icónico de la región, además de tener gran importancia biogeográfica ya que en esta zona confluyen elementos andinos, amazónicos, llaneros y del Escudo Guayanés, estos dos últimos pertenecientes a la Orinoquia. Por esta razón, representa una zona de gran interés para conocer y conservar su diversidad.

LA SIERRA DE LA MACARENA EN EL CONTEXTO DEL ESCUDO GUAYANÉS

La primera propuesta o reconocimiento explícito de que la sierra de La Macarena pertenece a la Región Guayana o Escudo Guayanés-EG en Colombia, fue hecha por el Mono Hernández y colaboradores en 1992 (Hernández-Camacho *et al.* 1992). Dichos autores definieron al EG como una Provincia Biogeográfica dentro de las regiones naturales de la Amazonia y Orinoquia, con cinco distritos biogeográficos dentro de este, dos de los cuales, corresponderían a nuestra área de estudio: 1) Macarena; 2) Complejo Ariari-Guayabero. Así mismo, consideran a la Región Macarena Sur, una de las 12 áreas de endemismo dentro del Escudo Guayanés. El ejercicio de la Unión Europea-UE y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA realizado en 2005 (Eva y Huber 2005), en relación a la definición de los límites geográficos de la Amazonia, considera al EG como una subregión de la Amazonia e incluyen a la base de la serranía de La Macarena (< 700 m s.n.m.), como parte de la Guayana colombiana.

Igualmente, es indudable que de acuerdo a la fitogeografía (Córdoba-Sánchez 2014) y a los datos aportados por algunas investigaciones adelantadas en la región relativas a la fauna silvestre y acuática, muchas zonas de

Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso y L. M. Mesa S. 2018. Área de estudio: Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, Meta, Colombia. Pp. 39-61. *En*: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

Figura 1. Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

La Macarena mostrarían una elevada similitud con los *tafelbergs* (mesetas tabuladas o torretas aisladas) típicas de la serranía de Chiribiquete (Guaviare, Caquetá), La Lindosa y Tunahi (Guaviare), Naquén, Tigre y Caranacabo (Guainía) y Morroco (Vaupés), y con el Pantepui de Venezuela (Díaz-Merlano 2016, Lasso obs. pers.).

La SLM muestra una diversidad de paisajes y formas de relieve muy interesantes que van desde topografías planas u onduladas de origen reciente, hasta laderas abruptas con escarpes y montañas. En ese sentido, Castañeda (1989) reconoce áreas homogéneas definidas en función de similitudes en cuanto a las características geológicas, geomorfológicas, climáticas, ecológicas y edafológicas.

GEOLOGÍA

Para hablar de la geología del AMEM y la SLM en particular, es importante docu-

mentar el evento geológico que marcó la historia del sur de la cordillera Oriental-CO, la propia Sierra, la altillanura y el bajo llano. Este consistió básicamente en el rompimiento de la corteza terrestre en el sur de la cordillera Oriental, lo cual generó la zona de cizalla Algeciras-La Uribe (data del Mioceno entre 11 y 5 Ma). Este sistema de fallas -con dirección SW-NE-, tiene continuidad desde el sur de la cordillera Oriental hacia la falla del río Meta, separando el llano bajo de la altillanura. El “pinchamiento” de la corteza y la exhumación de los basamentos precámbricos, cámbricos, paleozóicos, cretácicos y terciarios, es lo que originó una deformación de tipo “flor positiva”, conocida hoy en día como la sierra de La Macarena. Este fenómeno es también el precursor de la serranía de Los Picachos, entre La Macarena y la CO, y el páramo de Sumapáz (Jaramillo-J. y Rangel 2014a).

La SLM pertenece a la Provincia geocronológica Río Negro-Juruena-RNJ del Escudo

Guayanés. Presenta afloramientos de rocas meta-sedimentarias del Paleozoico, por lo cual se considera como parte del Escudo, aunque según otros autores corresponde a una porción de terreno metamórfico del Precámbrico, conformado también por el Macizo de Garzón, que resultó adosado al Escudo durante la orogénesis hace 1.300 o 1.000 millones de años (Kroonenberg 1985, Díaz-Merlano 2016).

Según Castañeda (1989) el marco geológico general de la SLM está conformado por las formas estructurales de las zonas quebradas (rocas ígneo-metamórficas del Precámbrico y rocas sedimentarias del Cretácico Terciario a Terciario antiguo) y secuencias estratigráficas de los depósitos de los terrenos planos (depósitos finales del Terciario a Cuaternario reciente). Las rocas más antiguas están en el centro de la Sierra y al occidente del río

Guayabero (cuarcitas, anfíbolitas, neises de origen metamórfico y granitos cuarzo dioritas de origen ígneo-plutónico). Hacia el norte de la Sierra, hacia las cabeceras del río Duda en la CO, las rocas son del Paleozoico de origen metamórfico como las pizarras, fundamentalmente. En la parte baja de dicha cordillera y hacia los extremos norte y sur de la SLM, aparecen las rocas sedimentarias de origen marino (areniscas duras intercaladas con lutitas, arcillolitas y conglomerados), que determinan la fisionomía ondulada y quebrada de la Sierra. En el sector que corresponde a los relieves planos o relativamente ondulados de la SLM, también hay arcillolitas y areniscas intercaladas con conglomerados, así como sedimentos muy recientes localizados en las riberas de los ríos más grandes, con sus característicos cantos rodados, arcillas de origen fluvial y arenas (Figura 2).

Figura 2. Geología del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS *et al.* (2016). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

En el AMEM se encuentran siete tipos de paisajes que van desde montañas hasta la planicie aluvial, donde los más representativos son el lomerío y las montañas (Figura 3a). En el área se identifican 24 tipos de relieve, siendo las lomas las que abarcan la mayor área (Figura 3b) (MADS *et al.* 2016).

La sierra de La Macarena es una unidad de paisaje fragmentada y dividida en dos bloques. El norte presenta una topografía continua, tiene 67 km de longitud y un ancho de 38 km y forma de paralelogramo. El bloque sur, presenta tres cuerpos de niveles de capas meta-sedimentarias inclinadas. El más al norte de este bloque es pequeño, de 13 km de largo por 4 km de ancho. El cuerpo intermedio tiene 47 km de largo por 13 km de ancho. Por último, el del sur es una inmensa laja con buzamiento hacia el sureste, de 26 km de largo por 8 km de ancho (Jaramillo-J. y Rangel 2014 a).

El frente de estos bloques es notorio en la parte suroccidental, área donde se realizó la evaluación biológica rápida (presente estudio) y muestra frentes de torrencialidad con procesos de remoción y disección en masa rápidos (Floréz 2003), lo que coincide en la parte baja con la fisiografía observada en las inmediaciones de la confluencia entre los ríos Guayabero y Duda. En este sector se observaron muchos árboles arrastrados por la corriente en el cambio de curso de los ríos Guayabero y Duda. De la interacción tectónica del cuerpo intermedio y sur (en el bloque sur), surgió muy probablemente, el tramo conocido como el Cajón del Raudal del Guayabero. Por otro lado, son abundantes los fluvio-culuviones del Terciario en los lechos del río Losada (Jaramillo-J. y Rangel op. cit.) y de varias edades en el tramo arriba del raudal (Figura 4).

Los paisajes y la apariencia general actual de la Sierra han sido determinados por el levantamiento de la CO y los procesos erosivos subsecuentes, incluyendo más levantamientos, fracturas y plegamientos de estructuras sedimentarias fuertemente erosionadas que dieron origen a los abanicos

de piedemonte de la CO. Estas rocas sedimentarias del Terciario sufrieron otros levantamientos y fallas, que junto con las fuertes lluvias y la erosión, definieron las altillanuras y serranías características de la región macarenense. Posteriormente, hubo recavamiento de los ríos, avenidas, deslaves y avalanchas que dieron origen a las vegas y terrazas típicas de las zonas planas. Hay entonces en la SLM y tierras bajas adyacentes, tres tipos de paisajes bien definidos: a) las montañas, b) la altillanura y c) las formas aluviales adyacentes a los ríos (Castañeda 1989).

A) Montañas (Figura 5a)

Corresponden a las formaciones rocosas de la Sierra, con fuertes escarpes de las areniscas y estructuras masivas. Hacia las partes bajas de estas montañas hay modelados torrenciales en las zonas de ladera. Se reconocen tres tipos: 1) laderas estructurales escarpadas-LEE; 2) LEE con influencia coluvial; y 3) laderas quebradas de influencia coluvial. A continuación se muestra un resumen de las características de cada una de estos tipos estructurales, según Castañeda (op. cit.).

1) Laderas estructurales escarpadas-LEE

Por encima de los 2.000 m s.n.m., topografía muy quebrada y escarpada, con cimas marcadas (convexas). Clima frío per húmedo (pluviosidad alta). Suelos superficiales, rocosos, alta capacidad de intercambio catiónico, muy lavados, aunque también tienen altas concentraciones de materia orgánica (Troporthents).

2) LEE con influencia coluvial

Entre los 1.500-2.000 m s.n.m., topografía muy escarpada en el sector de areniscas y quebradas en sectores de lutitas y otras, con cimas marcadas (convexas). Clima medio, per húmedo (alrededor de 3.500 mm/anales). Suelos superficiales, pedregosos, muy ácidos, alta capacidad de intercambio catiónico, muy lavados, aunque también tienen altas concentraciones de materia orgánica (Troporthents y Distropets).

Figura 3. a) Paisajes y b) relieve del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS *et al.* (2016). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 4. a) Río Duda, b) río Guayabero, Cajón del raudal, c) Raudal del Guayabero, d) río Losada. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, d), Jorge E. García-Melo (b, c).

3) Laderas quebradas de influencia coluvial

Entre los 500 y 1.500 m s.n.m., topografía quebrada y escarpada, rocas sedimentarias y areniscas; pendientes > al 50%. Clima frío per húmedo (alrededor de 3.000 mm/anuales). Suelos superficiales, rocosos, muy ácidos, desaturados, aunque también tienen altas concentraciones de materia orgánica (Troporthents).

B) *Atillanuras* (Figura 5b)

Con dos unidades fisiográficas definidas en la SLM: 1) terrazas muy antiguas, disectadas y suavemente onduladas; 2) sabanas ligeramente onduladas.

1) Terrazas muy antiguas, disectadas y suavemente onduladas

Entre los 300-500 m s.n.m., zonas selváticas del río Guayabero, al oriente de la SLM; topografía plano-convexa, suavemente ondulada, con pendientes hasta el 25%. Clima húmedo (alrededor de 2500 mm/anuales). Suelos muy profundos y evolucionados, alta saturación, extremadamente ácidos, altas concentraciones de materia orgánica.

2) Sabanas ligeramente onduladas

Entre los 300-500 m s.n.m., margen derecha del río Guayabero, al sur de la SLM Sabanas de El Refugio. Clima cálido-húmedo a cálido-seco (promedio 2.500 mm/anuales). Suelos superficiales a moderadamente profundos,

Figura 5. a) Montañas, b) altillanura, c-d) formas aluviales. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, c, d), Federico Mosquera-Guerra (b).

ácidos, altas concentraciones de aluminio, media a baja concentración de materia orgánica (Haplurthoxs, Distropets, Haplorthoxs).

C) *Formas aluviales* (Figura 5c-d)

Asociadas a las márgenes de los grandes ríos de la región (Guayabero, Duda y Losada), incluyen cuatro tipos en el área de estudio: 1) terrazas altas, planas a suavemente onduladas; 2) terrazas media planas, vegas y diques; 3) vegas recientes planas y terrazas bajas; y 4) vegas y bajos planos-cóncavos.

1) Terrazas altas, planas a suavemente onduladas

Entre los 300-400 m s.n.m., principalmente en las márgenes del río Duda y parte media del río Guayabero. Clima cálido-húmedo a

cálido-seco (promedio 3000 mm/anuales). Topografía suavemente ondulada con pendientes hasta el 7%. Depósitos sedimentarios, con arenas y arcillas. Suelos ácidos, con altas concentraciones de aluminio y materia orgánica (Haplorthoxs, Distropets).

2) Terrazas media planas, vegas y diques

Entre los 200-300 m. s.n.m., en el área de estudio en las márgenes del río Duda y Guayabero (franja de 5 a 10 km ancho). Clima húmedo (promedio 2.000 mm/anuales). Relieve plano, pendiente < 3%, terrazas dispuestas en varios niveles, pobremente drenadas, a veces inundadas en los sectores más bajos, con diques, complejos orillares y meandros antiguos (madreviejas). Suelos ácidos, profundos, concentración media de

materia orgánica y capacidad media de intercambio catiónico, desaturados, a veces con intrusiones de suelos más fértiles (Tropofluvents, Haplorthoxs, Distropets).

3) Vegas recientes planas y terrazas bajas

Entre los 200-400 m s.n.m., franja alargada alrededor del río Guayabero y sus afluentes. Clima cálido-húmedo (alrededor de 2.500 mm/anuales). Relieve plano, pendiente < 3%. Sedimentos muy recientes de arcillas, gravas y arenas. Suelos muy poco evolucionados, con decrecimiento de la materia orgánica, limitados por el nivel freático, ácidos y de fertilidad baja (Tropaquents, Fluvaquents, Tropaquepts).

4) Vegas y bajos planos-cóncavos

Corresponde a la zona inundable de las márgenes de los cauces de los ríos princi-

pales y afluentes de las zonas más bajas. Relieve plano-cóncavo, pendiente menor del 3%, con lagunas de inundación, madre viejas y áreas inundadas. Suelos encharcados, con alta concentración de materia orgánica, con turberas, ácidos, poco evolucionados y limitados por el nivel freático (Fluvaquents, Tropofluvents, Tropaquepts).

ECOSISTEMAS Y RIQUEZA VEGETAL

De acuerdo a la actualización del mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia a escala 1:100.000, el AMEM se encuentra localizado en el Zonobioma Húmedo Tropical, donde se encuentran 38 tipos de ecosistemas, 26 terrestres y 12 acuáticos, siendo el bosque basal húmedo uno de los más representativos (Figura 6, Anexo 1) (MADS *et al.* 2016).

Figura 6. Ecosistemas del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS *et al.* (2016). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Dentro del AMEM, La Macarena es la región que ha tenido la mayor transformación de sus ecosistemas en el Escudo Guayanés colombiano, tendencia que ha ido en aumento creciente en este siglo. En esta zona el porcentaje de ecosistemas naturales para 1985 era de 89,4% y en 2001 de 79,9% del área (Armenteras y Villa 2006). En la actualidad la tasa de deforestación sigue en aumento (Morales-Betancourt y Lasso, obs. pers.).

En cuanto a la flora y vegetación de la Sierra hay algunos trabajos puntuales. En la década de los 50' se describieron algunas especies (Schultes 1952, Philipson 1956) y se estudiaron los helechos (Alston 1952). Posteriormente se publicó un listado de la flora de la Estación Primatológica de la Universidad de Los Andes en el río Duda (Barbosa 1992) y una guía de los frutos del bosque del mismo río (Stevenson *et al.* 2000). Para la región nor-oriental de la Sierra hay un estudio sobre la flora y la fitogeografía (Carvajal y Murillo 2007). Más recientemente, Córdoba-Sánchez (2014), reconoce 975 especies para el sur de la serranía y sabanas de La Macarena, y define la unidad fitogeográfica Macarena-Lindosa, como una de las cuatro regiones fitogeográficas de la Guayana colombiana. Dicha autora señala para La Macarena Sur, cinco especies endémicas de Colombia (*Aechmea stenosepala*, *Euplassa saxicola*, *Macarenia clavigera*, *Buchnera jacoborum* y *Macairea philipsonii*), con estas dos últimas restringidas a dicha unidad fitogeográfica. No obstante, *M. clavigera* no sería endémica de la sierra de La Macarena ya que ha sido colectada también en la serranía de La Lindosa (Lasso obs. pers.). La flora de caño Cristales fue estudiada en detalle por Ariza-Cortés *et al.* (2016). Muy recientemente, Infante-Betancourt y Rangel-Ch. (2018) reportan registros de 760 especies de 411 géneros y 95 familias de plantas para la sierra de La Macarena. Dichos autores, de acuerdo a la composición florística y estructural de los bosques húmedos de La Macarena, que se asemejan a los de las planicies y terrazas bajas de la región amazónica, decidieron

incluir a las localidades de la Sierra entre los 500 y 1.000 m, como una subregión de la región amazónica colombiana. Para la llanura de inundación del río Duda reconocen el bosque de *Laetia corymbulosa* e *Inga bonplandiana*; el bosque-palmar de *Guarea guidonia*, *Cecropia membranacea* y *Socratea exorrhiza* y el bosque con *Calophyllum brasiliense*, *Enterelobium cyclocarpum* y *Garcinia floribunda*. Finalmente, para el nororiente de la sierra entre los 450 y 500 m, destacan la presencia de bosques de *Billia rosea* y *Brosimum utile*, con abundancia de especies de palmeras de los géneros *Socratea* y *Syagrus*, así como el bosque con *Casearia corymbosa*, *Curatella americana* y *Schefflera morototoni*.

Respecto a los ecosistemas acuáticos en el AMEM, según la clasificación del MADS *et al.* (2016), se encontrarían doce tipos de ecosistemas: arbustal inundable basal, bosque de galería inundable basal, bosque inundable basal, bosque inundable subandino, bosque ripario inundable subandino, herbazal inundable basal, sabana inundable, zona pantanosa basal, laguna aluvial, laguna glacial, ríos de aguas blancas y aguas negras (Figura 6, Tabla 1). Si bien a nivel terrestre el AMEM se considera en su mayoría región Amazonica, a nivel hidrográfico pertenece en su mayoría a la cuenca Orinoco. En el caso particular de la Orinoquia se ha realizado un trabajo a una escala más detallada en cuanto a la clasificación de estos ecosistemas acuáticos en macrohábitats o tipos de humedales, teniendo para toda la cuenca del Orinoco (Colombia-Venezuela) 49 tipos de humedales naturales y siete artificiales o de origen antrópico (Lasso *et al.* 2014). De acuerdo con estos autores, la Zona Hidrográfica-ZH Guaviare ocupa el cuarto puesto en cuanto número de humedales con 22 tipos y a nivel departamental el Meta también tiene un puesto representativo. Para el área de estudio ZH Guaviare en el departamento del Meta, se tendrían 21 tipos de humedales, 18 naturales, uno transformado (arrozales) y dos creados por el hombre (estanques piscícolas y jagüeyes o préstamos) (Tabla 1).

Capítulo 1. ÁREA DE ESTUDIO: ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA

Tabla 1. Tipos de humedales o macrohábitats acuáticos encontrados en la ZH Guaviare en el departamento del Meta. Abreviaturas: Tipología: N-natural, C-creado, T- transformado o regulado por el hombre. Circulación agua: LO-lótico, LE-léntico. Fuente: Elaborado a partir de Lasso *et al.* (2014).

Tipos de humedales	Tipología	Circulación agua
Arracachales o rabanales	N	LE, LO
Arroyos de montaña y quebradas	N	LO
Arrozales	T	LE
Bajos	N	LE
Bosque de rebalse	N	LE, LO
Caños	N	LO
Chigüiral o gramalotal	N	LE, LO
Chuscales	N	LE
Estanques piscícolas	C	LE
Esteros	N	LE
Jagüeyes	C	LE
Lagunas altoandinas profundas	N	LE
Lagunas altoandinas someras	N	LE
Lagunas de rebalse o inundación	N	LE
Lagunas inundables de origen pluvial	N	LE
Madreviejas	N	LE, LO
Morichales	N	LO, LE
Platanillal	N	LE
Ríos de aguas blancas	N	LO
Ríos de aguas claras	N	LO
Ríos de piedemonte, montaña y abanicos trenzados	N	LO

HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

El AMEM incluye afluentes tanto de la cuenca Orinoco como del Amazonas. De esta última cuenca, se encuentran algunos tributarios de las cabeceras de los ríos como el Apaporis que es de aguas negras. Sin embargo, en su mayoría pertenece al área hidrográfica Orinoco. Esta área hidrográfica está compuesta por una red de drenaje que incluye nueve zonas hidrográficas-ZH: Inírida, Guaviare, Vichada, Tomo, Meta, Casanare, Arauca, Orinoco directos y Apure (Ideam 2013). El estudio se realizó en la ZH río Guaviare, donde sus dos tributarios prin-

cipales son el río Guayabero con una cuenca de 23.366 km² y el río Ariari con 11.360 km² (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b). El río Guayabero nace en el páramo de Sumapáz entre los departamentos del Huila y Cundinamarca a 3.700 m s.n.m. y desemboca en el río Orinoco entre los departamentos de Guaviare y Vichada, a una altura sobre el nivel del mar de 81 m. El Guaviare tiene un caudal medio de 3.000 a 8.000 m³/s, una longitud de 1.500 km aproximadamente y una cuenca de 84.500 km² (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b).

El río Guayabero presenta un patrón de drenaje anostomado alrededor de los 600 m s.n.m. en las zonas de La Uribe y Santander (al occidente de La Macarena). Este patrón se ubica a 200 m de altitud en el bajo llano, lo que probablemente indica una zona de descenso isostática diferencial de esta área respecto al norte de la falla del río Meta. En la zona de incidencia de la sierra de La Macarena en la CO, los patrones de drenaje cambian notoria-

mente hacia el sur, en esta área la llanura de inundación es de 0,3 a 0,5 km con presencia de 1 a 4 canales y un ancho por canal de 10 a 60 m (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b). A la altura de La Macarena, tiene un caudal anual promedio de 801,74 m³/s (intervalo 96-5.659 m³/s), los mayores caudales se presentan en junio y julio donde el río se encuentra en sus niveles más altos y los aportes de sedimentos son mayores (Figura 7).

Figura 7. Información hidrológica del río Guayabero, estación La Macarena (promedio mensual): a) caudal; b) nivel del agua y c) transporte de sedimentos. Periodo 1983-2017. Elaborado a partir de las bases de datos el Ideam.

Figura 8. Subzonas hidrográficas del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM. En el recuadro se muestra en color verde la zona hidrográfica río Guaviare. Fuente: Ideam (2013). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

El río Guayabero tiene dos raudales o “angosturas”, en sectores que rompen las formaciones rocosas. El primero se denomina Raudal I y se sitúa aguas arriba del pueblo de La Macarena, en el límite entre los Parques Sierra de La Macarena y Tinigua; el segundo se denomina Raudal II y rompe los afloramientos septentrionales de la serranía de La Lindosa (Zarate *et al.* 2009).

Los afluentes del río Guayabero, son principalmente de occidente a oriente e incluye los siguientes ríos: Losada, Papamene, Tigre y Duda, que nacen en la Cordillera Oriental. Aguas abajo del Raudal I desembocan en el río Guayabero por su margen izquierda, los caños Yarumales, Correntoso, Cabre, Cafre y La Ceiba. Estos últimos tres ríos nacen en el distrito Ariari-

Guayabero dentro de la selva, mientras que los dos primeros se originan en la sierra de La Macarena. Por su margen derecha el Guayabero tiene pocos afluentes, aunque deben mencionarse los caños Morrocoy y Cachicamo, el primero de los cuales nace en las sabanas de El Refugio. En el AMEM se encuentran ocho subzonas hidrográficas (Figura 8), el estudio se ubicó en la parte alta de la ZH Guaviare incluyendo las SZH río Guayabero, río Losada y río Güape. También se tomó alguna información en la SZH alto Guaviare.

CLIMA

El AMEM presenta un clima que va desde cálido húmedo tropical a extremadamente frío

Figura 9. Clima del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM. Fuente: MADS *et al.* (2016). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

super húmedo (Figura 9). Tiene una estación seca (diciembre a marzo) con precipitaciones promedio de 135 mm. En abril y mayo hay un incremento de las precipitaciones con los máximos en junio y julio, con valores medios de 530 mm y máximos de 716 mm (estación lluviosa); desde finales de julio a octubre se presenta un descenso en las lluvias estableciéndose nuevamente la época seca a finales de noviembre y principios de diciembre (Mejía 1982). De acuerdo a los valores promedios mensuales de la base de datos climatológicos del Ideam (1981-2010) (<http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima>), La Macarena tiene una precipitación anual de 2.914 mm (Figura 10a), 25°C de temperatura promedio (Figura 10b), humedad relativa del 86% (Figura 10c), promedio de brillo solar de

4,8 horas/día (Figura 10d) y una evaporación de 1.251 mm anuales (Figura 10e).

ÁREA DE MUESTREO

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables La Macarena se subdivide en zona norte (producción) y sur (protección). El presente estudio se ubica en la zona sur destinada a recuperación para la preservación, con una extensión de 39.305 ha y de jurisdicción del municipio de La Macarena (Vásquez y Serrano 2009). También incluye los PNN La Macarena con 629.280 ha y el PNN Tinigua con 208.000 (Figura 11).

Las SZH ríos Guayabero y Losada se muestrearon en las dos estaciones climáticas,

Figura 10. Promedios climatológicos mensuales de La Macarena: a) precipitación, b) temperatura, c) humedad relativa, d) brillo solar y e) evaporación. Periodo 1981-2010. Elaborado a partir de la base de datos del Ideam, estación La Macarena.

en época seca (aguas bajas) en febrero y en lluvias (aguas altas) en julio, donde se recolectaron algas/perifiton, macroinvertebrados acuáticos (insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, esponjas), peces, anfibios, reptiles y aves. En la SZH río Guape, en el área de drenaje del río Duda solo se trabajó en la época seca y se muestrearon los grupos de perifiton/algas, macroinvertebrados acuáticos, peces y reptiles acuáticos (tortugas, crocodílicos y culebras) (Figura 12).

Las zonas de muestreo se ubican en el clima cálido húmedo y cálido muy húmedo. En la cuenca del río Duda el ecosistema predominante es el bosque basal húmedo y las zonas de muestreo estuvieron ubicadas en el bosque inundable basal, vegetación secundaria y agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales, concentrándose el muestreo en los cuerpos de aguas como ríos, caños, lagunas y madre viejas.

En la cuenca Guayabero el ecosistema es más heterogéneo, se trabajó en el arbustal basal húmedo, agroecosistemas de mosaico de pastos y espacios naturales, transicional transformado y vegetación secundaria, donde se muestrearon los grupos terrestres. En los ríos, caños, laguna de rebalse, morichales y arbustal inundable basal, se evaluaron los taxones acuáticos (Figuras 13 y 14).

En la cuenca del río Losada los ecosistemas también son bastante heterogéneos, encontrando en las áreas de trabajo parches de bosque basal húmedo, ecosistemas transicional transformado y ganaderos, agroecosistemas de mosaico de pastos y espacios naturales donde se muestrearon los grupos terrestres. Para los acuáticos se muestrearon ríos, caños, sabana inundable, bosque inundable basal y morichales (Figuras 13 y 14).

Figura 11. Zonas de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 12. Grupo de trabajo, salida de campo en aguas bajas, 2018. Foto: Jorge E. García-Melo.

Figura 13. Algunos de los ambientes terrestres muestreados. Cuenca del río Guayabero: a) meseta de arena en Ciudad Perdida, b) transicional transformado y vegetación secundaria caminos y c) bosque sobre arenas blancas. Cuenca del río Losada: d) transicional transformado y ganaderos, e) agroecosistemas de mosaico de pastos y espacios naturales y f) bosque basal húmedo (al fondo). Fotos: Monica A Morales-Betancourt.

Figura 14. a) Río principal: Losada, b) caño, c) laguna de rebalse, d) madrevieja, e) charcos temporales, f) morichales. Fotos: Monica A Morales-Betancourt.

BIBLIOGRAFÍA

- Alston, A. H. 1952. Pteridophyta of the Macarena mountains, Colombia. *Mutisia* 1 (7): 1-11.
- Ariza-Cortés, W., F. Castro-Lima y M. Cepeda-Buitrago. 2016. Flora de Caño Cristales, La Macarena, Meta. Cormacarena, Fundación del Caño de Guatiquía, Villavicencio, Colombia. 466 pp.
- Armenteras, D. y C. M. Villa (Eds.). 2006. Deforestación y fragmentación de ecosistemas naturales en el Escudo Guayanés colombiano. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt e Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas”-Colciencias. Bogotá D. C., Colombia. 122 pp.
- Barbosa, C. 1992. Preliminary list of plants collected at the centro de investigaciones primatológicas La Macarena-CIPM, Tinigua National Park, Colombia. *Field Studies of New World Monkeys, La Macarena, Colombia* 6: 25-41.
- Carvajal, L- y J. Murillo. 2007. Análisis florístico y fitogeográfico del sector nororiental de la sierra de La Macarena, Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D. C., Colombia. 212 pp.
- Castañeda, A. E. 1989. Aspectos físicos de la región. Pp. 251-262. En: Molano, A., D. Fajardo, J. Carrizosa y F. Roza (Eds.). *La colonización de la Reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas...* Fondo FEN-Colombia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Córdoba-Sánchez, M. 2014. Análisis de la riqueza vegetal y patrones fitogeográficos para la región del Escudo Guayanés colombiano. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Doctorado en Ciencias (Línea de Biodiversidad y Conservación). Bogotá, D. C., Colombia. 201 pp.
- Díaz-Merlano, J. M. 2016. El Escudo Guayanés en Colombia. Un mundo perdido. Banco de Occidente. España. 204 pp.
- Eva, H. D. y O. Huber (Eds.). 2005. Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonia. Síntesis de los resultados de un taller de consulta expertos organizado por la Comisión Europea en colaboración con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – CCI Ispra, 7-8 de junio de 2005. 24 pp.
- Flórez, A. 2003. Colombia: evolución de sus relieves y modelados. Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio-RET. Facultad de Ciencias Humanas. 240 pp.
- Hernández-Camacho, J., A. Hurtado, R. Ortiz y T. Walschburger. 1992. Unidades biogeográficas de Colombia. Pp. 105-173. En: Halfter, G. (Ed.). *La diversidad biológica de Iberoamérica*. Instituto de Ecología, A. C., México.
- Ideam. 2013. Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam. Bogotá, D. C., Colombia. 43 pp.
- Infante-Betancourt, J. y J. O. Rangel-Ch. 2018. Riqueza de las plantas con flores en las subregiones piedemonte, serranía de La Macarena y formaciones guayanesas de la Amazonía de Colombia. Pp. 95-120. En: Rangel-Ch., O. (Ed.). *La riqueza vegetal de la Amazonía de Colombia*. Fundación natura. Bogotá, D. C., Colombia.
- Jaramillo-J., A. y J. Rangel-Ch. 2014 a. Las Unidades del paisaje y los bloques del territorio de la Orinoquía. Pp. 101-152. En: Rangel Ch., J. (Ed.). *Colombia Diversidad Biótica XIV: la región de la Orinoquía colombiana*. Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá, D. C., Colombia.
- Jaramillo-J., A. y J. Rangel-Ch. 2014 b. Los sistemas fluviales de la Orinoquía colombiana (llanura de inundación y altillanura). Pp. 71-99. En: Rangel Ch., J. (Ed.). *Colombia Diversidad Biótica XIV: la región de la Orinoquía colombiana*. Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá, D. C., Colombia.
- Kroonenberg, S. B. 1985. El borde occidental del Escudo de Guayana en Colombia. *Boletín Geológico (Caracas, Venezuela)*. Publicación Especial n° 10. Memoria del Primer Simposio Amazónico, Puerto Ayacucho, Venezuela: 51-63.

- Lasso, C. A., A. Rial, G. Colonnello y F. Trujillo (Eds.). 2014. XI. Humedales de la Orinoquia (Colombia-Venezuela). Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 303 pp.
- MADS, Ideam, IAvH, Sinchi, Invemar, PNN, IIAP e IGAC. 2016. Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, escala 1: 100.000. Version 1.2. formato shapefile. Bogotá D. C., Colombia.
- Mejía, M. 1982. Contribución al conocimiento de la climatología colombiana. *Revista de Geografía, Universidad Nacional de Colombia* 3: 9-159.
- Philipson, W. R. 1956. New species from the Sierra de La Macarena. *Mutisia* 1 (24): 1-7.
- Schultes, R. E. 1953. *Plantae Colombianae XIV-Rhytidantherae montis macarenae* nova species. *Botanical Museum Leaflets, Harvard University* 16 (5): 106-111.
- Stevenson, P., M. Quiñonez y M. C. Castellanos. 2000. Guía de frutos de los bosques del río Duda, La Macarena, Colombia. Giro Editores. Bogotá, D. C., Colombia. 467 pp.
- Vásquez-V., V. H. y M. A. Serrano-G. 2009. Las áreas naturales protegidas de Colombia. Conservación Internacional-Colombia, Fundación Biocolombia. Bogotá, D. C., Colombia. 696 pp.
- Zárate, C. A., A. Herrera, M. Duarte, W. Villaba, y L. Cifuentes. 2005. Plan de manejo básico Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 2005-2009. San Juan de Arama. Meta: Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia. 176 pp.

Capítulo 1. ÁREA DE ESTUDIO: ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA

Anexo 1. Grandes biomas, bioma preliminar y ecosistemas del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM.
Fuente: MADS *et al.* (2016).

Gran Bioma	Bioma preliminar	Ecosistema
Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical	Orobioma Andino	Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
		Agroecosistema ganadero
		Arbustal andino húmedo
		Bosque fragmentado con pastos y cultivos
		Bosque fragmentado con vegetación secundaria
		Complejos rocosos de los andes
		Herbazal andino húmedo
		Otras áreas
		Vegetación secundaria
	Orobioma de Páramo	Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
		Agroecosistema ganadero
		Complejos rocosos de los andes
		Páramo
		Vegetación secundaria
	Orobioma Subandino	Agroecosistema de mosaico de cultivos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
		Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
		Agroecosistema ganadero
		Arbustal subandino húmedo
		Bosque fragmentado con pastos y cultivos
		Bosque fragmentado con vegetación secundaria
		Bosque subandino húmedo
		Otras áreas
		Territorio artificializado
		Vegetación secundaria

Anexo 1. Continuación

Gran Bioma	Bioma preliminar	Ecosistema
Pedobioma del Zonobioma Húmedo Tropical	Helobioma	Arbustal inundable basal
		Bosque de galería inundable basal
		Bosque inundable basal
		Bosque inundable subandino
		Bosque ripario inundable subandino
		Herbazal inundable basal
		Sabana inundable
		Transicional transformado
		Zona pantanosa basal
	Hidrobioma	Laguna aluvial
		Laguna glacial
		Rio de aguas blancas
		Rio de aguas negras
	Peinobioma	Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
		Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
		Agroecosistema ganadero
		Agroecosistema palmero
		Bosque fragmentado con pastos y cultivos
		Bosque fragmentado con vegetación secundaria
		Sabana estacional
		Vegetación secundaria

Capítulo 1. ÁREA DE ESTUDIO: ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA

Anexo 1. Continuación

Gran Bioma	Bioma preliminar	Ecosistema
Zonobioma Húmedo Tropical	Zonobioma Húmedo Tropical	Agroecosistema arrocero
		Agroecosistema de mosaico de cultivos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
		Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
		Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
		Agroecosistema ganadero
		Agroecosistema palmero
		Arbustal basal húmedo
		Bosque basal húmedo
		Bosque de galería basal húmedo
		Bosque fragmentado con pastos y cultivos
		Bosque fragmentado con vegetación secundaria
		Herbazal basal húmedo
		Territorio artificializado
		Vegetación secundaria

Río Duda, al fondo la sierra de La Macarena. Foto: Carlos A. Lasso.

Caño Cristales. Foto: Iván Mikolji.

Limnología de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Cristian Granados-Martínez y Marcela Núñez-Avellaneda

Resumen. Se evaluaron las variables fisicoquímicas básicas como pH, conductividad (C), sólidos totales disueltos (STD), oxígeno disuelto (OD) y saturación de oxígeno (%OD), asociadas a tres ríos principales (Guayabero, Duda y Losada) y sus afluentes, cuenca del Guaviare, Orinoquia colombiana, sierra de La Macarena, Meta (Colombia). Los afluentes son tributarios provenientes de la Sierra, con características oligotróficas (pobreza de nutrientes) típicos del Escudo Guayanés. Se incluye información fisicoquímica registrada durante tres años: 2016 (bajada de aguas-aguas bajas o sequía), 2017 (bajada de aguas) y 2018 (aguas bajas o sequía-aguas altas o lluvias). En total se muestrearon 67 estaciones correspondientes a cuatro tipos de macrohábitats, con sus microhábitats específicos: ríos principales (playas, cauce principal, rápidos o raudales, parches de plantas acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños de diferente porte (pequeños/quebradas, medianos y grandes); lagunas de inundación y/o madre viejas y finalmente, morichales-herbazales inundados. Se observaron dos tipos de aguas características de la cuenca del Orinoco, claras y blancas.

Palabras clave. Andes. Escudo Guayanés. Orinoquia. Parámetros fisicoquímicos. Tipología de aguas.

Abstract. Basic physicochemical variables such as pH, conductivity (C), total dissolved solids (TDS), dissolved oxygen (DO) and oxygen saturation (% OD) were evaluated for three main rivers (Guayabero, Duda and Losada) and their tributaries in the Guaviare River drainage, Colombian Orinoco River Basin, Sierra de La Macarena, Meta, Colombia. The tributaries coming from the Sierra that have oligotrophic characteristics (nutrient poor) typical of the Guiana Shield. Physical-chemical information recorded during three years is included: 2016 (falling waters, dry season), 2017 (falling waters) and 2018 (low water, dry season and high water rainy season). In total, 67 stations were sampled corresponding to four types of macro-habitats, with

Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt, C. Granados-Martínez y M. Núñez-Avellaneda. 2018. Limnología de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, Sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 63-81. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

the following specific microhabitats: main rivers (beaches, main channel, rapids and patches of aquatic plants-Podostemaceae); tributaries or streams of different sizes (small / intermittent, medium and large); floodplain lagoons or oxbow lakes, and finally, flooded moriche palm and other vegetation choked sites. Two water types characteristic of the Orinoco River basin were observed: clear and white.

Key words. Andes Mountains. Guiana Shield. Orinoco River Basin. Physical and chemical parameters. Water type.

INTRODUCCIÓN

A nivel hidrográfico el Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, se encuentra ubicada en su mayoría en el área hidrográfica del río Orinoco. Incluye la parte alta de la zona hidrográfica río Guaviare y presenta siete subzonas hidrográficas-SZH (alto y medio Guaviare, río Losada, río Ariari, río Guape, río Güejar y río Guayabero), de acuerdo a la clasificación de Ideam (2013). También incluye la parte alta de la SZH río Tunia, tributario del área hidrográfica Amazonas.

En el AMEM se encuentra la sierra de La Macarena que constituye un macizo independiente de los Andes y en conjunto con los valles al este y sureste, conforma el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena (Zárate *et al.* 2005). Dentro del área discurren ríos importantes, de los cuales dos son de origen andino y al menos cinco tiene su origen en la gran planicie del Distrito Ariari-Guayabero, de influencia guayanesa. El primero, el río Duda, hace parte del límite occidental del área protegida y nace en la cordillera andina en el sector conocido como la cuchilla Chusca. El Duda recibe al caño Santo Domingo y al río Santo Domingo, los cuales nacen en la sierra de La Macarena. Otro río, que es el más importante por ser el principal receptor de la cuenca, es el Guayabero. Este tiene su origen en la cordillera andina, en el sector llamado cerro Buenos Aires, y es parte de límite sur del área protegida, definido, en un trecho entre el Raudal Angosturas I y la boca del caño Yarumales (Zárate *et al.* op. cit.).

Para el área del estudio, solo existen dos estudios previos sobre limnología. El primero fue un diagnóstico realizado por la

Universidad de Antioquia-Centro de Investigaciones Ambientales (UA-CIA) en 1990, donde se midieron 24 variables físicas y químicas relativas a la calidad de agua en la cuenca de los ríos Duda y Losada y parte alta del río Guayabero, hasta la desembocadura del río Losada. El segundo estudio se realizó en uno de los principales atractivos turísticos de la región, Caño Cristales. En este río -típicamente guayanés- con origen en la sierra de La Macarena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, realizaron un estudio sobre la fauna asociada a Caño Cristales e incluyeron información limnológica (Morales-Betancourt *et al.* 2017).

La integridad de las fuentes de agua, entendida esta como el mantenimiento de la estructura y función, implica conservar el balance de natural de sus condiciones físicas, químicas y biológicas como un todo, a fin de determinar las pautas para su conservación y evaluar las interrelaciones ecológicas de la biota acuática y terrestre. De igual forma, la composición fisicoquímica en términos espaciales y temporales, define en gran medida que especies de fauna y flora podrían habitar en estos sistemas y ser por tanto bioindicadores de la calidad del agua e incluso de la biogeografía de la región, en conjunto por supuesto, con la geología y geomorfología. Por esta razón, el objetivo principal de este trabajo fue describir los principales aspectos de la limnología básica de la cuenca del río Guayabero incluyendo los dos principales afluentes, los ríos

Losada y Duda, así como los macrohábitats acuáticos asociados en estos sistemas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluye la información fisicoquímica registrada durante tres años de trabajo de campo (2016, 2017 y 2018), sin ningún tipo de sistematización predeterminada -definido en función de visitas ocasionales al área- en las cuencas de los ríos Guayabero, Duda y Losada. En total se muestrearon 67 estaciones correspondientes a cuatro tipos de macrohábitats, con sus microhábitats particulares: ríos principales (playas, cauce principal, rápidos o raudales, parches de plantas acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños de diferente porte (pequeños/quebradas, medianos y grandes); lagunas de inundación

y/o madrevejas y finalmente, morichales-herbazales inundados (Figura 1). Para 2016 (bajada de aguas-aguas bajas o sequía), se incluye información de 18 estaciones de los ríos Guayabero, Losada y Caño Cristales-CC, la información sobre este último está recogida en gran parte en Morales-Betancourt *et al.* (2017); para 2017 (bajada de aguas) hay datos de 2 estaciones de la Laguna El Silencio y CC, y en 2018 (aguas bajas o sequía-aguas altas o lluvias), hay información de 17 estaciones durante la época seca y 9 estaciones en lluvias, para los ríos Duda, Guayabero y Losada (Anexo 1). Se utilizaron equipos portátiles (sondas multiparamétricas marca TWT y HANNA) y se midieron variables *in-situ* que incluyeron pH, conductividad, Sólidos Totales Disueltos (STD), oxígeno disuelto (OD) y saturación de oxígeno (% OD),

Figura 1. Estaciones de muestreo limnológico. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

esta última solo en algunas estaciones durante la estación seca de 2018 (Figura 2). En el área se geo-referenciaron los puntos utilizando un GPS y se describieron aspectos físicos observables a simple vista.

La tipología de aguas sigue a Lasso (2014), con base a los ajustes a la clasificación tradicional de Sioli (1965, 1975) y las consideraciones sobre fertilidad de Ríos-Villamizar *et al.* (2013), que considera la conductividad eléctrica como variable para medirla: ríos de aguas blancas fértiles ($\geq 50 \mu\text{S}/\text{cm}$), no fértiles o infértiles ($< 50 \mu\text{S}/\text{cm}$); considerando que todos los ríos de aguas claras y negras son infértiles ($< 50 \mu\text{S}/\text{cm}$).

RESULTADOS

Las estaciones evaluadas se encuentran dentro del área de drenaje de tres grandes ríos, el Guayabero y sus dos afluentes, Duda y Losada, y corresponden a cuatro tipos de macrohábitats, con sus microhábitats: ríos principales (playas, cauce principal, rápidos o raudales, parches de plantas acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños de diferente porte (pequeños/quebradas, medianos y grandes); lagunas de inundación y/o madre viejas y finalmente, morichales herbazales inundados.

Descripción de los ríos y macrohábitats estudiados

Ríos principales

Río Guayabero

Ecosistema lótico que presenta relieve plano en los tramos estudiados, con un cauce de muy baja sinuosidad. Cuando discurre por el valle de la sierra de La Macarena, el área de la llanura de inundación es de 0,3 a 0,5 km, con presencia de 1 a 4 canales y un ancho por canal de 10 a 60 m (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b). A la altura del pueblo de La Macarena, tiene un caudal anual promedio de $801,74 \text{ m}^3/\text{s}$ (intervalo 96-5.659 m^3/s), y los mayores caudales se presentan en junio y julio donde el río se encuentra en su nivel más alto y transporte de sedimentos (Morales-Betancourt *et al.*, Capítulo 1). Presenta sustrato rocoso y limoso (Figura 3). En algunos sectores del río (raudales, rápidos o “cachiveras”), se encuentran parches de vegetación acuática de la familia Podostemaceae (*Apinagia* sp.), también hay vegetación (bosque de galería) en la zona inundable y tierra firme, de dosel variable desde muy abierto hasta cerrado, con arbustales característicos asociados a los afloramientos rocosos. Hay actividad humana en el río (turismo y pesca). Las aguas claras son de color claro-verdoso durante la estación seca,

Figura 2. Medición de las variables fisicoquímicas: a) utilizando una sonda multiparámetro TWT, b) sonda HANNA. Fotos: Cristian Granados-Martínez (a), Carlos A. Lasso (b).

que se tornan a blancas en la estación de lluvias o aguas altas por el aporte de caños y afluentes, además del mismo cauce principal del río a consecuencia de la deforestación. La mayor intervención está entre el sector del Cajón del Raudal o Raudal Angosturas I y aguas abajo de La Macarena. Es el río con la mayor cantidad de información fisicoquímica. Las aguas son relativamente fértiles, con diferentes niveles de mineralización,

($\bar{x}=54 \mu\text{S}/\text{cm}$), aunque la conductividad varió de 5 en zonas de remanso del Raudal Angosturas, a $83 \mu\text{S}/\text{cm}$ en la zona de cachiveras; pH neutro a básico (especialmente en zonas de remanso); temperatura promedio $27,1^\circ\text{C}$; baja concentración de sólidos disueltos-TSD ($\bar{x}=38,7 \text{ ppm}$) y aguas bien oxigenadas ($\bar{x}=7,25 \text{ mg/l}$). No se observaron diferencias estacionales, ni entre microhábitats en un mismo periodo (Tabla 1, Anexo 1).

Figura 3. Río Guayabero: a) cauce principal, b) Cajón del Raudal, c) raudal, d) sustrato rocoso-limoso. Fotos: Federico Mosquera-Guerra (a), Monica A. Morales-Betancourt (b-c).

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos río Guayabero. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016 y 2018, todos los microhábitats en ambas estaciones climáticas. n: número de estaciones de muestreo.

	pH	C ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	T ($^\circ\text{C}$)	TSD (ppm)	Oxígeno (mg/l)
Promedio	7,6	54	27,1	38,7	7,2
Intervalo	6,9-8,4	5-83	23,3-29,5	15-7	7,1-7,6
n	13	13	12	12	4

Capítulo 2. LIMNOLOGÍA DE LA CUENCA DEL GUAYABERO

Río Losada

Tributario del río Guayabero. Presencia de sustrato pedregoso en su parte media y baja. Se observaron procesos importantes de deforestación y desarrollo de actividades de extracción de material (piedras, cantos rodados y arena-grava). Estas modificaciones se pueden ver en las riberas del cauce principal del río que supone una pérdida parcial de la conexión lateral e influye en la integridad biótica. Es el sistema hídrico más intervenido en la región y presenta marcada actividad ganadera (Figura 4). Aguas claras con mineralización moderada, de apariencia verdosa durante la estación seca, que tornan a blancas en la estación de lluvias como el río Guayabero, por el aporte de caños y afluentes a consecuencia de la deforestación y ganadería. Si bien hay menos información hidro-

química en relación al río Guayabero, puede establecerse que tiene aguas poco fértiles ($\bar{x}$ = 32 μ S/cm); pH neutro a básico; temperatura promedio 38,7 °C, baja concentración de TDS ($\bar{x}$ = 19,2 ppm) y aguas bien oxigenadas (7,58 mg/l) (Tabla 2). No se observaron diferencias estacionales ni entre microhábitats.

Río Duda

Este afluente del río Guayabero es el río mejor conservado en la región. El lecho del río es areno-arcilloso. Vegetación riparia de bosque maduro con dosel cerrado de 18 a 20 m de altura, con árboles emergentes de hasta 25 a 30 m y zonas colonizadas por yarumo (*Cecropia* sp.), en las zonas de muestreo. En algunos tramos del río hacia la

Figura 4. Río Losada: a) aguas altas, b) aguas bajas, c) sustrato limo-arcilloso d) extracción de material parental. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.

confluencia con el Guayabero, se evidencia la presencia de abundante material leñoso de gran tamaño incluyendo troncos y ramas, a consecuencia de los fuertes arrastres durante la estación de aguas altas. Aguas claras, también de tonalidad verdosa (Figura 5). Tampoco cuenta con mucha información hidroquímica en relación al río

Guayabero o Losada (solo datos de sequía 2018). Es de destacar que a diferencia de los ríos anteriores, tiene aguas mucho más fértiles ($\bar{x}$ = 116 μ S/cm) y una mayor concentración de sólidos disueltos ($\bar{x}$ =103 ppm); pH neutro a básico; temperatura promedio 28,2 °C y aguas también oxigenadas (7 mg/l) (Tabla 3).

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos río Losada. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016 y 2018, todos los microhábitats en ambas estaciones climáticas.

	pH	C (μ S/cm)	T (°C)	TSD (ppm)	Oxígeno (mg/l)
Promedio	7,4	32	28,8	19,2	7,6
Intervalo	6,7-8,2	21-46	26,4-31,3	10-5	
n	4	4	4	4	1

Figura 5. Río Duda. Foto: Carlos A. Lasso.

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos río Duda. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2018, todos los microhábitats en ambas estaciones climáticas.

	pH	C (μ S/cm)	T (°C)	TSD (ppm)	Oxígeno (mg/l)
Promedio	7,3	116	28,2	103	7
Intervalo	7,1-7,8	90-151	27,5-29	51-149	7
n	3	3	3	3	1

Caños

Los caños o afluentes (tributarios) de estos tres ríos, pueden clasificarse según su porte y/o ordenamiento en la red de drenaje, en pequeños o quebradas, medianos y grandes. Los caños pequeños se disponen hacia las cabeceras (ríos de orden o jerarquía hidrográfica menor) o pueden afluir directamente a caños mayores o incluso ríos principales en las tierras bajas; son de muy baja profundidad (máximo 1 m en pozos aislados), poco anchos (máximo 3 m) y pueden ser temporales. Los caños medianos tienen una mayor profundidad y ancho que los pequeños (no son navegables en época de aguas altas), pueden ser temporales o permanentes y por último, los caños más grandes nunca se secan y son navegables prácticamente todo el año.

Durante los tres años de trabajo en el área, se muestrearon 24 caños, cuatro en la subcuenca del río Duda, 15 en el Guayabero y cinco en el Losada. Estos caños pueden nacer en el paisaje montañoso (escarpes de la sierra de La Macarena), como es el caso de los afluentes del río Duda (San José, Jair, Aguas Claras, Santo Domingo) (Figura 6 a) y algunos del Guayabero (p. e. Canoa, Aguas Claras, Soplaculo, Temblón) (Figura 6 b), de los cuales el más representativo es Caño Cristales (Figura 6 c). Otros caños afluentes del Guayabero nacen en la planicie aluvial o en zonas de lomerío (p. e. Nevera, Morrocoy) y los afluentes del Losada (p. e. La Cristalina), tienen su origen también en la planicie y lomeríos (Figura 6 d).

Figura 6. Caños: a) Santo Domingo, b) Temblón, c) Caño Cristales, d) caño vereda Los Alpes. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, b, d), Carlos A. Lasso (c).

Todos los caños son de aguas claras y poco fértiles ($\bar{x}$ = 17,43 $\mu\text{S/cm}$), de hecho algunos pueden considerarse oligotróficos -los que nacen en la Sierra- con valores de conductividad por debajo de 10 $\mu\text{S/cm}$, de los cuales el menos fértil es Caño Cristales con valores incluso cercanos a cero. Las aguas son siempre ácidas a neutras o ligeramente básicas en casos muy puntuales ($\bar{x}$ =6,32); la temperatura en promedio es un poco más baja que los otros macrohábitats (26,4 °C); baja a muy baja concentración de sólidos disueltos ($\bar{x}$ =16,63 mg/l), en ciertos casos cercana a cero; aguas bien oxigenadas ($\bar{x}$ =5,89 mg/l) (Tabla 4, Anexo 1).

Lagunas de inundación y/o madre vieja

Estos ecosistemas lénticos fueron los menos representados en el área de estudio (n=6) (Figura 7). Incluye una laguna del plano inundable del río Guayabero con forma de herradura (madre vieja), que es la Laguna Los Bocachicos, justo abajo de la confluencia de los ríos Guayabero y Duda; la Laguna El Silencio -que llega a conectar en época de lluvias y aguas altas a Caño Cristales con el río Guayabero-; una laguna en el propio cauce principal del Guayabero -que se aísla de este en el estiaje o pico de sequía-

y finalmente, dos lagunas de inundación del río Losada, una de gran tamaño (laguna Los Alpes) y otra más pequeña (laguna Lucia). Las dos lagunas del río Guayabero presentaron los mayores valores de conductividad (> 100 $\mu\text{S/cm}$) con aguas fértiles, mientras que las del Losada fueron muy pobres (< 50 $\mu\text{S/cm}$). La laguna El Silencio, situada en el medio del bosque y con influencia directa de las formaciones rocosas propias del Escudo y de Caño Cristales, presentó muy baja conductividad (< 15 $\mu\text{S/cm}$). El pH fue ligeramente ácido a neutro; temperaturas más cálidas ($\bar{x}$ =28,2 °C); sólidos totales disueltos similares a la conductividad y tenores de oxígeno elevados (Tabla 5, Anexo 1).

Morichales-herbazales inundables

Estos ecosistemas o macrohábitats pueden ser lénticos, siempre y cuando el morichal se encuentre en una matriz de sabana inundable o no (altillanura), asociado a herbazales inundables. Cuando discurre de manera permanente o temporal a lo largo de un curso definido, puede considerarse como un sistema lótico. Hay información de 12 morichales en el área de estudio (Figura 8), 11 en el sistema del Guayabero (8 tipo ríos,

Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos, caños. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.

	pH	C ($\mu\text{S/cm}$)	T (°C)	TSD (ppm)	Oxígeno (mg/l)
Promedio	6,3	17,4	26,2	16,6	5,9
Intervalo	5,4-7,97	3-41,6	23-30,8	242	2,7-6,9
n	21	22	23	24	10

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos, lagunas. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.

	pH	C ($\mu\text{S/cm}$)	T (°C)	TSD (ppm)	Oxígeno (mg/l)
Promedio	6,97	68,54	28,2	70,3	6,9
Intervalo	6,2-6,97	7,5-157,7	25,4-30,4	8-158	6,1-7,4
n	5	5	5	5	3

Figura 7. Lagunas: a) Los Bocachicos, b) El Silencio, c) laguna del plano inundable del río Guayabero, d) Los Alpes. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, b, d), Mark Sabaj (c).

Figura 8. Morichales: a) El Silencio, b) Ciudad de Piedra. Fotos: Carlos A. Lasso.

caños, quebradas o canales de desagüe con morichal; uno en la sabana inundable y dos asociados a herbazales inundables). El

único morichal evaluado en el río Losada correspondió a un caño de morichal. Las aguas de estos sistemas son claras, pobres

en nutrientes, con conductividad baja a muy baja, oligotróficas en algunos casos (intervalo: 3-24, $\bar{x}$ = 12, 58 $\mu\text{S}/\text{cm}$); típicamente ácidas ($\bar{x}$ = 5,7); temperaturas medias

($\bar{x}$ = 26,4 °C); sólidos totales disueltos también bajos como la conductividad ($\bar{x}$ = 6,7 ppm) (Tabla 6, Anexo 1).

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos, morichales. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.

	pH	C ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	T (°C)	TSD (ppm)
Promedio	5,7	12,6	26,4	6,7
Intervalo	4,9-6,9	3,0-24	24,2-29,7	2-14
n	12	12	12	12

DISCUSIÓN

La fisiografía, geomorfología y geología del AMEM y en especial de la sierra de La Macarena, incluyendo los valles por donde discurren los tres ríos principales analizados, determinan una configuración muy interesante desde el punto de vista limnológico, hidrológico e hidrográfico. Así, hay aguas de origen andino (claras y blancas) *sensu* Sioli (1975) y Lasso (2014), más fértiles y productivas con conductividades más elevadas, mayor concentración de sólidos disueltos-TDS, pH más bien neutros o básicos, y aguas claras, más pobres en nutrientes, poco fértiles con baja conductividad y TSD, ácidas e incluso en algunos casos oligotróficas, típicas de los ríos y caños que nacen en la sierra de La Macarena, como Caño Cristales que es el más representativo de la región (Morales-Betancourt *et al.* 2017). Esta diversidad en la tipología (fisicoquímica) de las de las aguas (andinas y guayanesas; claras y blancas), es un elemento definitorio del AMEM, y casi que único de la Sierra. De ahí que a la sierra de La Macarena se la conozca también en términos fisiográficos y biogeográficos como la “Guayana Llanera” (Lasso y Morales-Betancourt, 2017), ya que es el reflejo de la mezcla de fauna y flora, y ahora de aguas de diferentes tipos y orígenes. En la Orinoquia solo se encuentra una región con condi-

ciones parecidas que es la Estrella Fluvial de Inírida (Guainía), donde confluyen aguas de diferentes tipos (claras, blancas y negras) y orígenes, andinos por el río Guaviare y guayaneses por el Inírida y Atapabo (Lasso *et al.* 2014, Suárez y Usma 2014).

El uso de la tipología de aguas (claras, blancas y negras) en la definición, caracterización y clasificación de los macrohábitats o humedales estudiados en el AMEM y en particular en la Sierra, es un elemento fundamental para direccionar acciones de conservación biológica y uso del recurso hídrico. Los cursos de agua provenientes de los escarpes montañosos de La Macarena e incluso de los lomeríos y planicie de la altillanura (Escudo Guayanés) o llanura aluvial del AMEM, así como los ríos Duda y el Guayabero, son especialmente sensibles a los impactos antrópicos derivados especialmente de la deforestación. El propio río Guayabero al menos en su parte media y sobre todo el medio y bajo río Losada, ya muestran indicios claros de lo que se conoce como “Man-made white waters” (Junk y Furch 1984), que no es otra cosa que el cambio de aguas claras a blancas a causa de los procesos de origen antrópico y erosivos en la red de drenaje, evidentes especialmente en las grandes crecidas tras fuertes lluvias (Lasso 2014). Este fenómeno no debe confundirse no obstante, con un

proceso natural de cambio en la coloración de las aguas de acuerdo a la estacionalidad climática (lluvias-sequía; aguas altas altas-bajas). Algunos ríos que son “blancos” durante la estación de aguas altas y lluvias por el incremento de los sólidos suspendidos, se vuelven claros en la estación seca o de aguas bajas, que corresponde al color natural o tipología de aguas del río en particular (Figura 9). Este fenómeno de alternancia ha sido descrito para la Amazonia (Junk y Furch 1984, Sioli 1975) y para la Orinoquia (Lasso 2014).

El uso de la conductividad eléctrica como un criterio para clasificar humedales y determinar la fertilidad de las aguas asociado a su tipología (claras, negras y blancas) es de gran utilidad, como se ha visto en el presente estudio. La baja conductividad registrada hace que los procesos de mineralización sean relativamente bajos (Núñez-Avellaneda y Duque 2001, Morales-Betancourt *et al.* 2017). El pH fue ligeramente básico en el curso principal del río Guayabero, mientras que en los caños esta variable fue más bien ácida, hecho asociado a que los caños presentan proporcionalmente mayor material orgánico vegetal que el cauce principal (detritus, hojas, troncos etc.), con ácidos húmicos y fúlvicos disueltos. También destaca la baja conductividad de estos caños, que junto con pH

bajos, son característicos de los afluentes del Escudo Guayanés provenientes de la Sierra. Los bajos valores de TSD y de la conductividad en estos afluentes serranos, concuerdan con lo planteado por Gómez *et al.* (2007), que mencionan que estos ecosistemas transcurren sobre rocas principalmente metamórficas como las del Escudo Guayanés y parte de la altillanura. Este patrón de aguas ácidas a muy ácidas y valores de conductividad y por tanto oligotrofia, se ha reportado también para otros sistemas del Escudo Guayanés colombiano como la serranía de Chiribiquete, con valores promedio de $\text{pH}=4,4$ y $C=14,4 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($1\text{-}25 \mu\text{S}/\text{cm}$) (Mojica *et al.* 2017) y la serranía de La Lindosa (pH de 5 a 6 y conductividad de 4 a $15 \mu\text{S}/\text{cm}$) (Botero *et al.* 2018).

En el curso principal del río Guayabero, los minerales están en mayor cantidad producto del transporte que proviene desde sus cabeceras y por ende tiene mayor conductividad. Cortés (2004) menciona que en estas zonas predominan suelos ferralíticos, lixiviados, poco fértiles y ácidos, así, la baja concentración de iones se asocia con valores ligeramente ácidos y los pocos iones que se transportan dependen principalmente de aportes de las lluvias (Rivera *et al.* 2010). Esta misma condición se aprecia en la Amazonia colombiana (río Caquetá), donde los afloramientos rocosos precámbricos

Figura 9. Confluencia del río Guayabero y caño Temblón: a) aguas altas, b) aguas bajas. Nótese la diferencia en el color de las aguas. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.

generan esta condición de baja mineralización (Núñez-Avellaneda y Duque 2001). No obstante, hay que señalar que los grandes cauces de ríos de origen andino suelen tener otras condiciones determinadas por razones geológicas, como lo es por ejemplo el río Ariari que afluye más abajo al Guayabero y que posee una alta mineralización ($>100 \mu\text{S}/\text{cm}$) (Donato 1987).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El AMEM es muy interesante no solo desde el punto de vista biológico, sino limnológico, hidrológico e hidrográfico, pues presenta dos tipos de ríos (guayaneses y andinos) y dos tipos de aguas (claras y blancas), en una sola región. En términos generales, las temperaturas fueron medias a altas ($23,3\text{--}31,3^\circ\text{C}$), la conductividad desde muy baja ($3 \mu\text{S}/\text{cm}$) a alta ($157 \mu\text{S}/\text{cm}$) en casos excepcionales, sólidos totales disueltos también muy bajos (2 ppm) a altos en un solo caso particular (158 ppm), el pH ácido a básico (4,93-8,44) y el oxígeno con valores medios a altos (hasta $15,8 \text{ mg}/\text{l}$), con variaciones específicas según

el tipo de macrohábitat y el origen (andino, guayanés o planicie). No se observaron diferencias estacionales marcadas, aunque sí entre macro y microhábitats.

El área mantiene todavía -salvo algunos sitios puntuales- una buena integridad biológica y calidad del agua, especialmente el río Duda, dada su lejanía y situación de orden público, pero hay factores que están amenazando en la actualidad la conservación y uso apropiado del recurso hídrico. Estas amenazas son en primer lugar, la deforestación, seguida de los incendios forestales y minería a cielo abierto de rocas y cantos rodados, que afectan el cauce de los ríos (p. e. río Losada). Se ha observado en muchas zonas como no se mantiene la mínima cobertura vegetal necesaria (bosque de galería o ripario), en la margen de los ríos y caños afluentes del Guayabero y Losada.

Se recomienda entonces una evaluación y monitoreo a detalle del proceso de deforestación. Finalmente, es oportuno destacar que desafortunadamente ninguno de los dos parques naturales de la región ha escapado a estos impactos, especialmente el PNN Tinigua.

BIBLIOGRAFÍA

- Botero, P., A. Serrano y J. A. Amaya. 2018. Muestras de agua. Apéndice II. Pp. 196-197. En: Vriesendorp, C., N. Pitman, D. Alvira-Reyes, A. Salazar-Molano, R. Botero-García, A. Arciniegas, L. de Souza, A. Del Campo, D. F. Stotz, T. Whachter, A. Ravikumar y J. Peplinski (Eds.). *Colombia: La Lindos, Capricho, Cerritos*. Rapid Biological and Social Inventories Report 29. The Field Museum, Chicago, USA.
- Cortés, A. 2004. Suelos colombianos. Una mirada desde la academia. Colección Estudios. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Recursos Naturales. Bogotá, D. C., Colombia. 198 pp.
- Donato J. 1987. Análisis limnológico y concentración de biocidas en peces de los ríos Ariari, Guayuriba, Humea y Meta. *Revista Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana* 1 (1): 29-52.
- Gómez, J., A. Nivia, N. E. Montes, D. M. Jiménez, J. Sepúlveda y T. Gaona. 2007. Atlas geológico de Colombia. Escala 1:500.000. Bogotá: INGEO-MINAS. Bogotá, D. C., Colombia.
- Ideam. 2013. Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam. Bogotá, D. C., Colombia. 43 pp.
- Junk, W. y K. Furch. 1984. The physical and chemical properties of Amazonian waters and their relationships with the biota. Chapter 1. Pp. 3-14. En: Prance, G. T. y T. Lovejoy (Eds.). *Key Environments Amazonia*. IUCN. Pergamon Press.
- Lasso, C. A. 2014. Tipología de aguas (claras, blancas y negras) y su relación con la identificación y caracterización de los humedales

- de la Orinoquia. Pp. 51-62. *En*: Lasso, C. A., A. Rial, G. Colonnello, A. Machado-Allison y F. Trujillo (Eds.). *XI. Humedales de la Orinoquia (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Lasso, C. A., J. S. Usma, F. A. Villa-Navarro, M. T. Sierra-Quintero, A. Ortega-Lara, L. Mesa, M. A. Morales-Betancourt, O. M. Lasso-Alcalá y M. Patiño. 2014. Peces de la Estrella Fluvial Inírida: ríos Guaviare, Inírida, Atabapo y su confluencia en el Orinoco. Pp. 101-127. *En*: Trujillo, F., J. S. Usma y C. A. Lasso (Eds.). *Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida*. WWF Colombia, CDA, Fundación Omacha, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Mojica, J. I., D. Taphorn y C. Martínez. 2017. Peces de la Serranía de Chiribiquete, Amazonia colombiana: lista preliminar. *Colombia Amazónica* 10: 161-176.
- Morales-Betancourt, M., C. A. Lasso, C. Granados-Martínez y L. Mesa S. 2017. Área de estudio. Pp. 31-46. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). *III. Fauna de Caño Cristales, sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Núñez-Avellaneda, M. y S. R. Duque. 2001. Estudio del fitoplancton en ambientes acuáticos de la Amazonia colombiana. Pp. 305-335. *En*: Franky, C. y C. Zarate (Eds.). *IMANI MUNDO, estudios en la Amazonia colombiana*. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Editorial Unibiblos. Bogotá, D. C., Colombia.
- Ríos-Villamizar, E. A., M. T. F. Piedade, J. G. Da Costa, J. M. Adeney y W. J. Junk. 2013. Chemistry of different Amazonian water types for river classification: A preliminary review. *WIT Transactions on Ecology and the Environment* 178: 17-28.
- Rivera, C., A. Zapata, D. Pérez, Y. Morales, H. Ovalle y J. Alvarez. 2010. Caracterización limnológica de humedales de la planicie de inundación del río Orinoco (Orinoquia, Colombia). *Acta Biológica Colombiana* 15 (1): 145-166.
- Sioli, H. 1965. Bemerkungen zur Typologie amazonischer Flüsse. *Amazoniana* 1 (1): 74-83.
- Sioli, H. 1975. Tropical rivers as expressions of their terrestrial environment. Chapter 19. Pp. 275-288. *En*: Goley, F. y E. Medina (Eds.). *Tropical Ecological Systems. Trend in Terrestrial and Aquatic Research*. Springer-Verlag, New York.
- Suárez, C. F. y J. S. Usma. 2014. Geografía de la Estrella Fluvial de Inírida. Pp. 24-45. *En*: Trujillo, F., J. S. Usma y C. A. Lasso (Eds.). 2014. *Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida*. WWF Colombia, CDA, Fundación Omacha, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Universidad de Antioquia-Centro de Investigaciones Ambientales (UA-CIA). 1990. Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada y los Llanos del Yaré. Proyecto de Colonización. Volumen I. Aspectos generales. Aspectos geológicos. Informe Técnico, Centro de Investigaciones Ambientales-Universidad de Antioquia. Medellín. 160 pp.
- Zárate, C. A. A. Herrera, M. Duarte, W. Villaba y L. Cifuentes. 2005. Plan de manejo básico Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 2005-2009. San Juan de Arama. Meta: Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia. 176 pp.

Anexo 1. Información físico-química de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda.

Macrohábitat	subcuenca	Localidad	Fecha	Latitud	Longitud	pH	Conductividad (µS/cm)	Temperatura (°C)	Sólidos disueltos (ppm)	O ₂ (mg/l)	%O ₂
Caño	Duda	Caño Aguas Claras 2	1/02/2018	2°32'40,3"N	73°55'55,3"W	6,1	13,9	25,6	14	6,59	83,9
		Caño de Jair	1/01/2018			6,5	13	23	8		
		Caño San José	1/02/2018	2°33'6,4"N	73°56'27,3"W	7,3	34	27,1	30	4,9	64,7
		Caño Santo Domingo	1/02/2018	2°34'39,4"N	73°55'55,3"W	7	41,6	29,4	42	6,9	82
		Caño Santo Domingo	1/01/2018	2°34'19,4"N	75°58'13,3"W	6,9	34	25,6	19		
		Caño afluente del Guayabero , margen izq. subiendo	16/02/2016	2°14'51,6"N	73°52'11,6"W	7,97	200	26,1	97		
		Caño Aguas Clara 1	1/07/2018	2°16'59,9"N	73°51'36,4"W	6,45	10	24	5		
	Guayabero	Caño Aguas Claras 1	1/02/2018	2°18'1,3"N	73°52'32,9"W	6,1	6,6	27,4	27,3	4,2	60,4
		Caño Cachirre Mocho	1/07/2018	2°17'31"N	73°52'38,2"W	6,1	19	24,4	9		
		Caño Campamento 1	1/02/2018	2°17'22,3"N	73°52'30,2"W	6,4	17,1	24,6	18	2,73	34,1
		Caño Campamento 2	1/02/2018	2°32'21,4"N	73°45'53,5"W	7	34,5	26,1	35	5,3	68,1
		Caño Canoa, afluente del Guayabero margen derecha	31/11/2016	2°28'29,8"N	73°44'33,2"W	6,26	11	27,4	7		
		Caño Cristales	1/11/2017	2°15'50,4"N	73°47'40,1"W	6,5	10	28,1	6		
		Caño Cristales, debajo de carol cristal	1/11/2016	2°15'45,1"N	73°47'30,3"W	6,04	3,3	29,3	1	5,65	
		Caño Cristales, enfrente de la casa de alojamiento	20/02/2016	2°15'44,6"N	73°47'28,9"W	5,49	3	28	1		
		Caño Cristales, sector Pailones	1/11/2016	2°15'45,1"N	73°43'30,1"W	5,63	3	27,5	4		
		Caño Cristales, sector Pailones	1/11/2017	2°15'58,7"N	73°47'7,4"W	6,1	24	28	14		
		Caño Cristales, sector potrero	1/11/2016	2°15'44,7"N	73°47'13,9"W	5,4	5	28,3	3		
		Caño Cristales, zona corriente	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,87	3	29,5	1		
		Caño de desagüe vía moriche, Ciudad de Piedra	1/07/2018	2°18'34,9"N	73°53'38,4"W	5,83	4	26,2	2		
		Caño de Morichal, afluente de Caño Cristales naciente	28/11/2016	2°18'13,8"N	73°50'3,7"W	4,93	7	27,4	3		
		Caño de Morichal, afluente Laguna El Silencio	28/11/2016	2°14'57,5"N	73°45'33,8"W	5,65	8	25,9	5		

Anexo 1. Continuación

Macrohábitat	subcuenca	Localidad	Fecha	Latitud	Longitud	pH	Conductividad (µS/cm)	Temperatura (°C)	Sólidos disueltos (ppm)	O ₂ (mg/l)	%O ₂
Caño	Guayabero	Caño de Pedro, afluente de caño Nevera	4/10/2016	2°11'3,4"N	73°47'34,1"W	5,55	18	27,9	10		
		Caño detrás de la casa Ecoamem	1/07/2018	2°17'27,9"N	73°52'43,1"W	5,45	7	24,3	3		
		Caño La Cristalina	1/02/2018	2°11'32,5"N	73°51'44,7"W	6,1	7	26	7	5,58	70,6
		Caño Morrocoy, afluente del Guayabero margen izquierda	5/10/2016	2°11'13,8"N	73°46'55,2"W	6,32	19	25,4	11		
		Caño Nevera, afluente río Guayabero margen izquierdo subiendo a la altura de La Macarena	4/10/2016	2°11'4,5"N	73°47'33,9"W	5,73	6	27,2	3		
		Caño NN	1/02/2018	2°11'27,8"N	73°52'27,3"W	5,9	13,4	26,1	14	4,73	59,7
		Caño Soplaculo, afluente guayabero	1/01/2018	2°24'34,5"N	73°54'44,1"W	6,1	3	23	2		
		Caño Temblón	18/02/2016	2°17'33,6"N	73°52'9,5"W	8,22	21	30,8	10		
		Caño Temblón	1/07/2018	2°17'33,3"N	73°52'8,5"W	6,49	4	24,8	2		
		Caño Temblón	1/02/2018	2°17'37,2"N	73°53'9,5"W	6,47	16,4	28,4	16	5,77	73,9
		Carol Cristal	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	6,62	4	30,1	2		
		Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,65	5	30,4	3		
		Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,83	7	30,7	3		
		Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,69	2	30,6	1		
		Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,4	7	30,6	3		
Losada	Losada	Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,5	2	30,5	1		
		Pozos aislados, caño Cristales	20/02/2016	2°15'49,5"N	73°47'35,5"W	5,85	1	30,6	0		
		Quebrada temporal, hilo de drenaje	1/07/2018	2°13'4,3"N	73°54'25,7"W	6,6	34	29	17		

Anexo 1. Continuación

Macrohábitat	subcuenca	Localidad	Fecha	Latitud	Longitud	pH	Conductividad (µS/cm)	Temperatura (°C)	Sólidos disueltos (ppm)	O ₂ (mg/l)	%O ₂
Laguna	Guayabero	Laguna El Silencio, afluente del Guayabero margen derecha	28/11/2016	2°14'44,4"N	73°45'44,9"W	5,72	6	29	3		
		Laguna El Silencio, afluente del Guayabero margen derecha	1/11/2017	2°14'42"N	73°45'41,2"W	6,1	14	27,8	9		
		Laguna Los Bocachicos	1/02/2018	2°31'51,9"N	73°56'4,5"W	7,7	116,5	30,4	15	6,06	83
		Laguna Río Guayabero	1/02/2018	2°17'35,6"N	73°52'32,9"W	7,01	157,7	30,4	158	7,41	104,8
	Losada	Laguna Los Alpes	1/07/2018	2°13'3,9"N	73°54'26,4"W	6,89	41	25,4	20		
Morichal-herbazal	Guayabero	Laguna río Losada	1/02/2018	2°11'42"N	73°51'35,9"W	7,1	7,5	28,3	8	7,2	95,3
		Cafuche morichal-herbasal	1/11/2016	2°14'36,1"N	73°46'23,3"W	5,53	24	26,4	14		
		Cafuche morichal-herbasal	3/11/2016	2°14'40,5"N	73°46'25,5"W	5,32	12	25,8	7		
		Caño Morichal, cerca a la casa de Gilberto Pinto	1/11/2016	2°14'46,5"N	73°45'51,6"W	5,3	14	26,1	7		
	Guayabero	Caño Morichal, ciudad de piedra	1/07/2018	2°18'53,2"N	73°53'54,8"W	5,37	24	25,8	11		
		Morichal de sabana de Manuel Gallina, en sabana afluente río Guayabero margen izquierdo subiendo a la altura de La Macarena	4/10/2016	2°11'23,2"N	73°48'14,3"W	5,33	3	29,7	2		
		Morichal finca Vinatur, de sabana margen derecha subiendo río Guayabero	4/10/2016	2°12'46,9"N	73°48'1,3"W	6,7	19	27,3	12		
		Morichal, bosque finca Mata Cacao, Guayabero	17/02/2016	2°15,1'3,9"N	73°51'48,6"W	6,87	18	26,4	10		
	Losada	Morichal-caño Mirador 1, Raudal (campamento Ecoamem)	1/07/2018	2°17'45"N	73°53'17,7"W	5,26	9	24,2	4		
		Morichal de Fidel, margen derecho subiendo por el Losada	1/07/2018	2°12'58,5"N	73°56'36,7"W	5,83	9	25,2	4		

Anexo 1. Continuación

Macrohábitat	subcuenca	Localidad	Fecha	Latitud	Longitud	pH	Conductividad (µS/cm)	Temperatura (°C)	Sólidos disueltos (ppm)	O ₂ (mg/l)	%O ₂
Río	Duda	Río Duda	7/01/2018	2°34'12,1"N	73°58'37,6"W	7,1	90	28,1	51		
		Río Duda	26/02/2018	2°34'12,1"N	73°58'37,6"W	7,1	151	29	149		
		Río Duda	28/02/2018	2°34'12,1"N	73°58'37,6"W	7,8	108	27,5	108	7	92,6
	Guayabero	Río Guayabero	1/02/2018	2°17'33,7"N	73°52'29,2"W	7,7	66,2	27,8	32	7,06	90,3
		Río Guayabero antes del cajón	1/02/2018	2°18'7,8"N	73°54'37,4"W	7,76	66	28,5	66	7,63	101,7
		Río Guayabero, La Guamera	1/02/2018	2°17'33,7"N	73°52'29,2"W	7,7	56,2	29,5	66	7,2	93,1
		Río Guayabero, abajo cachiveira 2	18/02/2016	2°13'26,1"N	73°51'50,7"W	8,09	53	29,4	27		
		Río Guayabero, cachivera 1 abajo del raudal	17/02/2016	2°17'5,3"N	73°51'49,6"W	7,74	54	28,7	25		
		Río Guayabero, cajón del raudal	17/02/2016	2°17'59,1"N	73°53'26"W	7,44	51	28,6	27		
		Río Guayabero, enfrente Ecoamem	1/07/2018	2°17'3,2"N	73°51'49,5"W	7,4	60	23,3	30		
		Río Guayabero, enfrente de La Macarena	4/10/2016	2°11'16,49"N	73°47'44,4"W	6,71	26	25,5	15		
		Río Guayabero, entre las dos cachiveras antes del raudal, Finca Mata cacao	16/02/2016	2°14'52,3"N	73°52'7,5"W	7,54	83		43		
		Río Guayabero, remanso cajon del Raudal	1/07/2018	2°17'32,51"N	73°52'41,6"W	8,44	5	23,9	34		
		Río Guayabero, sector El Tapir	1/01/2018	2°27'0,7"N	73°56'24,6"W	6,9	58	24,4	33		
		Río Guayabero-macrofitas	1/02/2018	2°17'1,95"N	73°51'50,12"W	7,8	66,2	28,5	66	7,12	94,1
	Losada	Río Losada	18/02/2016	2°12'12,1"N	73°51'27,5"W	8,22	37	31,3	18		
		Río Losada	1/07/2018	2°12'12,6"N	73°51'27,7"W	6,7	21	26,5	10		
		Río Losada	1/07/2018	2°12'24,1"N	73°54'49,9"W	6,89	24	26,4	12		
		Río Losada	4/02/2018	2°11'43"N	73°51'33,3"W	7,8	45,9	31,2	46	7,58	104,6
		Río Losada, laguna de Lucia	1/07/2018	2°12'9,7"N	73°54'59,7"W	6,18	20	26,7	10

Pandion haliaetus. Foto: Jorge E. García-Melo.

Perifiton. Foto: Jorge E. García-Melo.

Ficoperifiton de los ecosistemas acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Marcela Núñez-Avellaneda y Felipe Perdomo

Resumen. Se identificaron 10 clases taxonómicas, 37 familias, 58 géneros y 62 morfoespecies del ficoperifiton, en 17 estaciones correspondientes a tres macrohábitats acuáticos (ríos-cauce principal, caños y lagunas), en el área de influencia de los ríos Guayabero, Losada y Duda, sierra de La Macarena, Meta. Las diatomeas representaron la mayor riqueza de morfoespecies, con un predominio de dos clases: Fragiilariophyceae con el género *Ulnaria* y *Synedra*, y Bacillariophyceae con el género *Encyonema*. Le siguen las desmicias pertenecientes a los géneros *Cosmarium* y *Closterium*. Las especies encontradas y la información fisicoquímica reflejan el carácter oligotrófico o de baja mineralización de estos ecosistemas acuáticos de la sierra de La Macarena.

Palabras clave. Calidad de agua. Desmicias. Diatomeas. Microalgas acuáticas. Perifiton.

Abstract. We identified 11 taxonomic classes, 30 families, 53 genera and 66 morphospecies of phycoperiphyton, from 17 sampling stations in the three main aquatic macro-habitats (main channel of rivers, streams and lagoons), located in the Guayabero, Losada and Duda river drainages, sierra de La Macarena, Colombia. Diatoms had the greatest morphospecies richness, with a predominance of two classes: Fragiilariophyceae with the genera *Ulnaria* and *Synedra*, and Bacillariophyceae with the genus *Encyonema*. These were followed by desmids of the genera *Cosmarium* and *Closterium*. The species found and the physicochemical data recorded reflect the oligotrophic or low mineral content characteristic of these aquatic ecosystems of the sierra de La Macarena.

Keywords. Aquatic microalgae. Desmids. Diatoms. Periphyton. Water quality.

Núñez-Avellaneda, M. y F. Perdomo. 2018. Ficoperifiton de los ecosistemas acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 83-95. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

INTRODUCCIÓN

Las microalgas acuáticas que hacen parte del perifiton, llamadas ficoperifiton, son un componente biótico de gran importancia en la composición, estructura y metabolismo de los ecosistemas acuáticos (Schwarzbold *et al.* 2013). Las condiciones ecuatoriales de los ecosistemas colombianos, favorecen el desarrollo de este grupo de organismos acuáticos y, en el caso de ambientes naturales o antropizados del norte de Suramérica, el perifiton es una de las comunidades más productivas en términos de biomasa para otros niveles tróficos del sistema, entre ellos los peces (García *et al.* 2011). En la Amazonia, Araujo-Lima *et al.* (1886) demuestran que el fitoplancton y el perifiton sostienen las grandes pesquerías de la cuenca, en especial de los peces Characiformes. Un aspecto relevante del perifiton es su papel como bioindicador ambiental (Wu 2017), que en el caso de Colombia ha sido analizado por Pinilla-Agudelo (2016).

Para la cuenca del río Orinoco en Colombia hay muy pocos estudios, entre ellos el de Rivera-Rondón *et al.* (2010), quienes analizaron las comunidades de perifiton y fitoplancton de ríos, quebradas y humedales de los ríos Bitá y Orinoco (Vichada, Colombia) y el de Marciales-Caro (2012) y Duque *et al.* (2013), que describieron especies de Desmidiaceae (algas de la familia Desmidiaceae), asociadas a diversos tipos de ambientes como morichales y lagunas de inundación del Meta, Casanare y Arauca. Respecto a la región de La Macarena, no había estudios de estos grupos (Moreno-Rodríguez *et al.* 2017), pero recientemente Rodríguez-Alvarez *et al.* (Capítulo 8, este libro), realizaron un estudio sobre las algas epifíticas asociadas a *Macarenia clavigera* en Caño Cristales-CC. En este sentido, por la importancia biológica de este grupo y el desconocimiento del mismo, se realizó el inventario de especies que se muestra a continuación. Este trabajo junto con la investigación del epifiton de *M. clavigera* en CC, constituyen las primeras contribuciones al estudio del ficoperifiton en la sierra de La Macarena, Meta, Colombia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de muestreo

El sector de estudio corresponde a la vertiente occidental de la sierra de La Macarena en la zona de vegas y terrazas bajas de los ríos Guayabero, bajo Losada y bajo Duda (González 1989), que pertenecen a la zona hidrográfica del Guaviare (Ideam 2013), Escudo Guayanés, que es una formación antigua tanto del paleozoico como del mesozoico (González 1989). Sin embargo, los tres ríos nacen en los Andes, por lo tanto, sus aguas son barrosas, presentando pH 5,9 a 7,8, conductividad de 6,6 a 157,7 a $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Lasso *et al.* y Granados-Martínez *et al.*, Capítulos 2 y 4, este libro). De acuerdo a parques nacionales se encuentran selvas húmedas, bosques inundables, matorrales y vegetación herbácea de sabana amazónica. El muestreo se realizó en aguas bajas.

Se establecieron 16 estaciones de muestreo, distribuidas en los tres ríos principales o subcuencas (Guayabero, Duda y Losada). En el primer sistema se establecieron siete estaciones de muestreo, en el segundo cuatro y en el último cinco (Figura 1, Anexo 1).

Métodos de colecta

En las aguas corrientes se tuvo como referencia un tramo de 100 m, dividido en 3 sectores; en cada uno se colectaron y rasparon con un cepillo abrasivo 15 rocas sumergidas y con presencia de capa orgánica, en un cuadrante con un área de 6 cm (Figura 2). El material se depositó en envases plásticos para conservarlas con lugol para muestras cuantitativas y con solución “transeau” para muestras cualitativas (Barbour *et al.* 1999 - EPA 841-B-99-002).

Métodos de laboratorio

Las muestras se observaron al microscopio óptico. Para muestras donde predominaron las diatomeas, se realizaron montajes permanentes previa oxidación de las muestras con peróxido de hidrógeno en caliente (CEN-European Committee for Standardization 2003), con algunas modificaciones. Las muestras se analizaron con microscopía óptica.

Figura 1. Estaciones de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 2. Método de colecta. Fotos: Mark Sabaj (a), Jorge E. García-Melo (b).

Se realizó una curva de acumulación según lo recomendado por Wetzel (1981), con las abundancias relativas y el estimador de Chao1.

En la determinación taxonómica de algas fueron tenidos en cuenta los trabajos de Gerrath (2003) y algunas publicaciones de la Amazonia colombiana (Sala *et al.* 2002 a-b, 2008 a-b, Vouilloud *et al.* 2010, Duque y Núñez, 2000) y literatura especializada para diatomeas de Suramérica (Metzeltin y Lange-Bertalot 1998, 2007).

RESULTADOS

Se identificaron 11 clases taxonómicas, 30 familias, 53 géneros y 66 morfoespecies (Anexo 2). Las diatomeas representaron la mayor riqueza de morfoespecies, seguida por las desmídias (Figura 3).

En términos cuantitativos, las diatomeas (Bacillariophyta) y en particular Fragillariophyceae y Bacillariophyceae, fueron las clases con mayor representatividad en todas las estaciones de muestreo, seguidas por las desmídias (Zygnemaphyceae) y las cianobacterias (Cyanophyceae) (Figura 4).

En la figura 5 se observa que los sitios con mayor abundancia de perifiton, fueron el río Guayabero en el sector La Guamera, laguna Los Bocachicos, caño Aguas Claras

1, río Guayabero antes del Cajón, caño Aguas Claras 2 y caño campamento 1.

En el primer análisis taxonómico que se presenta en este documento, se registró una riqueza de 57 morfoespecies que se acerca al estimado de Chao 1, que es de 61 (Figura 6). No obstante, se pudieron evidenciar la presencia de otras morfoespecies (superior a 20), que pertenecen a grupos taxonómicos complejos y de pequeño tamaño que requiere un análisis ultraestructural con microscopía electrónica de barrido. Una parte de estos organismos no identificados se sumarían a la riqueza del sector y se estaría muy cerca del segundo estimador (Chao 2), que indica 86 especies (Figura 6).

A continuación se describe cada grupo en términos de los géneros y las posibles morfoespecies. Respecto a las cianobacterias, se registraron 7 géneros y 9 morfoespecies: *Anabaena* sp., *Pseudanabaena* sp., *Heteroleinbleia* sp.1 y *Heteroleinbleia* sp.2, Cyano filamentosa, *Oscillatoria* sp.1 y sp.2, *Planctothrix* sp. y *Spirulina* sp. (Figura 7). El caño NN, el tramo muestreado del río Losada y la laguna Los Bocachicos (E15), presentaron mayor abundancia del grupo, en particular con *Heteroleinbleia* sp.1 y *Heteroleinbleia* sp.2, Cyano filamentosa y *Pseudanabaena* sp. Las cianobacterias aportan el 8% respecto al abundancia total (Figura 4).

Figura 3. Análisis cualitativo del perifiton.

Figura 4. Abundancia porcentual del perifiton.

Figura 5. Abundancia por estación de muestreo.

Figura 6. Curvas de acumulación de morfoespecies de microalgas perifíticas.

Figura 7. Cianobacterias: a) cf. *Artrospira* sp., b) *Lyngbya* sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Figura 8. Euglenoides: a) *Trachelomonas* sp.1, b) *Trachelomonas* sp.2, c) *Euglena* sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Otro de los grupos que se encontraron, fueron los euglenoides (Euglenophyta) con los géneros y especies: *Trachelomonas* sp.1 y *Trachelomonas* sp.2 (con mayor abundancia porcentual), *Phacus*, cf. *Euglena* y *Lepocinclis* (Figura 8). Se encontraron en ambientes lénticos tipo lagunas del río Guayabero (E3) y Los Bocachicos (E15) y el caño NN (E10).

La clase Oedogoniophyceae, cuenta con el género *Oedogonium* que se registró en el río Losada, caño campamento 1 y caño San José. Las algas verdes (Chlorophyceae) aportan menos del 1% de la abundancia

total. En los macrohábitats se encontraron *Monoraphidium*, *Dictiosphaerum* y *Desmodesmus*. Para el caso de Zygnemaphyceae se encontró en formas unicelulares con los géneros *Netrium*, *Actinotaenium*, *Cosmarium*, *Closterium*, *Staurastrum*, *Gonatozygon*, *Xanthidium*, *Euastrum*, *Micrasterias* y *Staurodesmus* y filamentosas que se posan en el sustrato como *Mougeotia*, *Desmidium* y *Spirogyra*; estas dos ultimas con mayor abundancia en E9 Laguna Lozada y E11 en el caño Campamento, respectivamente (Figura 9).

Figura 9. Algas del grupo desmidiales: a) *Netrium* sp., b) *Desmidium* sp., c) *Cosmarium* sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Figura 10. Diatomeas: a) *Synedra* sp., b) *Ulnaria* sp., c) *Aulacoseira* sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Se destaca la presencia de las diatomeas, en particular de los géneros *Ulnaria* y *Synedra* (Figura 10) y en mayor abundancia diatomeas de tamaño pequeño, principalmente en dos tramos del río Guayabero (antes de cajón y en la Güamera), caños Aguas Claras y La Cristalina.

Los Dinophyceae y Chrysophyceae, llamados también dinoflagelados o crisófitos respectivamente, se registraron únicamente en una laguna del río Losada (E9) (Figura 11). En términos de abundancia estas clases representa menos del 1% respecto a las otras clases taxonómicas.

Figura 11. Dinoflagelado: cf. *Parvodinium*.
Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

DISCUSIÓN

El presente estudio constituye el segundo registro de microalgas del ficoperifiton en la sierra de La Macarena, departamento del Meta, Colombia. Rodríguez-Álvarez *et al.* (Capítulo 8, este libro), estudiaron las algas epifitas asociadas a *Macarenia clavigera* en caño Cristales, quienes reseñan a *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Cosmarium* y *Stauroastrum* como los géneros más abundantes entre las desmídias y *Brachysira*, *Eunotia* y *Frustulia*, entre las diatomeas. Las especies registradas en ambos estudios se encuentran de manera recurrente en sistemas lóticos y lénticos de ambientes neotropicales asociados a ambientes oligotróficos (Núñez-Avellaneda y Duque 2001). Uno de los factores que determina esta condición, se refiere a que el norte de Suramérica posee como condición particular, la presencia del Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta (Gainette-Prates 2011). Esta característica geográfica y geológica, determina la condición que define la presencia de aguas muy pobres, como lo destacaron Furch y Klinge (1978). Estos mismos autores años más tarde (Fuch y Klinge 1982), indican la existencia de esta extrema pobreza de en las aguas de la Amazonia norte, la cual colinda con sectores de la Orinoquia o de la zona transicional entre las dos cuencas, como

son las condiciones del sector de estudio en la sierra de La Macarena.

El Escudo Guayanés es una unidad geológica presente tanto en la Amazonia como en la Orinoquia, con una composición biótica muy particular y única en el planeta (Hoorn *et al.* 2010). En el caso particular de los organismos acuáticos, en especial de las algas del grupo de las desmídias, Coesel (1996), menciona que los mayores endemismos de este grupo están presentes en las cuencas del norte de Suramérica. Metzeltin y Lange-Bertalot (1998, 2007) indican lo mismo para el grupo de las diatomeas.

Estos organismos acuáticos se presentan en ambientes de condiciones de baja mineralización (Lasso *et al.*, Capítulo 2), con conductividades entre bajas a muy bajas, que es un factor que siempre favorece a algunos de estos grupos, tal como señalan Coesel y Meesters (2007), haciendo referencia al carácter oligotrófico de muchas de estas especies. Los trabajos citados en la introducción señalan lo mismo, una predilección particular de las desmídias en aguas pobres y claras, como las estudiadas en la sierra de La Macarena. No obstante, es importante indicar que algunos ríos cercanos al área de estudio, como los ríos de origen andino, pueden tener otras condiciones por su geología. Este es el caso por ejemplo, del río Ariari que posee alta mineralización ($>100 \mu\text{S}/\text{cm}$) (Donato 1987).

En el caso de las diatomeas, estas también son consideradas indicadoras de baja mineralización. Las condiciones limnológicas permiten suponer que estos organismos allí encontrados, deben corresponder a especies con niveles bajos de tolerancia ambiental (estenotolerantes). En otros sectores de la región tanto de la Orinoquia como de la Amazonia, se conoce de un nivel importante de endemismo en este grupo (Metzeltin y Lange-Bertalot 1998, 2007).

El presente trabajo demuestra que los ambientes estudiados tienen condiciones naturales de baja mineralización, con organismos del perifiton que refuerzan esta condición limnológica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio del fítoplancton en los ríos principales y los respectivos afluentes, mostró que la región de la sierra de La Macarena es todavía un área bien conservada desde el punto de vista acuático. A esto se debe sumar el hecho de que las condiciones geográficas del sector asociadas al Escudo Guayanés, determinan que las aguas que nacen o drenan estos lugares sean muy pobres en electrolitos. Estas condiciones se aprecian en la mineralización, el pH y los organismos presentes como las diatomeas y las desmídiadas reportadas.

El análisis de las algas bénticas mostró una alta diversidad para la zona de estudio, particularmente en el grupo de las diatomeas. En este grupo se requiere continuar con el análisis ultraestructural de las muestras, a fin de describir de manera más detallada, las características de las poblaciones. Por sus características oligotróficas, el bajo conocimiento de la zona y ser posibles centros de endemismo, se debe continuar realizando expediciones de este tipo de ambientes para conocer la biodiversidad de la sierra de La Macarena.

BIBLIOGRAFÍA

- Araújo-Lima, C. A. R. M., B. R. Forsberg, R. Victoria y L. Martinelli. 1986. Energy sources for detritivorous fishes in the Amazon. *Science* 234: 1256-1258.
- Barbour, M., J. Gerritsen, B. Snyder y J. Strubling. 1999. Rapid bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. USEPA, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.
- Bejarano, J. 1952. La cordillera de "La Macarena" y la estación "José Jerónimo Triana" *Revista de la Facultad de Medicina* 20 (7): 413-420.
- CEN-European Committee for Standardization. 2003. Water Quality-Guidance for routine sampling and pre-treatment of benthic diatoms from rivers. The University of Glasgow EN 13946. 18 pp.
- Coesel, P. F. M. 1996. Biogeography of desmids. *Hydrobiologia* 336: 41-53.
- Coesel, P. F. M. 1996. Biogeography of desmids. *Hydrobiologia* 336 (1-3): 41-53.
- Coesel, P. F. M. y K. 2007. Meesters. Desmids of the lowland. Stowa Publishers. 351 pp.
- Donato J. 1987. Análisis limnológico y concentración de biocidas en peces de los ríos Ariari, Guayuriba, Humea y Meta. *Revista de la Facultad de Ciencias Universidad Javeriana* 1 (1): 29-52.
- Duque, S. y M. Núñez-Avellaneda. 2000. Microalgas acuáticas de la Amazonía Colombiana. *Biota Colombiana* 1: 208-216.
- Duque, S. R., L. J. Marciales-Caro, D. Castro-Roa, M. G. Cano, M. J. Calderón-Chérrez y R. O. Echenique. 2013. Las algas desmídiáceas como indicadoras: Mateyuca y Flor Amarilla, dos morichales testigo de la biodiversidad del Orinoco. Pp. 153-163. *En*: Lasso, C. A., A. Rial y V. González-B. (Eds.). VII. *Morichales y cananguchales de la Orinoquia y Amazonia: Colombia y Venezuela*. Serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia VII. Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Furch, K. y H. Klinge 1978. Toward a regional characterization of the biogeochemistry of alkali and alkali earth metals in northern South America. *Acta Científica Venezolana* 29 (6): 434-444.
- Furch, K. y H. Klinge 1982. Unusual chemistry of natural waters from the Amazon region. *Acta Científica Venezolana* 33: 269-273.
- Gainette-Prates, L. E. 2011. Evolución del paisaje amazónico desde el Precámbrico. *Revista Brasileira de Geociências* 41 (4): 654-661.

Capítulo 3. FICOPERIFITON DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

- García, J. J., L. M. Celis, E. L. Villalba, L. C. Mendoza, S. B. Brú, V. J. Atencio y S. C. Pardo. 2011. Evaluación del policultivo de bocachico *Prochilodus magdalenae* y tilapia *Oreochromis niloticus* utilizando superficies fijadoras de perifiton. *Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia* 58 (II): 71-83.
- Gerrath, J. F., 2003a. Conjugating Green Algae and Desmids Freshwater Algae of North America. *Ecology and Classification* 353-381.
- Hoorn, C., F. P. Wesselingh, H. ter Steege, M. A. Bermudez, A. Mora, J. Sevink, I. Sanmartín, A. Sanchez-Meseguer, C. L. Anderson, J. P. Figueiredo, C. Jaramillo, D. Riff, F. R. Negri, H. Hooghiemstra, J. Lundberg, T. Stadler, T. Särkinen y A. Antonelli. 2010. Amazonia Through Time: Andean Uplift, Climate Change, Landscape Evolution, and Biodiversity. *Science* 330 (12): 927-921.
- Ideam. 2013. Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam. Bogotá, D. C., Colombia. 43 pp.
- Marciales-Caro, L. 2012. Estudio de desmids de la Orinoquia colombiana. Programa de Maestría en Biología Universidad de los Andes. Bogotá, D. C., Colombia.
- Metzeltin, D. y H. Lange-Bertalot. 1998. Tropical Diatoms of South America I. About 700 predominantly rarely known or new taxa representative of the neotropical flora. *Iconographia Diatomologica* 5. Koeltz, Königstein, Germany. 695 pp.
- Metzeltin, D. y H. Lange-Bertalot. 2007. Tropical diatoms of South America II. Special remarks on biogeographic disjunction. *Iconographia Diatomologica* 18. Koeltz Scientific Books. Königstein. 877 pp.
- Molano, J. M. 1972. Un Tesoro del mundo: La Sierra de la Macarena. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 27 (103): 1-16.
- Moreno-Rodríguez, F., C. I. Caro-Caro, G. A. Pinilla y D. P. Osorio. 2017. Estado actual del conocimiento sobre microalgas del perifiton y macroinvertebrados bentónicos en el departamento del Meta, Colombia. *Acta Biológica Colombiana* 22 (3): 274-306.
- Murillo, M. T. 1997. Los Pteridofitos de la Serranía de La Macarena. *Caldasia* 9 (1-2): 1-9.
- Núñez-Avellaneda, M. y S. R. Duque. 2001. Estudio del fitoplancton en ambientes acuáticos de la Amazonia colombiana. Pp. 305-335. *En: Franky, C. y C. Zarate (Eds.). IMANI MUNDO, estudios en la Amazonia colombiana*. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Editorial Unibiblos. Bogotá, D. C., Colombia
- Pinilla-Agudelo, G. 2016. Algunas experiencias en el uso de índices limnológicos en Colombia. *Acta Biológica Colombiana* 21 (1): Supl. 241-248.
- Rivera-Rondón, C. A. A. M. Zapata, D. Pérez, Y. Morales, H. Ovalle y J. P. Álvarez. 2010. Caracterización limnológica de humedales de la planicie de inundación del río Orinoco (Orinoquia, Colombia). *Acta Biológica Colombiana* 15 (1): 145-166.
- Sala, S. E., S. R. Duque, M. Núñez-Avellaneda y A. A. Lamaro. 2002a. Diatoms from the Colombian Amazonia. *Cryptogamie Algologie* 23: 75-99.
- Sala, S. E., S. R. Duque, M. Núñez-Avellaneda y A. A. Lamaro, 2002b. Diatoms from the Colombian Amazon : some species of the genus *Eunotia* (BACILLARIOPHYCEAE). *Acta Amazonica* 32: 589-603.
- Sala, S. E., J. J. Ramírez e Y. Plata. 2008a. Diatoms from lentic and lotic systems in Antioquia, Chocó and Santander Departments in Colombia. *Revista de Biología Tropical* 56: 1159-1178.
- Sala, S. E., J. J. Ramírez e Y. Plata. 2008b. Diatoms from lentic and lotic systems in Antioquia, Chocó and Santander Departments in Colombia. *Revista de Biología Tropical* 56: 1159-1178.
- Schwarzbold, A., A. L. Burliga y L. C. Torgan. 2013. Ecología do perifiton. San carlos: RiMa Editora. 413 pp.

Vouilloud, A. A., S. E. Sala, M. Núñez-Avellaneda y S. R. Duque. 2010. Diatoms from the Colombian and Peruvian Amazon: the Genera *Encyonema*, *Encyonopsis* and *Gomphonema* (Cymbellales: Bacillariophyceae). *Revista de Biología Tropical* 58: 45-62.

Wetzel, R. G. 2001. *Limnology: Lake and river ecosystems*. Elsevier Inc. 1006 pp.

Wu, Y. 2017. Periphyton. Functions and application in environmental remediation. *Elsevier Inc.* 434 pp.

ANEXOS

Anexo 1. Estaciones de muestreo con sus coordenadas y alturas.

Estación	Altitud m s.n.m.	Coordenadas	
		Longitud	Latitud
E1 Río Guayabero, Guamera	226	02°17'33,7"N	073°52'29,2"W
E2 Laguna Río Guayabero	229	02°17'35,6"N	073°52'32,9"W
E3 Caño Temblón	241	02°17'37,2"N	073°53'09,5"W
E4 Río Guayabero antes de cajón	341	02°18'07,8"N	073°54'37,4"W
E5 Caño Aguas Claras	464	02°18'01,3"N	073°52'32,9"W
E6 Caño La Cristalina	281	02°11'32,5"N	073°51'44,7"W
E7 Río Losada	270	02°11'43,0"N	073°51'33,3"W
E8 Laguna Río Losada	223	02°11'42,0"N	073°51'35,9"W
E9 Caño NN	196	02°11'27,8"N	073°52'27,3"W
E10 Caño Campamento 1	239	02°17'22,3"N	073°52'30,2"W
E11 Caño San José	233	02°33'06,4"N	073°56'27,3"W
E12 Caño Aguas Claras	509	02°32'40,3"N	073°55'55,3"W
E13 Caño Santo Domingo	321	02°34'39,4"N	073°55'55,3"W
E14 Laguna Los Bocachicos	273	02°31'51,9"N	073°56'04,5"W
E15 Río Duda	225	02°34'12,1"N	073°58'37,6"W
E16 Quebrada Campamento	247	02°32'31,4"N	073°45'53,5"W

Capítulo 3. FICOPERIFITON DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

Anexo 2. Lista taxonómica de especies del ficoperifiton de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda.

Phylum	Clase	Orden	Familia	Especie / morfoespecie
Cyanobacteria	Cyanophyceae	Nostocales	Aphanizomenonaceae	<i>Anabaena</i>
		Synechococcales	Heteroleibleiniaceae	<i>Heteroleibleinia</i> sp. 1
				<i>Heteroleibleinia</i> sp. 2
		Oscillatoriales	Oscillatoriaceae	<i>Cyano filamentosa</i>
				<i>Oscillatoria</i> sp. 1
				<i>Oscillatoria</i> sp. 2
		Spirulinales	Microcoleaceae	<i>Planktothrix</i> sp.1
			Spirulinaceae	<i>Arthrospira</i>
Euglenophyta	Euglenophyceae	Euglenales	Synechococcales	<i>Pseudanabaena</i>
			Euglenaceae	cf. <i>Euglena</i>
			Phacaceae	<i>Lepocinclis</i>
			Euglenaceae	<i>Trachelomonas</i> sp. 1
				<i>Trachelomonas</i> sp.2
				<i>Phacus</i>
Chlorophyta	Oedogoniophyceae	Oedogoniales	Oedogoniaceae	<i>Oedogonium</i>
	Chlorophyceae	Sphaeropleales	Microsporaceae	<i>Microspora</i>
			Selenastraceae	<i>Monoraphidium</i>
		Chlorococcales	Chlorellaceae	<i>Dictiosphaerium</i>
			Scenedesmaceae	<i>Desmodesmus</i>
	Zygnemaphyceae	Zygnematales	Zygnemaceae	<i>Mougeotia</i>
				<i>Spirogyra</i>
			Mesotaeniaceae	<i>Netrium</i>
		Desmidiiales	Closteriaceae	<i>Closterium</i>
			Peniaceae	<i>Gonatozygon</i>
			Desmidiaceae	<i>Actinotaenium</i>
				<i>Cosmarium</i>
				<i>Euastrum</i>
				<i>Micrasterias</i>
				<i>Xanthidium</i>
				<i>Staurastrum</i>
				<i>Stauroidesmus</i>
				<i>Hyalotheca</i>
		Zygnematales	Zygnemataceae	<i>Desmidium</i>

Anexo 2. Continuación

Phylum	Clase	Orden	Familia	Especie / morfoespecie
Bacillariophyta	Coscinodiscophyceae	Aulacosiraceae	Aulacosiraceae	<i>Aulacoseira</i>
	Fragilariophyceae	Fragilariales	Fragilariaceae	<i>Fragilariforma</i>
				<i>Ulnaria</i>
				<i>Synedra</i>
				cf. <i>Ceratoneis</i>
	Bacillariophyceae	Eunotiales	Eunotiaceae	<i>Eunotia</i>
		Cymbellales	Cymbellaceae	<i>Encyonema</i>
				<i>Cymbella</i>
			Gomphonemataceae	<i>Gomphonema</i>
		Naviculales	Diadesmidiaceae	<i>Luticola</i>
			Amphipleuraceae	<i>Amphipleura</i>
				<i>Frustulia</i>
			Pinnulariaceae	<i>Pinnularia</i>
			Naviculaceae	<i>Girosigma</i>
				<i>Navicula</i>
			Neidiaceae	<i>Neidium</i>
			Stauroneidaceae	<i>Stauroneis</i>
		Bacillariales	Bacillariaceae	<i>Nitzschia</i>
		Surirellales	Surirellaceae	<i>Cymatopleura</i>
				<i>Surirella</i>
				<i>Stenopterobia</i>
				<i>Cymatopleura</i>
		Achnanthes	Achnanthidiaceae	<i>Achnanthes</i>
			Achnanthidiaceae	<i>Lemnicola</i>
			Achnanthidiaceae	<i>Achnanthidium</i>
		Cocconeidales	Cocconeidaceae	<i>Cocconeis</i>
		Thalassiosiphysales	Catenulaceae	<i>Amphora</i>
Miozoa	Dinophyceae	Peridinales	Lophodiniaceae	cf. <i>Parvidinium</i>
Ochrophyta	Chrysophyceae	Chromulinales	Dinobryaceae	<i>Dinobryon</i>

Chinche (*Belostoma* sp.). Foto: Jorge E. García-Melo.

Macroinvertebrados acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Cristian Granados-Martínez, Carlos A. Lasso, Marcela Núñez-Avellaneda y Monica A. Morales-Betancourt

Resumen. Se caracterizaron las comunidades de los macroinvertebrados acuáticos-MIA asociados a los ríos Guayabero, Losada y Duda en la sierra de La Macarena, Meta, Colombia, durante la estación seca o aguas bajas. Para esto se establecieron 16 estaciones de muestreo en los tres ríos estudiados y sus afluentes. En el primer río se establecieron siete estaciones de muestreo, en el segundo cuatro y en el último cinco. La riqueza de especies (alfa diversidad) fue alta (114 taxones) y las curvas de acumulación evidencian un buen esfuerzo de muestreo. Los órdenes con mayor representación en todo el muestreo fueron Trichoptera, Diptera y Decapoda y los taxones con mayor abundancia relativa fueron *Smicridea*, *Orthocladiinae* y *Macrobrachium amazonicum*, con 25, 9 y 8 %, respectivamente. Las estaciones con las mayores abundancias fueron E1 y E4, ambas pertenecientes al el río Guayabero, mientras que las menores abundancias se encontraron en E16 y E13, ambas en el río Duda. Los microhábitats con mayor abundancia de MIA fueron la hojarasca, seguida de las macrófitas, mientras que los troncos y raíces mostraron las abundancias más bajas. La mayoría de los MIA registrados en este estudio constituyen los primeros reportes para la zona. Por último, la alta diversidad observada podría estar asociada a la confluencia de las diferentes áreas biogeográficas en la región de La Macarena.

Palabras clave. Crustáceos. Escudo Guayanés. Insectos acuáticos. Moluscos. Orinoquia.

Abstract. The communities of the main aquatic macroinvertebrates (MIA) from the Guayabero, Losada and Duda river drainages in the Sierra de La Macarena, Meta, Colombia, were surveyed during the low water dry season. To do this, 16 sampling stations were established in the three rivers studied and their tributaries. In the first river, seven sampling stations were established, in the second four and in the last five. The species richness (alpha diversity) was high (113 taxa) and the accumulation curves show a good sampling effort. The orders with greater representation in the samples collected were Trichoptera, Diptera and Decapoda and the taxa with the highest relative abundance were *Smicridea*, *Orthocladiinae* and *Macrobrachium amazonicum*, with 25.9 and 8%, respectively. The stations with the highest abundances were E1 and E4, both in the Guayabero River, while the lowest abundances were found at E16 and

Granados-Martínez, C., C. A. Lasso, M. Núñez-Avellaneda y M. A. Morales-Betancourt. 2018. Macroinvertebrados acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 97-119. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

E13 both in the Duda River. The microhabitats with the highest abundance of MIA were leaf litter, followed by macrophytes, while trunks and roots showed the lowest abundances. The majority of the MIA species registered in this study are the first records for the area. Finally, the high diversity observed could be associated with the confluence of the different biogeographic areas in the La Macarena region.

Keywords. Aquatic insects. Crustaceans. Guiana Shield. Mollusks. Orinoco River Basin.

INTRODUCCIÓN

La sierra de La Macarena es sin duda un lugar de gran importancia biogeográfica ya que en esta zona confluyen elementos andinos, amazónicos, llaneros y del Escudo Guayanés, razón por la cual se convierte en una zona interesante para conocer su diversidad. A pesar de la proximidad de la Sierra con los Andes orientales, sus orígenes son completamente independientes. La sierra, como gran parte del norte de la Amazonia, es geológicamente parte del Escudo de las Guayanas, que se caracterizan por sus suelos pobres antiguos, mientras que los Andes presentan suelos jóvenes ricos en nutrientes de origen volcánico (Gentry 1990, Mejía 1995). El macizo que configura la sierra de La Macarena es considerado por los geólogos como un domo, constituido en la base por rocas cristalinas del Precámbrico pertenecientes al Escudo de la Guayana. Sobre este basamento se encuentran rocas del Cámbrico y posteriores del Cretáceo y del Terciario (Ordoñez 1978). Dentro del área confluyen ríos importantes como el Guayabero, Losada y Duda. El Duda, que afluye al Guayabero, recibe tributarios que nacen en sierra de La Macarena, mientras que el río Guayabero presenta origen en la cordillera andina en el sector llamado cerro Buenos Aires. Asociados a estos cuerpos de agua se encuentra una fauna de macroinvertebrados típica de la Orinoquia, la Amazonia y los Andes. Los macroinvertebrados acuáticos-MIA son todos aquellos organismos no vertebrados que cuentan con un tamaño superior a 250 μm y que además mantienen una relación directa con el medio acuático por lo menos durante alguna etapa de su ciclo de vida (Hauer y Resh 2006). En este

grupo se incluyen a Mollusca, Annelida, Nematoda Platyhelminthes y Arthropoda. Los Artrópodos el grupo más diverso, en especial los insectos (Hauer y Resh 2007). Los órdenes más importantes de insectos en su etapa larval en el medio acuático, incluyen a Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera, Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera y Odonata (Giller y Malmqvist 1998). Los MIA se encuentran prácticamente en la totalidad de los ecosistemas acuáticos continentales, pero la gran mayoría se desarrollan en los cursos superficiales de agua corriente (Hynes 1970). Los estudios de MIA en la Orinoquia colombiana y en particular en el departamento del Meta, son muy escasos. Granados-Martínez y Batista (2017) caracterizaron los macroinvertebrados asociados al Caño Cristales, un afluente del río Guayabero. Por otro lado, Salinas-Jimenez *et al.* (2017), reportaron la presencia de cinco géneros del orden Ephemeroptera para el departamento del Meta, y González-Castillo y García-García (2017), estudiaron los insectos acuáticos del piedemonte llanero en el sector Cubarral-Meta, identificando al menos 26 especies. Otros estudios que se pueden citar son los realizados en otros afluentes de la región de la Orinoquia, como Camacho-Reyes y Camacho-Rozo (2010), que estudiaron los ciclos vitales de los macroinvertebrados y caracterizaron los microhábitats, en las sabanas de Casanare. Granados-Martínez y Montoya (2017) caracterizaron los MIA asociados al río Bitá en el departamento del Vichada. Salvo el trabajo realizado en Caño Cristales, no existe ninguna publicación sobre los MIA de la sierra de La Macarena, por lo que la presente contribución apunta a llenar ese vacío, más aún cuando

este grupo constituye la base de la cadena trófica de los diferentes drenajes de la región y por ende de las pesquerías y muchos otros procesos ecológicos en sistemas acuáticos muy diferentes desde el punto de vista geoquímico. El objetivo fundamental de este trabajo fue entonces inventariar los MIA acuáticos asociados a los hábitats de los ríos Guayabero, Losada y Duda en la sierra de La Macarena.

MATERIAL Y MÉTODOS

Trabajo en campo

Se establecieron 16 estaciones de muestreo, distribuidas en los tres ríos principales o subcuencas (Guayabero, Duda y Losada). En el primer sistema se establecieron siete esta-

ciones de muestreo, en el segundo cuatro y en el último cinco (Figura 1, Anexo 1).

Se aplicó la técnica de muestreo de multi-hábitats (piedra, hojarasca y raíces) propuesta por Sermeño *et al.* (2010), con la ayuda de una red Surber (0,3 m x 0,3 m; 250 μ m de abertura de malla), con 3 réplicas para cada punto de muestreo. Para moluscos se realizó búsquedas libres caminando o nadando con ayuda de careta en las orillas de los cuerpos de agua y en el caso de crustáceos se emplearon nasas de doble embudo, cebadas con sardinas enlatadas y avena (Figura 2). El material extraído fue preservado en etanol al 96 % y rotulado en bolsas de polietileno para ser transportadas a los laboratorios para su posterior análisis.

Figura 1. Estaciones de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 2. Metodologías utilizadas para la recolecta de macroinvertebrados: a) movilización a las zonas de muestreos, b) muestreo con red Surber; c) búsqueda libre con careta para moluscos y d) nasas. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, c, d), Jorge E. García-Melo (b).

Trabajo en el laboratorio

Las muestras de MIA fueron analizadas en el Laboratorio del Grupo de Investigación en Ecología, Biodiversidad de Ecosistemas Tropicales (EBET) de la Universidad de la Guajira (Laboratorio de Ciencias Biológicas). Las muestras fueron procesadas siguiendo los protocolos recomendados por Domínguez y Fernández (2009), que incluye tamizar (250 μm de poro, lavado, separación manual, almacenamiento (etanol 96%) e identificación mediante las claves de Domínguez y Fernández (2009).

RESULTADOS

Lista de especies/taxones y distribución por subcuencas y microhábitats

Se colectaron 5.323 organismos, distribuidos en cuatro Phylum, cinco clases, 14 órdenes,

57 familias y 114 taxones (Anexo 2). Los órdenes con mayor representación fueron Trichoptera, Diptera y Decapoda, con el 35, 22 y 10 % de la abundancia relativa respectivamente. Los órdenes con menor representación fueron Unionida y Basommatophora. Las familias con mayor representación fueron Hydropsychiidae, Chironomidae y Palaemonidae con el 30, 18 y 9 %, respectivamente. Los taxones con mayor abundancia relativa fueron *Smicridea*, *Orthocladinae* y *Macrobrachium amazonicum*, con 25, 9 y 8 % respectivamente (Figura 3). De los ríos principales el que registró la mayor abundancia fue Guayabero, seguido del Duda y por ultimo Losada con 61, 23 y 15%, respectivamente.

La esponja de agua dulce no identificada (Potamolepidae) de hábitos coloniales no fue considerada en los análisis cuantitativos. Se colectó únicamente en la laguna

de inundación (madrevieja) Los Bocachicos, del río Guayabero, justo debajo de la confluencia Duda-Guayabero.

Las estaciones con las mayores abundancias de MIA fueron E1 y E4, ambas para el río Guayabero, mientras que las menores abundancias se encontraron en E16 y E13,

las dos del río Duda (Tabla 2). De los microhábitats muestreados, la hojarasca, seguida de las macrófitas (Podostemaceae-raudales), fueron los de mayor abundancia, con el 52 y 36 %, mientras que los microhábitats con menores abundancias fueron troncos y raíces con menos del 2% (Figura 4).

Figura 3. Número de individuos de los principales taxones encontrados los ríos Guayabero, Losada y Duda para la época de aguas bajas del 2018.

Tabla 1. Valores de abundancia, riqueza e índices de diversidad (riqueza, Shannon, Simpson y equidad) en las diferentes estaciones muestreadas.

Ríos	Estación	Riqueza	Abundancia	Shannon	Simpson	Equidad
Guayabero	E1	32	1789	1,4	0,6	0,4
	E4	17	775	1,6	0,6	0,6
	E5	31	244	2,9	0,9	0,9
	E10	18	188	2,5	0,9	0,9
	E14	28	240	2,7	0,9	0,8
Total		78	3.266	2,6	0,8	0,6
Losada	E6	40	286	3,1	0,9	0,8
	E7	32	327	2,8	0,9	0,8
	E9	24	204	2,5	0,9	0,8
Total		62	825	3,3	0,9	0,8
Duda	E11	17	376	1,8	0,7	0,6
	E12	24	316	2,6	0,9	0,8
	E13	13	70	2,0	0,8	0,8
	E15	20	325	2,4	0,9	0,8
	E16	17	145	1,9	0,7	0,7
Total		57	1.232	3,2	0,9	0,8

Figura 4. Número de individuos en los principales microhábitats muestreados.

Río Guayabero

En este río se registraron 3.266 individuos, distribuidos en 14 órdenes, 44 familias y 78 taxones. Los órdenes con mayores representaciones fueron Trichoptera y Diptera, con el 44 y 15 %, respectivamente. Las familias con mayores abundancias fueron Hydropsychiadae y Palaemonidae con 41 y 15 %, respectivamente, mientras que los taxones con mayor abundancia fueron *Smicridea* y *Macrobrachium amazonicum*, con 37 y 14 % respectivamente (Anexo 2). En esta ventana la estación con mayor abundancia fue E1, la de menor abundancia fue E10. La mayor riqueza se presentó en E1 y la menor en E4. La diversidad Shannon más alta se dio en E5 y la más alta en E5, E10 y E14. La dominancia Simpson más baja se registró en E1 y E4. La equidad más alta se presentó en E5 y E10, y la más baja en E1 (Tabla 1). Aquí se colectó la única especie de esponja (Potamolepidae).

Río Losada

En este río se recolectaron 825 individuos, distribuidos en diez órdenes, 35 familias y 62 taxones. Los órdenes con mayores representaciones fueron Diptera y Trichoptera con el 35 y 20 %, respectivamente. Las familias con mayores abundancias fueron Chironomidae y Leptoceridae con 32 y 10% respec-

tivamente, mientras que los taxones con mayor abundancia fueron *Orthocladiinae* y *Tanypodinae* con 16 y 9 %, respectivamente (Anexo 2). En esta ventana la estación con mayor abundancia fue E7. La mayor riqueza se presentó en E6. La diversidad Shannon más alta de registró en E6. La dominancia Simpson y la equidad presentaron valores altos y fueron similares para todas las estaciones (Tabla 1).

Río Duda

Para esta subcuenca se registraron 1.232 individuos, distribuidos en nueve 12 órdenes, 34 familias y 58 taxones. Los órdenes con mayores representaciones fueron Diptera y Trichoptera con el 33 y 21%, respectivamente; las familias con mayores abundancias fueron Chironomidae y Hydropsychiadae ambas con el 14%, mientras que los taxones con mayor abundancia fueron *Orthocladiinae* y *Smicridea* con 18 y 9%, respectivamente (Anexo 1). En esta ventana la estación con mayor abundancia fue E11. La mayor riqueza se presentó en E12. La diversidad Shannon más alta de registró en E12. La dominancia Simpson más alta se registró en E12 y E15, mientras que la equidad más alta se presentó en E12, E13 y E15 (Tabla 1).

Curva acumulada de especies

La riqueza de especies registrada fue alta, las curvas de acumulación evidencian un buen esfuerzo de muestreo lo cual se apoya en la tendencia expuesta en la curva de acumulación por los estimadores de riqueza (taxones). Las curvas tienden a la asíntota y presentaron una efectividad del 87-100 % para los muestreos realizados (Figura 5).

DISCUSIÓN

Los valores calculados por las curvas de acumulación indican que el muestreo fue apropiado y señalan que los afluentes (subcuencas) muestreados presentan una alta diversidad (114 taxones en 16 estaciones), en comparación con otros sistemas. Una explicación a este alto valor de riqueza encontrado en pocas estaciones, se debe a las condiciones de conservación, lo cual sumado a la heterogeneidad de macro-hábitats o tipos de humedal y microhábitats evaluados, hacen que los valores de diversidad de macroinvertebrados sean altos (Granados-Martínez y Batista 2017). Se muestrearon sistemas lóticos como cauces principales de los grandes ríos, caños de diferente porte, quebradas y otros sistemas lénticos como lagunas y madre viejas. Según los resultados, los órdenes Trichoptera, Diptera y

Decapoda, fueron los de mayor abundancia y frecuencia en el muestreo, coincidiendo con lo encontrado por Granados-Martínez y Batista (op. cit.), que señalan a los órdenes Trichoptera, Diptera como los más abundantes en Caño Cristales y afluentes. Este patrón de dominancia de los órdenes es similar a lo reportado en otros sistemas lóticos característicos del Neotrópico (Jacobsen *et al.* 2008, Boyero y Bailey 2001), aunque estos resultados contrastan con lo reportado por Rivera *et al.* (2010) y con Zamora-González (2015), quienes señalan a los órdenes Coleoptera y Odonata como los más comunes en humedales de la planicie de inundación del río Orinoco y piedemonte llanero, respectivamente, hecho también confirmado por los estudios de González-Castillo y García-García (2017), que encontraron en ríos y quebradas del piedemonte, un mayor número de especies de coleópteros y odonatos (6 sp. c/u), en relación a los tricópteros y dípteros. Pareciera entonces que Trichoptera y Diptera son los grupos más diversos en ríos de piedemonte de la sierra de La Macarena en el Escudo Guayanés, mientras que Coleoptera y Odonata lo son en ríos de piedemonte andino. La riqueza determinada en este estudio fue mayor a la reportada por Granados-Martínez y Batista (2017), Zamora-González (2015) y González-Castillo

Figura 5. Curva de acumulación de entidades taxonómicas de macroinvertebrados acuáticos asociados a los ríos Guayabero, Losada y Duda.

y García-García (2017), que encontraron 74 taxones asociados a Caño Cristales y 56 y 26 taxones respectivamente, en ríos del piedemonte llanero del departamento del Meta, contrastando con los 110 taxones encontrados en este estudio. Estas diferencias están determinadas en gran medida como se mencionó anteriormente, por la escala y el mayor área de muestreo en el presente estudio, así como por la confluencia de elementos faunísticos con influencia de tres biotas diferentes (llanera, andina y guayanesa). Este último factor es de gran importancia y determina no solo la riqueza sino la composición faunística. De igual manera, al comparar la riqueza de MIA del sistema Guayabero-Duda-Losada, con otros ríos de la Guayana colombo-venezolana, este valor de 114 taxones, sigue siendo muy alto: río Bitá-Vichada 87 taxones (Granados y Montoya 2016); 74 en el alto Cuyuní, Venezuela (El Souki *et al.* 2015); 60 en la confluencia de los ríos Ventuari-Orinoco (Pereira y García 2006, Pereira *et al.* 2006), siendo solo superado por el estudio de Mora-Day y Blanco-Belmonte (2008) en el alto río Paragua, donde registraron 112 taxones. Los taxones *Smicridea*, *Orthocladinae* y *Macrobrachium amazonicum*, fueron los de mayor representación en el muestreo. El género *Smicridea* se observó asociado principalmente a las macrófitas (*Apinagia* sp.-Podostemaceae), donde sus abundancias fueron muy altas, comportamiento relacionado posiblemente al hecho de que el muestreo coincidió con los patrones de reproducción en estos microhábitas, ya que se encontraron muchas larvas pequeñas. La subfamilia *Orthocladinae* se caracteriza por que viven en ambientes tanto de aguas lóxicas como lénticas, pero con abundante materia orgánica en descomposición. El microhábitat con mayor abundancia fue la hojarasca, y la tendencia a una mayor diversidad de macroinvertebrados en este tipo sustrato de hojarasca, sugiere que esté micro-hábitat puede ser muy importante para el mantenimiento de la diversidad local durante el periodo de aguas bajas. La mayor complejidad del hábitat suele estar

relacionada con una mayor diversidad de invertebrados bentónicos (Thomaz *et al.* 2008), como fue registrado en el trabajo de Granados-Martínez y Batista (2017) en Caño Cristales, un afluente típico del Escudo en la sierra de La Macarena.

La riqueza de crustáceos fue relativamente baja (dos especies de camarones y dos de cangrejos), si se compara con otros complejos de ecosistemas acuáticos de tierras bajas en el Escudo bien estudiados y que muestran una riqueza carcinológica muy elevada, como el río Bitá (10 sp., Acevedo *et al.* 2017), Estrella Fluvial de Inírida o confluencia ríos Orinoco-Guaviare-Inírida-Atabapo (10 sp., Lasso obs. pers.) y Orinoco-Ventuari (10 sp., Pereira y García 2006).

Respecto a los moluscos se identificaron siete especies (tres caracoles y cuatro bivalvos), lo que indicaría elevada riqueza para este grupo.

Otro elemento a destacar es la presencia de una especie de esponja dulce no identificada de la familia Potamolepidae en el río Guayabero (laguna/madrevieja), distinta a la registrada en Caño Cristales por Granados y Batista (2017). Estos registros son de importancia ya que no hay información de este grupo para la zona y el país.

Por último, es importante destacar que los valores de diversidad Shannon y los índices de dominancia y equidad, representan un valor medio, lo cual, de acuerdo a los intervalos propuestos por Margalef (1983) para estos índices, mostraría que la comunidad no está siendo afectada por tensores ambientales diferentes a los de origen natural. La mayoría de los macroinvertebrados encontrados en este estudio representan los primeros reportes para ríos de la sierra de La Macarena, siendo este en un importante reservorio de diversidad de MIA para el país. La diversidad de MIA encontrada en estos afluentes fue muy alta, la mayor hasta el momento para la Orinoquia colombiana, hecho debido como se mencionó anteriormente, a la confluencia de las diferentes áreas biogeográficas, más otros factores ecológicos actuales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La diversidad de MIA reportada en estos tres ríos (Guayabero, Duda y Losada) y sus afluentes, puede ser considerada como muy alta. La mayoría de los taxones identificados son indicadores de buenas condiciones del agua, lo cual es un reflejo del óptimo estado de conservación que presentan los ríos asociados a la sierra de La Macarena. Este trabajo representa una línea base para futuros estudios de macroinvertebrados en el departamento

del Meta y el Escudo Guayanés colombiano. Se recomienda realizar inventarios con mayor intensidad de muestreo, en especial en los ríos, quebradas y caños de cabecera de la Sierra en un gradiente altitudinal, así como en la parte más baja de la cuenca del Guayabero, a objeto de seguir enriqueciendo e incrementando el conocimiento de la biodiversidad de estas zonas de mucha importancia ecológica para el país que permanecen todavía desconocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, A., C. A. Lasso y M. A. Morales-Betancourt. 2017. Crustáceos. Pp. 105-119. *En*: Trujillo, F. y C. A. Lasso (Eds.). *IV. Biodiversidad del río Bita, Vichada, Colombia*. Serie Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., Colombia.
- Boyero, L. y R. C. Bailey. 2001. Organization of macroinvertebrate communities at a hierarchy of spatial scales in a tropical stream. *Hydrobiologia* 464: 219-225.
- Domínguez, E. y H. R. Fernández. 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: sistemática y biología. 1a ed. - Tucumán: Fund. Miguel Lillo. 656 pp.
- El Souki, M., L. Blanco-Belmonte, C. A. Lasso, J. Mora-Day, C. Magalhaes, D. Pisapia y O. M. Lasso-Alcalá. 2015. Composición y distribución de la comunidad de insectos acuáticos en un gradiente longitudinal del alto río Cuyuní, Guayana venezolana. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 71 (175-176): 79-103.
- Gentry, A. H. 1990. La región Amazónica. *En*: Villegas, J. B. y C. Uribe (Eds.). *Selva Húmeda de Colombia*. Villegas Editores. Bogotá D. C., Colombia.
- González-Castillo, N. S. y A. García-García. 2017. Insectos acuáticos. Pp. 251-285. *En*: García-
- García, A. (Ed.). *Artrópodos del piedemonte llanero: Cubarral-Meta*. Cormacarena. Bogotá, D. C., Colombia.
- Granados, C. y A. Batista. 2017. Macroinvertebrados acuáticos. Pp. 47-65. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). *III. Fauna de Caño Cristales, sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Granados, C. y D. Montoya. 2017. Macroinvertebrados acuáticos. Pp. 120-142. *En*: Trujillo, F. y C. A. Lasso (Eds.). *IV. Biodiversidad del río Bita, Vichada, Colombia*. Serie Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Jacobsen, D., C. Cressa, J. M. Mathooko y D. Dudgeon. 2008. Macroinvertebrates: Composition, life histories and production. Pp. 66-106. *En*: Dudgeon, D. (Ed.). *Tropical stream ecology*. London: Academic Press (Aquatic Ecology Series).
- Lasso, C. A., J. C. Senaris y L. E. Alonso. 2006. Evaluación rápida de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos en la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, Estado Amazonas (Venezuela). *Boletín RAP de Evaluación Biológica* 30. Conservation International. Washington DC, USA. 240 pp.

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

- Margalef, R. 1983. Limnología. Omega, Barcelona. 1010 pp.
- Martínez-Escarbassiere, R., A. Cabrera y C. A. Lasso. 2013. Moluscos bivalvos (Unionacea y Mustelacea) de la cuenca del río Orinoco, Venezuela. *Memoria de la Fundación La salle de Ciencias Naturales* 159-160: 283-303.
- Mejia, C. A. 1995. Fauna de La Serranía de La Macarena. Amazonas Editores y Ediciones Uniandes. Bogotá. D. C., Colombia.
- Montoya, Y. y N. Aguirre. 2009. Estado del arte de la Limnología en lagos de planos inundables. *Gestión y Ambiente* 12: 85-105.
- Mora-Day, J. y L. Blanco-Belmonte. 2008. Macroinvertebrados acuáticos del alto río Paragua, cuenca del río Caroní, Estado Bolívar, Venezuela. Pp. 97-109. *En*: Señaris, J., C. A. Lasso, L. Alonso y A. L. Flores (Eds.). *RAP Bulletin of Biological Assessment* 49. Conservation International. Washington DC, USA.
- Ordoñez, T. 1978. El caso de la Macarena. *Boletín de la sociedad geográfica de Colombia* 112 (31): 1-7.
- Pereira, G. y J. V. García. 2006. Crustáceos decápodos de los ecosistemas acuáticos de la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari. Pp. 107-113. *En*: Lasso, C. A., J. C. Señaris, L. Alonso y A. L. Flores (Eds.). *RAP Bulletin of Biological Assessment* 30. Conservation International. Washington DC, USA.
- Pereira, G., J. V. García, A. Marcano, O. M. Lasso-Alcalá y R. Martínez-Escarbassiere. 2006. Los macroinvertebrados bentónicos de la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari. Pp. 96-106. *En*: Lasso, C. A., J. C. Señaris, L. Alonso y A. L. Flores (Eds.). *RAP Bulletin of Biological Assessment* 30. Conservation International. Washington DC, USA.
- Rivera, C, A. Zapata, D. Pérez, Y. Morales, H. Ovalle y J. Alvarez. 2010. Caracterización limnológica de humedales de la planicie de inundación del río Orinoco (Orinoquía, Colombia). *Acta Biologica Colombiana* 15 (1): 145-166.
- Roldán, G. P. 2012. Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bogotá, D. C., Colombia. 148 pp.
- Salinas-Jiménez, L., J. Rojas-Peña, D. Osorio-Ramirez y C. Caro-Caro. 2017. Nuevos registros de Ephemeroptera para la cuenca colombiana del Orinoco en el departamento del Meta. *Revista Colombiana de Entomología* 43 (2): 271-276.
- Thomaz, S., E. Dibble, L. Evangelista, J. Higuti y L. Bini. 2008. Influence of aquatic macrophyte habitat complexity on invertebrate abundance and richness in tropical lagoons. *Freshwater Biology* 53 (3) 58-367.
- UAESPNN. Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. 2005. Plan de manejo 2005-2009. Unidad Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia Direccion Territorial Amazonia Orinoquia San Juan De Arama (Meta). 159 pp.
- Zamora-González H. 2015. Macroinvertebrados acuáticos registrados durante la época de lluvias en tres ríos del piedemonte llanero de Colombia. *Revista Colombiana Ciencias Animales* 7 (2): 139-147.

ANEXOS

Anexo 1. Estaciones de muestreo con sus coordenadas y alturas.

Estación	Altitud (m s.n.m.)	Coordenadas	
		Longitud	Latitud
E1 Río Guayabero, Guamera	226	02°17'33,7"N	073°52'29,2"W
E2 Laguna Río Guayabero	229	02°17'35,6"N	073°52'32,9"W
E3 Caño Temblón	241	02°17'37,2"N	073°53'09,5"W
E4 Río Guayabero antes del Cajón del Raudal	341	02°18'07,8"N	073°54'37,4"W
E5 Caño Aguas Claras	464	02°18'01,3"N	073°52'32,9"W
E6 Caño La Cristalina	281	02°11'32,5"N	073°51'44,7"W
E7 Río Losada	270	02°11'43,0"N	073°51'33,3"W
E8 Laguna Río Losada	223	02°11'42,0"N	073°51'35,9"W
E9 Caño NN	196	02°11'27,8"N	073°52'27,3"W
E10 Caño Campamento 1	239	02°17'22,3"N	073°52'30,2"W
E11 Caño San José	233	02°33'06,4"N	073°56'27,3"W
E12 Caño Aguas Claras	509	02°32'40,3"N	073°55'55,3"W
E13 Caño Santo Domingo	321	02°34'39,4"N	073°55'55,3"W
E14 Laguna Los Bocachicos	273	02°31'51,9"N	073°56'04,5"W
E15 Río Duda	225	02°34'12,1"N	073°58'37,6"W
E16 Quebrada Campamento	247	02°32'31,4"N	073°45'53,5"W

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 2. Clasificación taxonómica y abundancia de los macroinvertebrados encontrados en la cuenca del río Guayabero. Abreviaturas: Guayabero-Gua, Duda-Du y Losada- Lo. Taxa con fotografía en el anexo 3.

Phylum	Clase	Orden	Familia	Taxón	Gua	Du	Los
Annelida	Clitellata	Hirudinida	Glossiphoniidae	Glossiphoniidae	24	12	15
Arthropoda	Insecta	Trichoptera	Calamoceratidae	<i>Phylloicus</i>	14	0	11
			Glossosomatidae	<i>Protoptila</i>	14	0	0
			Helicopsychidae	<i>Helicopsyche</i>	12	0	0
			Hydropsychiidae	<i>Leptonema*</i>	129	49	20
				<i>Macronema</i>	13	0	1
				<i>Macrostemum</i>	3	6	7
				<i>Smicridea*</i>	1211	111	16
				<i>Synoestropsis*</i>	0	9	10
			Hydroptilidae	<i>Leucotrichia</i>	3	0	0
				<i>Oxyethira</i>	1	0	0
			Leptoceridae	<i>Atanatolica*</i>	10	17	55
				<i>Nectopsyche</i>	12	8	29
			Odontoceridae	<i>Marilia*</i>	14	0	7
			Philopotamidae	<i>Chimarra</i>	0	32	0
			Polycentropodidae	<i>Cyrnellus*</i>	0	34	4
				<i>Polycentropus</i>	0	0	4
		Plecoptera	Perlidae	<i>Anacroneuria*</i>	56	57	33
		Odonata	Calopterygidae	<i>Hetaerina</i>	0	2	0
			Coenagrionidae	<i>Argia*</i>	19	8	4
			Gomphidae	<i>Agriogomphus*</i>	0	3	0
				<i>Phyllocycla*</i>	0	3	0
				<i>Progomphus*</i>	3	0	6
			Libellulidae*	<i>Aeschnosoma</i>	20	0	3
				<i>Brechmorhoga</i>	18	0	13
				<i>Diastatops</i>	1	0	0
				<i>Libellula</i>	16	3	0
			Platystictidae	<i>Palaemnema</i>	0	5	0
		Megaloptera	Corydalidae	<i>Corydalis*</i>	3	49	0
		Lepidoptera	Crambidae	<i>Petrophila*</i>	296	7	0

Anexo 2. Continuación

Phylum	Clase	Orden	Familia	Taxón	Gua	Du	Los
Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Belostomatidae	<i>Belostoma*</i>	7	1	46
			Gelastocoridae	<i>Heterocorixa</i>	0	0	2
			Gerridae	<i>Brachymetra</i>	0	4	2
				<i>Neogerris</i>	3	0	5
				<i>Tachygerris</i>	5	0	2
			Naucoridae	<i>Ambrysus*</i>	4	5	0
				<i>Limnocoris*</i>	11	6	0
				<i>Pelocoris</i>	1	2	1
			Nepidae	<i>Ranatra*</i>	4	0	1
				<i>Martarega</i>	2	0	1
			Noteridae	<i>Tenagobia</i>	6	0	0
			Veliidae	<i>Mesovelia</i>	11	0	6
				<i>Microvelia</i>	6	0	3
				<i>Rhagovelia</i>	5	0	5
				Baetidae*	19	7	8
				<i>Callibaetis</i>	13	6	12
		Ephemeroptera	Baetidae	<i>Camelobaetidius</i>	4	0	8
			Caenidae	<i>Caenis</i>	0	0	6
			Euthyplocidae	<i>Campylocia</i>	0	4	0
			Leptohyphidae	<i>Tricorythodes</i>	16	7	4
				<i>Tricorythopsis</i>	0	2	0
			Leptophlebiidae*	<i>Hydrosmylodon*</i>	36	34	0
				<i>Miroculis</i>	38	21	42
				<i>Terpides</i>	0	0	18
				<i>Ulmeritoides*</i>	45	0	0
			Oligoneuriidae	<i>Oligoneuriidae</i>	1	0	0
			Polymitarciidae	<i>Asthenopus*</i>	0	24	0
				<i>Campsurus</i>	0	2	0
				<i>Tortopsis</i>	0	10	0
				<i>Tortopus</i>	0	83	0
			Ephemeridae	<i>Hexagenia*</i>	0	3	0

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 2. Continuación

Phylum	Clase	Orden	Familia	Taxón	Gua	Du	Los
Arthropoda	Insecta	Diptera	Ceratopogonidae	<i>Bezzia</i>	9	0	10
			Chaoboridae	<i>Chaoborus</i>	6	0	0
			Chironomidae	Chironominae*	67	82	56
				Orthocladiinae	146	223	128
				Tanypodinae	100	80	76
			Culicidae	<i>Culex</i>	70	0	6
			Empididae	<i>Hemerodromia</i>	1	2	0
			Simuliidae	<i>Simulium</i>	88	25	0
			Stratiomyidae	Stratiomyidae	4	0	4
			Tabanidae	<i>Tabanus</i>	3	0	3
				<i>Limonia</i>	2	0	2
			Tipulidae	<i>Tipula</i> *	0	0	2
		Coleoptera	Cureulionidae	Cureulionidae	0	2	0
			Ptilodactylidae	<i>Anchytarsus</i>	0	1	0
			Dytiscidae	<i>Gyretes</i>	4	0	2
				<i>Hydaticus</i>	2	0	2
				<i>Hydrocanthus</i>	3	2	6
				<i>Hydrodessus</i>	9	0	0
				<i>Hydrovatus</i> *	0	67	0
				<i>Laccophilus</i>	4	0	4
				<i>Megadytes</i> *	5	1	4
				<i>Suphis</i>	0	0	8
				<i>Vatellus</i> *	0	12	0
			Elmidae	<i>Disersus</i>	3	0	0
				<i>Heterelmis</i>	12	0	58
				<i>Hexanchorus</i>	3	0	0
				<i>Hintonelmis</i>	13	3	0
				<i>Macrelmis</i> *	0	15	0
				<i>Phanocerus</i>	3	4	0
				<i>Stegoelmis</i>	6	4	6
				<i>Xenelmis</i>	4	0	0
			Hydrochidae	<i>Hydrochus</i>	0	2	0
			Hydrophilidae	<i>Deralus</i> *	7	6	1
				<i>Hydrophilus</i> *	0	11	4

Anexo 2. Continuación

Phylum	Clase	Orden	Familia	Taxón	Gua	Du	Los
Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Lampyridae	Lampyridae	0	3	0
			Lutrochidae	<i>Lutrochus</i>	11	0	0
			Psephenidae	<i>Psephenops</i>	5	0	4
			Ptilodactylidae	<i>Anchytarsus</i>	0	2	0
			Scirtidae	<i>Elodes</i>	6	0	9
			Staphylinidae	Staphylinidae*	0	4	0
	Malacostraca	Decapoda	Palaemonidae	<i>Macrobrachium amazonicum</i> *	458	0	0
				<i>Macrobrachium brasiliensis</i> *	26	8	4
				<i>Macrobrachium nattereri</i>	0	3	1
			Trichodactylidae	<i>Moreirocarcinus emarginatus</i> *	4	0	4
				<i>Valdivia serrata</i> *	0	37	4
Mollusca	Bivalvia	Unionida	Mycetopodidae	<i>Anodontites trapesialis</i> *	30	0	0
				<i>Mycetopoda soleniformis</i> *	0	0	6
			Hyriidae	<i>Castalia orinocensis</i>	0	0	1
				<i>Diplodon losadae</i>	1	-	1
	Gastropoda	Basommatophora	Planorbidae	Planorbidae	0	3	0
		Architaenioglossa	Ampullariidae	<i>Pomacea cf. lineata</i>	1	0	0
				<i>Pomacea maculata</i> *	20	0	0
Porifera	Demospongiae	Spongillida	Potamolepiidae	No identificado	1	0	0

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 3. Catalogo de especies.

1. *Leptonema*.

2. *Smicridea*.

3. *Synoestropsis*.

4. *Atanatolica*.

5. *Marilia*.

6. *Cyrnellus*.

Lamina 1. Fotos: 1, 3, 5, 6. Jorge E. García-Melo; 2, 4. Cristian Granados-Martínez.

Anexo 3. Continuación.

7. *Anacronetia*.

8. *Argia*.

9. *Agriogomphus*.

10. *Phyllocycla*.

11. *Progomphus*.

12. Libellulidae.

Lamina 2. Fotos: 6-8, 10, 12. Jorge E. García-Melo; 9, 11. Cristian Granados-Martínez.

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 3. Continuación.

13. *Corydalus*.

14. *Petrophila*.

15. *Belostoma*.

16. *Ambrysus*.

17. *Limnocoris*.

18. *Ranatra*.

Lamina 3. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

19. Baetidae.

20. *Campylocia*.

21. *Hydrosmylodon*.

22. *Mioculis*.

23. *Ulmeritoides*.

24. *Asthenopus*.

Lamina 4. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 3. Continuación.

25. *Hexagenia*.

26. Chironominae.

27. *Tipula*.

28. *Hydrovatus*.

29. *Megadytes*.

30. *Vatellus*.

Lamina 5. Fotos: 25-27, 29. Jorge E. García-Melo; 28, 30. Cristian Granados-Martínez.

Anexo 3. Continuación.

31. *Macrelmis*.

32. *Deralus*.

33. *Hydrophilus*.

34. Staphylinidae.

35. *Macrobrachium amazonicum*.

36. *Macrobrachium brasiliensis*.

Lamina 6. Fotos: 31, 34. Cristian Granados-Martínez; 32, 33, 35, 36. Jorge E. García-Melo.

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Anexo 3. Continuación.

37. *Moreirocarcinus emarginatus*.

38. *Valdivia serrata*.

39. *Anodontites trapesialis*.

40. *Mycetopoda soleniformis*.

41. *Pomacea maculata*.

Lamina 7. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Camarón (*Macrobrachium brasiliensis*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Bagre amarillo (*Zungaro zungaro*). Foto: Mark Sabaj.

Peces de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Carlos DoNascimento, Lina M. Mesa S., Juan G. Albornoz-Garzón, Alejandro Méndez-López, Carlos A. Lasso, Jorge E. García-Melo, Mark H. Sabaj y Mónica A. Morales-Betancourt

Resumen. Se presentan los resultados de la evaluación ictiológica de los ríos Guayabero, Duda y Losada (subcuenca del alto río Guaviare, cuenca del Orinoco, Colombia), en drenajes suroccidentales de la sierra de La Macarena (Meta). La riqueza reportada es de 242 especies (194 sp. colectadas, 16 sp. registradas por encuestas y 32 sp. registradas y confirmada su validez, provenientes de información secundaria), distribuidas entre nueve órdenes, de los cuales Characiformes fue el mejor representado (111 sp., 45,9%), seguido por Siluriformes con 96 especies (39,7%), los restantes órdenes presentaron entre una y 16 especies (0,4 - 6,6%). Fueron identificadas 40 familias para la región, de las cuales las que presentaron la mayor riqueza específica fueron Characidae (52 sp. 21,5%), Loricariidae (28 sp., 11,6%) y Pimelodidae (22 sp., 9,1%). El río Losada fue el que presentó la mayor riqueza de especies colectadas (125 sp., 38,26%), seguido por el río Guayabero (113 sp., 32,98%) y el río Duda (83 sp., 28,75%). Se registran 11 especies probablemente nuevas para la ciencia, cinco nuevos registros para Colombia, diez registros nuevos para la cuenca del Orinoco, 22 especies endémicas de Colombia y 45 especies con valor para el consumo.

Palabras clave. Cuenca alta del río Guaviare. Escudo Guayanés. Ictiofauna. Inventario regional. Orinoquia.

Abstract. We present the results of an ichthyological survey of the Guayabero, Duda and Losada rivers (sub-drainages of the upper Guaviare River, Orinoco basin, Colombia), in southwestern drainages of the sierra de La Macarena, Meta, Colombia. A total of 242 fish species are reported here (194 species were collected, 16 species were recorded by other surveys and 32 species of confirmed validity are from secondary sources). They are distributed among nine orders, of which Characiformes was the best represented (111 species, 46.5%), followed by Siluriformes with 96 species (39.2%). The remaining seven orders had from 1 to 16 species (0.4 - 6.5%). Forty families were identified for the region, of which those with the highest specific richness were Characidae (54 species 22%), Loricariidae (28 species, 11.4%) and Pimelodidae (22 species, 9.0%). The Losada River had the highest species richness (125 species,

DoNascimento, C., L. M. Mesa S., J. G. Albornoz-Garzón, A. Méndez-López, C. A. Lasso, J. E. García-Melo, M. H. Sabaj y M. A. Morales-Betancourt. 2018. Peces de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 121-177. *En*: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

38.26%), followed by the Guayabero (113 species, 32.98%) and the Duda River (83 species, 28.75%). The fishes include 12 species that are probably new for science, five new records for Colombia, ten new records for the Orinoco River basin, 22 species endemic to Colombia and 45 species with commercial value for human consumption.

Keywords. Guiana Shield. Ichthyofauna. Orinoco River Basin. Regional inventory. Upper Guaviare river drainage.

INTRODUCCIÓN

La cuenca del río Orinoco constituye uno de los sistemas hídricos más extensos de Suramérica, con un área total de 98.446 km², de los cuales, el 35% corresponde al territorio colombiano (Lasso *et al.* 2016). Los tributarios colombianos se distinguen por originarse en la cordillera oriental de los Andes (p. e. ríos Meta y Guaviare), o en las planicies altas de los llanos orientales en el Escudo Guayanés (p. e. ríos Bitá, Tomo, Vichada), configurando un amplio mosaico de formaciones geológicas y de ecosistemas a lo largo de su recorrido. Esta diversidad de ambientes se traduce en el registro de 675 especies de peces para la porción orinoquense colombiana, ocupando la segunda posición de los principales sistemas hidrográficos del país con mayor diversidad íctica (DoNascimento *et al.* 2017, 2018a, b).

Los ríos Meta y Guaviare son los principales tributarios de origen andino en Colombia, destacando el primero, con el mayor número de especies reportadas dentro de la cuenca del Orinoco (577 sp.) (Usma *et al.* 2016). En contraste, sólo se han listado 94 especies en la cuenca del río Guaviare (Lasso *et al.* 2004), lo cual no es un reflejo fidedigno de su diversidad real, sino por el contrario, pone en evidencia los escasos inventarios realizados o pocos trabajos publicados, traduciéndose igualmente en un relativo bajo nivel de conocimiento y un elevado nivel de vacíos de información, cuando es comparada con las demás subcuencas del Orinoco (Machado-Allison *et al.* 2010, Lasso *et al.* 2016).

Los antecedentes de los estudios ictiológicos de la cuenca del río Guaviare y más concretamente, del río Guayabero, se remontan a los trabajos pioneros de

Dahl (1960, 1961), donde se describen un número importante de especies nuevas de bagres (orden Siluriformes) y se reporta la presencia de varias especies de las familias Auchenipteridae, Cetopsidae, Heptapteridae, Pimelodidae, Pseudopimelodidae y Trichomycteridae, totalizando 25 especies. Posteriormente, el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia (1990), desarrolló una serie de muestreos en la cuenca de los ríos Guayabero, Losada y Duda, listando 96 especies capturadas. Una serie de trabajos taxonómicos aislados se han sumado desde entonces, describiendo especies nuevas presentes en la cuenca del río Guaviare (Thomerson y Taphorn 1993, Kullander 2004, Román-Valencia *et al.* 2010a, b, Ballen 2011, Vanegas-Ríos *et al.* 2015, Ballen *et al.* 2016a, b). Más recientemente, Urbano-Bonilla *et al.* (2018a) reportaron 84 especies, 59 de quebradas tributarias del río Inírida y 43 del río Guaviare. Mesa *et al.* (2017) ofrecen una lista de 80 especies, resultado de una evaluación ictiológica rápida, conducida en Caño Cristales y varios afluentes del río Guayabero, en la vertiente suroriental de la sierra de La Macarena. Estas cifras recientes (78 y 80 especies), obtenidas en porciones limitadas de la cuenca del río Guaviare, ponen en evidencia los enormes vacíos existentes en el conocimiento de la diversidad íctica de la cuenca. En tal sentido, en este trabajo se ofrecen los resultados de un inventario realizado a lo largo de la confluencia de los ríos Guayabero, Losada y Duda, en febrero de 2018 (período hidrológico de aguas bajas), complementado con un muestreo realizado entre los meses de junio a julio (período de aguas altas), algunas colecciones realizadas

Figura 1. Sitios de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

en años previos (2016) por el Instituto Humboldt y la revisión y validación de la literatura pertinente.

MATERIAL Y METODOS

Los muestreos correspondientes al período de aguas bajas (5 al 15 de febrero de 2018) se realizaron en 28 estaciones (Anexo 1), ubicadas en la cuenca de los ríos Guayabero, Losada y Duda (Figura 1). Durante el período de aguas altas (26 de junio al 4 de julio de 2018) se evaluaron 19 estaciones en los ríos Guayabero y Losada, con un mayor esfuerzo de muestreo en este último. Las estaciones correspondientes al período de aguas bajas se ubicaron en seis tipos de ambientes o macrohábitats: río (playa, cauce principal, raudal, parche de plantas acuáticas de la familia Podostemaceae-*Apinagia* sp.), caño,

quebrada y laguna o madreveja en el plano inundable del río Guayabero (Anexo 2).

Las artes de pesca empleadas, de acuerdo al tipo de ambiente muestreado (Figura 2), fueron 1) Atarraya de monofilamento de nilón de 1,5 m de altura y 1 cm de entrenudo. 2) Chinchorros de 2, 5 y 10 m de largo, con entrenudo de 1 y 5 mm. 3) Redes agalleras o trasmallos tipo monofilamento de nilón de: a) 20 m de largo por 2 m de alto, con entrenudo de 3 y 5 cm; b) 30 m de largo por 4,5 m de alto, con entrenudo de 2,5 cm; c) 50 m de largo por 6 m de alto, con entrenudo de 4,5 cm. 4) Nasas o trampas (minnow trap) con carnada de vísceras, mezcla de avena y sardinas enlatadas, y carne de pescado. 5) Captura manual en grietas y orificios de rocas y troncos sumergidos. 6) Anzuelos de varios tipos (# 5, 6 y 7) y para grandes bagres, dispuestos individualmente o en espinel.

Figura 2. Métodos de captura: a) atarraya, b-c) chinchorros, d) red agallera, e) nasas, f) captura manual en rocas. Fotos: Jorge E. García-Melo (a, c), Mark Sabaj (b), Monica A. Morales-Betancourt (d-f).

También se realizaron encuestas a los pescadores y guías locales, para identificar las especies de interés pesquero (comercial-deportiva-consumo) de la cuenca del río Guayabero y se complementó el listado taxonómico con la literatura para el área.

Los ejemplares capturados fueron fijados en formol al 10% y para el caso de los especímenes mayores de 10 cm de longitud estándar (LE), fueron inyectados con esta misma solución, en la cavidad abdominal y a lo largo de la musculatura de la cola y de

la base de las aletas. Una vez trasladados al laboratorio, fueron lavados con agua corriente y preservados en etanol al 70%. La identificación taxonómica se realizó mediante claves taxonómicas, así como de las diagnósis y descripciones originales de especies que no disponen de claves de identificación, tomando en consideración, el listado de especies registradas para la cuenca del río Orinoco en Colombia, a partir de la versión actualizada de la lista de especies de peces de agua dulce de Colombia (<http://doi.org/10.15472/numrso>). Los ejemplares catalogados se encuentran depositados en la Colección de Peces de Agua Dulce del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-P), en Villa de Leyva. La información asociada (datos de colecta e información taxonómica y geográfica) se encuentra publicada en el formato Darwin Core (DwC), en el Portal de la Infraestructura Institucional de Datos del Instituto Humboldt: CEIBA - Catalogador de Información Biológica -IAvH (http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=peces_coleccion_instituto_humboldt).

Paralelo a la captura de los ejemplares durante el período de aguas bajas, se tomaron muestras de tejidos (una porción de la aleta pélvica derecha, músculo del lado derecho del pedúnculo caudal o de filamentos branquiales), de cada una de las especies colectadas, las cuales se almacenaron individualmente en crioviales, identificado con el mismo código con el que se etiquetó el ejemplar “voucher” correspondiente. Durante el período de aguas altas, solo se tomaron muestras de ADN de especies seleccionadas, la mayoría de ellas no colectadas en aguas altas. Estas muestras de tejido se encuentran catalogadas y depositadas en la Colección de Tejidos del Instituto Humboldt (IAvH-CT). Para el caso de algunos ejemplares de gran tamaño (capturados por los pescadores), se obtuvo registro fotográfico, así como también muestras de tejidos de diversas regiones (p. e. aleta, músculo o branquia) y se preservó el esqueleto entero, el cual fue sometido a un proceso de limpieza (utilizando escarabajos derméstidos), en el Laboratorio del Grupo de

Zoología de la Universidad del Tolima. Estos esqueletos fueron igualmente ingresados y catalogados en IAvH-P.

Análisis de información

Las curvas de acumulación de especies y de rarefacción, así como los análisis estadísticos de abundancia, riqueza y similitud se realizaron únicamente con los datos obtenidos en el muestreo del mes de febrero (aguas bajas), mientras que para la construcción de la lista de especies y la composición taxonómica general (representatividad porcentual por grupos, órdenes y familias), se incluyeron tanto los ejemplares colectados en los dos periodos hidrológicos, como la información obtenida por encuestas y por bibliografía. Así, la abundancia relativa se calculó a partir del número de individuos de cada especie y su relación con el número total de individuos colectados, para cada estación. Para evaluar la efectividad del muestreo, se calculó el estimador de diversidad Chao 2 y se construyó la curva de rarefacción, utilizando una matriz de datos de presencia/ausencia de especies. La similitud en composición de especies entre las estaciones estudiadas, se evaluó por medio de un análisis de agrupamiento de pares no ponderado (UPGMA) y se calculó el coeficiente de similitud de Jaccard, utilizando la matriz de presencia-ausencia de especies por estación de muestreo. Todos los análisis estadísticos se condujeron con el programa PAST v. 3.01 (Hammer *et al.* 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lista de especies/taxones y distribución por subcuencas y microhábitats

Se colectaron 6.018 ejemplares representando 166 especies, durante los muestreos de febrero (período de aguas bajas), a las que se suman 28 especies adicionales, capturadas durante el muestreo de aguas altas, para un total de 194 especies colectadas, distribuidas en nueve órdenes y 39 familias (Anexo 2, 3). Adicionalmente, se registran otras especies a través de encuestas (16 sp.) y por información secundaria (32 sp.), con lo

cual la riqueza total para el área de interés, es de 242 especies, 40 familias y nueve ordenes (Anexo 2, Figura 3).

Dentro de las especies capturadas se encuentran 11 especies presumiblemente no descritas: *Characidium* sp. (Anexo 3-Figura 5), *Creagrutus* sp., *Knodus* sp. (Anexo 3-Figura 51), *Paravandellia* sp., *Loricaria* sp., *Ancistrus* sp., *Imparfinis* sp., Heptapteridae sp., *Crenicichla* sp., *Andinoacara* sp. (Anexo 3- Figura 141) y *Poecilia* sp.. Hay 5 registros nuevos para Colombia: *Leporinus arimaspi* (Anexo 3-Figura 15), *Moenkhausia gracilima* (Anexo 3-Figura 41), *Apteronotus magoi* (Anexo 3-Figura 72), *Cetopsis montana* (Anexo 3-Figura 99) y *Pimelodella megalops*. Diez registros son nuevos para la cuenca del río Orinoco en Colombia: *Parodon pongoensis* (Anexo 3- Figura 7), *Steindachnerina hypostoma*, *Moenkhausia mikia*, *Jupiaba asymmetrica*, *Gymnotus pedanopterus*, *Vandellia cirrhosa* (Anexo 3-Figura 79), *Ancistrus lineolatus*, *Centromochlus macracanthus*, *Bujurquina moriorum* (Anexo 3- x) y *Laetacara flavilabris*. Se destacan 22 especies endémicas de Colombia (19 endémicas de la cuenca del río Orinoco): *Leporinus boehlkei* (Anexo 3- Figura 16), *Hyphessobrycon niger* (Anexo 3- Figura 40), *Tyttocharax metae* (Anexo 3- Figura 45), *Chrysobrycon guahibo* (Anexo 3-Figura 49), *Creagrutus calai*, *C. maculosus* (Anexo 3-Figura 48), *Bryconamericus macarenae* (Anexo 3-Figura 49), *Apteronotus galvisi* (Anexo 3-Figura 71), *Ituglanis guayaberensis* (Anexo 3-Figura 74), *Schultzichthys gracilis* (Anexo 3-Figura 78), *Corydoras delphax*, *C. loxozonus* (Anexo 3-Figura 80), *Chaetosoma formosae*, *Hypostomus niceforoi* (Anexo 3-Figura 96), *Helogenes castaneus* (Anexo 3-Figura 100), *Centromochlus altae* (Anexo 3-Figura 101), *Imparfinis microps*, *Nemuroglanis mariai* (Anexo 3-Figura 110), *Phenacorhamdia macarenensis* (Anexo 3-Figura 111), *Pimelodella figueroai* (Anexo 3-Figura 112), *Pimelodus garciabarrigai* (Anexo 3-Figura 124) y *Apistogramma alacrina*

(Anexo 3-Figura 137) (DoNascimento *et al.* 2017, 2018). Hay siete especies amenazadas que a su vez son explotadas comercialmente, los bagres: *Brachyplatystoma juruense*, *Brachyplatystoma platynemum*, *Brachyplatystoma rousseauxii*, *Brachyplatystoma vaillantii* (Anexo 3-Figuras 115 a 119), *Pseudoplatystoma metaense*, *Pseudoplatystoma orinocoense* (Anexo 3-Figuras 128, 129) y *Zungaro zungaro* (Anexo 3-Figura 132) que se encuentran como Vulnerable (Mojica *et al.* 2012, Lasso *et al.* 2011, 2013), así como también 61 especies de interés ornamental (Ortega-Lara *et al.* 2015, Ortega-Lara 2016). Adicionalmente, con base en los ejemplares colectados e identificaciones realizadas por los pescadores mediante entrevistas, se registraron 45 especies comerciales para consumo, de las cuales 29 especies fueron colectadas durante el muestreo, las restantes 16 especies aportaron ocho géneros adicionales al listado sistemático general (Figura 3, Anexo 2). Estos resultados son congruentes con lo reportado por Lasso *et al.* (2016) para toda la subcuenca del río Guaviare, donde señalan valores altos de: riqueza general, número de especies endémicas y número de especies valiosas (puntuación de 3 para cada renglón, en una escala del 1 al 4).

En cuanto a la composición taxonómica general registrada para el área de interés, los órdenes con mayor número de especies fueron Characiformes (45,9%) y Siluriformes (39,7%), seguidos del orden Gymnotiformes (6,6%). Los restantes seis órdenes no superaron el 3,7% de representatividad total, cada uno (Figura 3). Las familias que reunieron el mayor número de especies fueron Characidae, Loricariidae y Pimelodidae, con 52, 28 y 22 especies, respectivamente, mientras que el número de especies en las restantes familias varía entre 1 a 12 (Tabla 1). Este patrón de ordenamiento porcentual en la composición taxonómica es generalizado para los ensamblajes de peces de la cuenca del río Orinoco (p. e. Lasso *et al.* 2009, Zamudio *et al.* 2017, Urbano-Bonilla *et al.* 2018 a,b).

Tabla 1. Aporte individual de cada familia para los dos períodos hidrológicos, resultados de encuestas y revisión de información secundaria.

Familia	Número de especies	Aporte porcentual (%) de cada especie
Achiridae	1	0,4
Aspredinidae	1	0,4
Chilodontidae	1	0,4
Ctenoluciidae	1	0,4
Gasteropelecidae	1	0,4
Hemiodontidae	1	0,4
Poeciliidae	1	0,4
Synbranchidae	1	0,4
Acestrorhynchidae	2	0,8
Erythrinidae	2	0,8
Hypopomidae	2	0,8
Iguanodectidae	2	0,8
Lebiasinidae	2	0,8
Parodontidae	2	0,8
Potamotrygonidae	2	0,8
Prochilodontidae	2	0,8
Pseudopimelodidae	2	0,8
Rhamphichthyidae	2	0,8
Sciaenidae	2	0,8
Triportheidae	2	0,8
Cetopsidae	3	1,2
Cynolebiidae	3	1,2
Sternopygidae	3	1,2
Apterodontidae	4	1,7
Cynodontidae	4	1,7
Bryconidae	4	1,7
Callichthyidae	5	2,1
Crenuchidae	5	2,1
Doradidae	5	2,1
Gymnotidae	5	2,1
Serrasalminidae	8	3,3
Auchenipteridae	9	3,7

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Tabla 1. Continuación

Familia	Número de especies	Aporte porcentual (%) de cada especie
Cichlidae	9	3,7
Trichomycteridae	9	3,7
Anostomidae	10	4,1
Curimatidae	10	4,1
Heptapteridae	12	5,0
Pimelodidae	22	9,1
Loricariidae	28	11,6
Characidae	52	21,5

Figura 3. Composición taxonómica general para los dos periodos hidrológicos, resultados de encuestas y revisión de información secundaria.

Con relación a la distribución porcentual de la riqueza registrada para las estaciones muestreadas, el mayor aporte fue obtenido para la estación E-17 (10,57%), seguida por las estaciones E-1 (7,19%), E-19 (6,98%) y E-4 (6,34%), correspondientes a los ríos Guayabero y Duda, mientras que las estaciones E-13 (7,82%), E-12 (6,76%) y E-15 (6,55%), con aportes igualmente elevados, corresponden

al río Losada y tributarios. Las restantes estaciones tuvieron un aporte inferior al 4,86% del total (Tabla 2, Figura 4). En este sentido, la mayor riqueza de especies se observó en el río Losada, con una representatividad de 38,26%, mientras que los ríos Guayabero y Duda obtuvieron valores de 32,98% y 28,75%, respectivamente.

Tabla 2. Valores absolutos de riqueza y abundancia para las estaciones muestreadas.

Estación de muestreo	Riqueza	Abundancia absoluta
E-1	34	308
E-2	11	14
E-3	17	53
E-4	30	936
E-5	5	15
E-6	10	18
E-7	3	17
E-8	7	17
E-9	10	22
E-10	13	236
E-11	4	24
E-12	32	339
E-13	37	1.258
E-14	13	404
E-15	31	427
E-16	11	54
E-17	50	388
E-18	5	6
E-19	33	272
E-20	22	85
E-21	6	508
E-22	19	307
E-23	7	40
E-24	18	87
E-25	20	68
E-26	1	10
E-27	23	101
E-28	1	4
Total	473	6.018

En cuanto a los macrohábitats evaluados, los caños pequeños o quebradas, aportaron la mayor riqueza al muestreo (77 sp.), seguidos del cauce principal (63 sp.), playas (56 sp.), caños medianos (53 sp.) y lagunas de inundación (44 sp.). Los ambientes corres-

pondientes a la zona pelágica obtuvieron valores bajos de riqueza (no superiores a las 7 sp.) (Anexo 2), lo cual puede obedecer a las dificultades inherentes a la implementación de los métodos de muestreo tradicionales en estas áreas.

Figura 4. Valores relativos (%) de riqueza y abundancia para las estaciones muestreadas.

Para el caso de las abundancias, destacan las estaciones E-13 (con *Knodus deuterodonoides*, 380 ejemplares; *Knodus* sp., 514 ejemplares), E-4 (con *Cheirodontops geayi*, 508 ejemplares; *Odontostilbe splendida*, 176 ejemplares) y E-21 (con *Odontostilbe splendida*, 463 ejemplares) (Figura 4). Con relación a la abundancia total de especies, las cuatro especies dominantes fueron carácidos de pequeño porte (menores de 50 mm de LE):

Odontostilbe splendida, con 1284 ejemplares (21,3%), seguida de *Knodus* sp con 804 ejemplares (13,4%), *Cheirodontops geayi* con 562 ejemplares (9,3%) y *Knodus deuterodonoides* con 441 ejemplares (7,3%). Las restantes especies exhibieron abundancias inferiores al 4% (Figura 5), destacando la dominancia taxonómica del orden Characiformes y más concretamente de la familia Characidae, con 9 especies de las 12 restantes más

Figura 5. Abundancia relativa (%) de las especies más abundantes del muestreo.

abundantes. Este patrón es recurrente en las abundancias relativas observadas en otras regiones de la cuenca del río Orinoco colombiano (p. e. Villa Navarro *et al.* 2017, Mesa *et al.* 2017), donde las especies dominantes, pertenecen a la familia Characidae.

La similitud en composición de especies, entre las estaciones evaluadas fue baja en términos generales (Figura 6). Sin embargo, se destacan cuatro agrupamientos con valores significativos ($> 0,35$): 1) caños del río Losada (E-2 y E-12), 2) tramo principal del río Guayabero, entre la desembocadura del río Losada y el raudal del Guayabero (E-12 y E-16), 3) playas del tramo principal del río Guayabero y laguna lateral del curso

principal del mismo río (E-4 y E-1) y 4) curso principal del río Guayabero (aguas arriba del raudal) y playas debajo del raudal (E-6 y E-10). Igualmente se observaron algunos agrupamientos menores (aunque sin valores significativos), que indican algunas relaciones entre hábitats, *i.e.* caños de los ríos Duda, Losada y Guayabero (aguas arriba del raudal): E-12, E-25, E-15, E-13, E-17, E-20, E-24; sistemas lénticos, como las lagunas permanentes y temporales, con los caños de aguas lentas (E-5, E-14, E-9, E-21, E-22); y las playas de los ríos Guayabero (debajo del raudal) y Duda, con el cauce principal del río Guayabero (arriba del raudal): E-4, E-1, E-19, E-6, E-10.

Figura 6. Dendrograma de similitud.

Curva acumulada de especies

La curva acumulada de especies muestra un patrón ascendente continuo (Figura 7), con una leve caída de la pendiente a partir del día 8, aunque sin una tendencia evidente hacia la estabilización, lo que sugiere que un mayor esfuerzo de muestreo (en términos de días efectivos de trabajo) sería necesario para alcanzar la asíntota. Por otro lado, la curva de rarefacción muestra una eficacia relativa del muestreo, localizada dentro del 95% de confianza (Figura 8), con un valor máximo de desviación estándar, equivalente a seis especies del total encontrado. De acuerdo al estimador de riqueza Chao 2, las especies observadas representan 80,7%, valor que permite inferir una eficacia y representatividad aceptables del muestreo realizado. En términos generales, la riqueza de especies obtenida es congruente con las cifras y el esfuerzo de muestreo invertido en inventarios ictiológicos rápidos, conducidos en otras áreas de la cuenca del río Guaviare (Urbano-Bonilla *et al.* 2017, Mesa *et al.* 2017). Es de esperar, que la ejecución de muestreos intensivos en zonas inexplo-

radas de la cuenca del río Guaviare y más concretamente, de la cuenca del río Guayabero, incremente el número de especies registradas en la cuenca, así como también se traduzca en el descubrimiento de especies no descritas y la ampliación de distribución de especies ya registradas para el Orinoco o para Colombia, adicionales a las ya señaladas en el presente trabajo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cuenca del río Guaviare es una de las zonas de la Orinoquia con mayores vacíos de conocimiento, en términos de su diversidad íctica. Lasso *et al.* (2016) clasificaron el esfuerzo de muestreo y el nivel de conocimiento como bajos (puntuación de 2 en una escala del 1 al 4), mientras que los vacíos de conocimiento obtuvieron un valor alto (puntuación de 4 en la misma escala). El presente trabajo y esfuerzos recientes realizados en la zona de La Macarena (Mesa *et al.* 2017), ponen en evidencia esta situación, con

Figura 7. Curva acumulada de especies.

Figura 8. Curva de rarefacción.

un número elevado de nuevos registros de especies para Colombia y para la cuenca del río Orinoco en el país. Consecuentemente, es necesario ampliar los inventarios hacia zonas definidas de la cuenca (preferentemente que no cuenten con muestreos previos), así como desarrollar estudios bio-ecológicos y de pesquerías de las especies objeto de aprovechamiento comercial (pesca ornamental y deportiva) y de consumo, a fin de implementar planes coherentes de conservación y manejo, tomando en consideración el elevado

número de especies comerciales. También hay que considerar el potencial que representa igualmente el alto número de especies de interés ornamental, pudiendo ser una alternativa económica para las poblaciones locales, bajo un apropiado programa de monitoreo de las especies comercializadas. Particularmente, son de especial interés por su uso en la zona, el bagre amarillo (*Zungaro zungaro*) y la payara (*Hydrolicus armatus*), que son objeto de presión pesquera, en especial la primera especie para la pesca

comercial. La implementación de programas de monitoreo, donde participen directamente los actores locales, deben ser desarrollados y

fomentados, acompañados de un diagnóstico de la pesca comercial y deportiva, con miras a su ordenamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Ballen, G. A. 2011. A new species of *Chaetostoma* Tschudi (Siluriformes: Loricariidae) from Colombia with a definition of the *C. anale* species group. *Papéis Avulsos de Zoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo* 51 (26): 383-398.
- Ballen, G. A., A. Urbano-Bonilla y J. A. Maldonado-Ocampo. 2016a. Description of a new species of the genus *Chaetostoma* from the Orinoco River drainage with comments on *Chaetostoma milesi* Fowler, 1941 (Siluriformes: Loricariidae). *Zootaxa* 4105 (2): 181-197.
- Ballen, G. A., A. Urbano-Bonilla y J. E. Zamudio. 2016b. *Farlowella mitoupibo*, a new species of stick catfish from the upper Guaviare River, Orinoco basin, Colombia (Teleostei: Loricariidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 27 (4): 325-332.
- Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia. 1990. Flora - fauna íctica (Volumen IIIA). Pp. 140-205. *En*: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, Secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la República – SIP. *Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada Guaviare y los llanos del Yarí*. Proyecto de Colonización. Medellín, Colombia.
- Dahl, G. 1960. Nematognathous fishes collected during the Macarena Expedition 1959. [Part I.]. *Novedades Colombianas* 1 (5): 302-317.
- Dahl, G. 1961. Nematognathous fishes collected during the Macarena Expedition 1959. Dedicated to the memory of the Colombian ichthyologist, Doctor Ricardo Lozano. Decd May 23rd, 1959. Part II: Pimelodidae, Callophysidae. *Novedades Colombianas* 1 (6): 483-514.
- DoNascimento, C., E. E. Herrera-Collazos, G. A. Herrera-R., J. A. Maldonado-Ocampo, A. Ortega-Lara, J. S. Usma Oviedo y F. A. Villa-Navarro. 2017. Checklist of the freshwater fishes of Colombia: a Darwin Core alternative to the updating problem. *ZooKeys* 708: 25-138.
- DoNascimento, C., E. E. Herrera-Collazos y J. A. Maldonado-Ocampo. 2018a. Lista de especies de peces de agua dulce de Colombia/Checklist of the freshwater fishes of Colombia. v. 2.10. Asociación Colombiana de Ictiólogos. Dataset/ Checklist. <http://doi.org/10.15472/numrso>.
- DoNascimento, C., G. A. Herrera-R., J. A. Maldonado-Ocampo, E. E. Herrera-Collazos, E. Agudelo, C. A. Ardila Rodríguez, L. F. Jiménez-Segura, C. A. Lasso, L. M. Mesa S., J. I. Mojica, A. Ortega-Lara, S. Prada-Pedrerros, M. I. Ríos, R. Ríos Herrera, J. S. Usma Oviedo y F. A. Villa-Navarro. 2018. Peces de agua dulce: el creciente conocimiento sobre el patrimonio íctico de Colombia. Ficha 102. Pp. 11. *En*: Moreno, L. A., C. Rueda y G. I. Andrade (Eds.). *Biodiversidad 2017. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. ISBN: 978-958-5418-35-6. <http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/index.html>.
- Hammer, Ø., D. A. T. Harper y P. D. Ryan. 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. *Paleontologia Electronica* 4 (1): 9 pp.
- Kullander, S. O. 2004. *Apistogramma alacrina*, a new species of cichlid fish (Teleostei: Cichlidae) from Colombia. *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 15 (1): 41-48.
- Lasso, C. A., J. I. Mojica, J. S. Usma, J. A. Maldonado-Ocampo, C. DoNascimento, D. C. Taphorn, F. Provenzano, Ó. M. Lasso-Alcalá, G. Galvis, L. Vásquez, M. Lugo, A. Machado-Allison, R. Royero, C. Suárez y A. Ortega-Lara. 2004. Peces de la cuenca del río Orinoco. Parte I: lista de especies y distribución por subcuencas. *Biota Colombiana* 5(2): 95-158.

- Lasso, C. A., J. S. Usma Oviedo, F. Villa, M. T. Sierra-Quintero, A. Ortega-Lara, L. M. Mesa, M. A. Patiño, O. M. Lasso-Alcalá, M. A. Morales-Betancourt, K. González-Oropesa, M. P. Quiceno, A. Ferrer y C. F. Suárez. 2009. Peces de la Estrella Fluvial Inírida: ríos Guaviare, Inírida, Atabapo y Orinoco (Orinoquia colombiana). *Biota Colombiana* 10: 89-122.
- Lasso, C. A., E. Agudelo Córdoba, L. F. Jiménez-Segura, H. Ramírez-Gil, M. Morales-Betancourt, R. E. Ajiaco-Martínez, F. de Paula Gutiérrez, J. S. Usma Oviedo, S. E. Muñoz Torres y A. I. Sanabria Ochoa (Ed.). 2011. I. Catálogo de los recursos pesqueros continentales de Colombia. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, Colombia. 715 pp.
- Lasso, C. A., R. S. Rosa, P. Sánchez-Duarte, M. A. Morales-Betancourt y E. Agudelo-Córdoba (Eds.). 2013. IX. Rayas de agua dulce (Potamotrygonidae) de Suramérica. Parte I. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, Surinam y Guayana Francesa: diversidad, bioecología, uso y conservación. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia, Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, Colombia. 368 pp.
- Lasso, C. A., A. Machado-Allison y D. C. Taphorn. 2016. Fishes and aquatic habitats of the Orinoco River Basin: diversity and conservation. *Journal of Fish Biology* 89 (1): 174-191.
- Machado-Allison, A., C. A. Lasso, J. S. Usma, P. Sánchez-Duarte y O. Lasso-Alcalá. 2010. Peces. Pp. 216-257. En: Lasso, C. A., J. S. Usma, F. Trujillo y A. Rial (Ed.). *Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. Bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad*. Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Fundación Omacha, Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia), Conservación Internacional Colombia, Bogotá, Colombia.
- Mesa-S., L. M. C. A. Lasso, M. A. Morales-Betancourt y P. Herrera. Peces (Capítulo 3). Pp. 67-95. En: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Ed.). *III. Fauna de Caño Cristales, sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, Colombia.
- Mojica, J. I., J. S. Usma, R. Álvarez-León y C. A. Lasso (Ed.). 2012. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia 2012. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, WWF Colombia y Universidad de Manizales, Bogotá, Colombia. 319 pp.
- Ortega-Lara, A. 2016. Guía visual de los principales peces ornamentales continentales de Colombia. Serie Recursos Pesqueros de Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, FUNINDES, Santiago de Cali, Colombia. 112 pp.
- Ortega-Lara, A., Y. Cruz-Quintana y V. Puentes. 2015. Dinámica de la actividad pesquera de peces ornamentales continentales en Colombia. Serie Recursos Pesqueros de Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, FUNINDES, Santiago de Cali, Colombia. 174 pp.
- Román-Valencia, C., C. A. García-Alzate, R. I. Ruiz-C. y D. C. Taphorn. 2010a. A new species of *Creagrutus* from the Güejar River, Orinoco Basin, Colombia (Characiformes: Characidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 21 (1): 87-95.
- Román-Valencia, C., C. García-Alzate, R. I. Ruiz-C. y D. C. Taphorn. 2010b. *Bryconamericus macarenae* n. sp. (Characiformes, Characidae) from the Güejar River, Macarena mountain range, Colombia. *Animal Biodiversity and Conservation* 33 (2): 195-203.
- Thomerson, J. y D. Taphorn. 1993. *Rivulus corpulentus*, a new killifish from Cordillera de La Macarena, Colombia (Cyprinodontiformes: Rivulidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 4 (1): 57-60.
- Urbano-Bonilla, A., L. de Souza, J. A. Maldonado-Ocampo y J. E. Zamudio. 2017. Sistemas hidrográficos de la Serranía de la Lindosa, Guaviare, Colombia. Peces de quebradas de

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

- cabecera de la cuenca alta del río Inírida y quebradas de cabecera tributarios del río Guaviare. <http://fieldguides.fieldmuseum.org/es/gu%C3%ADas/gu%C3%ADa/842>.
- Urbano-Bonilla, A., L. de Souza, J. E. Zamudio y J. A. Maldonado-Ocampo. 2018a. Peces. Pp 111-116. *En*: Vriesendorp, C., N. Pitiman, D. Alvira, A. Salazar, R. Botero, A. Arciniegas, L. de Souza, Á. del Campo, D. F. Stotz, T. Watcher, A. Ravikumar and J. Peplinski (Eds.). *Colombia: La Lindosa, Capricho, Cerritos*. Rapid Biological and Social Inventories Report 29. The Field Museum, Chicago.
- Urbano-Bonilla, A., G. A. Ballen, G. A. Herrera-R., J. Zamudio, E. E. Herrera-Collazos, C. DoNascimento, S. Prada-Pedrerros, J. A. Maldonado-Ocampo. 2018b. Fishes of the Cusiana River (Meta River basin, Colombia), with an identification key to its species. *ZooKeys* 733: 65-97.
- Usma, J. S., J. A. Maldonado-Ocampo, F. A. Villa-Navarro, A. Ortega-Lara, D. Taphorn, A. Urbano-Bonilla, J. E. Zamudio y C. DoNascimento. 2016. Peces de la cuenca del río Meta. Pp. 104-119. *En*: Trujillo, F., R. Antelo y S. Usma (Ed.). *Biodiversidad de la cuenca baja y media del río Meta*. Fundación Omacha, Fundación Palmarito y WWF Bogotá, Bogotá, Colombia.
- Vanegas-Ríos, J. A., A. Urbano-Bonilla y M. de las M. Azpelicueta. 2015. *Chrysobrycon guahibo*, a new species from the Orinoco River basin, with a distribution expansion of the genus (Teleostei: Characidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters* 26 (2): 171-182.
- Villa-Navarro, F. A., E. O. López-Delgado, J. G. Albornoz-Garzón, D. Montoya, D. C. Taphorn, C. DoNascimento, S. Usma, L. M. Mesa-Salazar y C. A. Lasso. 2017. Peces (Capítulo 7). Pp. 169-239. *En*: Trujillo, F. y C. A. Lasso (Ed.). *IV. Biodiversidad del río Bitá. Vichada, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Zamudio, J., A. Urbano-Bonilla, V. Preciado-Silva, D. Rodríguez-Cubillos y E. E. Herrera-Collazos. 2017. Ichthyofauna of piedmont and Savannah environments in the Casanare River drainage, Orinoco Basin, Colombia. *Biota Colombiana* 18 (2): 199- 211.

ANEXOS

Anexo 1. Estaciones de muestreo.

Estaciones de muestreo	Localidad	Coordenadas geográficas	Subcuenca			Fecha
			Guayabero	Losada	Duda	
E-1	Río Guayabero, playas en margen derecho del río, aguas abajo del Cajón del Raudal	02°17'33,1"N; 73°52'45,4"O	x			05 y 10/02/2018
E-2	Río Guayabero, campamento 1	02°17'32,4"N; 73°52'31,6"O	x			05- 08/02/2018
E-3	Río Guayabero, margen izquierdo, aguas abajo del campamento 1	02°17'34,0"N; 73°52'30,8"O	x			06/02/2018
E-4	Laguna sin nombre, colindante a margen izquierdo del río Guayabero	02°17'35,6"N; 73°52'32,9"O	x			06 y 10/02/2018
E-5	Caño Temblón, afluente margen izquierdo del río Guayabero	02°17'37,8"N; 73°52'09,9"O	x			06/02/2018
E-6	Río Guayabero, aguas arriba del Raudal del Cajón	02°18'09,8"N; 73°54'37,6"O	x			07/02/2018
E-7	Río Guayabero, en el Raudal del Cajón	02°17'57,5"N; 73°53'25,3"O	x			07/02/2018
E-8	Caño Aguas Claras, tributario del caño Temblón, afluente margen izquierdo del río Guayabero	02°18'01,5"N; 73°52'33,4"O	x			07/02/2018
E-9	Caño adyacente al campamento 1 "Caño del Cachimbo Mocho"	02°17'27,4"N; 73°52'36,51"O	x			07/02/2018
E-10	Río Guayabero, playa en margen derecho, aguas abajo del campamento 1	02°17'30,5"N; 73°52'31,2"O	x			07/02/2018
E-11	Desembocadura de caño Temblón, afluente margen izquierdo del río Guayabero	02°17'31,1"N; 73°52'10,7"O	x			07/02/2018
E-12	Caño La Cristalina, afluente margen derecho del río Losada	02°11'32,5"N; 73°51'44,7"O		x		08/02/2018
E-13	Río Losada	02°11'43,8"N; 73°51'33,3"O		x		08 y 09/02/2018
E-14	Laguna margen izquierdo del río Losada, parte del caño La Cristalina	02°11'42"N; 73°51'35,9"O		x		08/02/2018
E-15	Caño sin nombre "Gorra Pérdida y Finca de Chelo", afluente margen derecho del río Losada	02°11'27,8"N; 73°52'27,3"O		x		09/02/2018
E-16	Río Guayabero, margen derecho, aguas abajo del campamento 1, sector La Guamera (macrófitas)	02°17'6,5"N; 73°51'55,8"O	x			10/02/2018
E-17	Caño San José (tributario margen izquierda del río Duda), cuenca río Guayabero	02°33'01,2"N; 73°56'27,2"O			x	12 y 14/02/2018

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 1. Continuación

Estaciones de muestreo	Localidad	Coordenadas geográficas	Subcuenca			Fecha
			Guayabero	Losada	Duda	
E-18	Río Guayabero, campamento 2	02°32'23,6"N; 73°55'52"O		x		12-15/02/2018
E-19	Río Duda, playas en margen derecha del río, frente a desembocadura de Caño San José	02°32'59,9"N; 73°56'27,5"O			x	12/02/2018
E-20	Caño Santo Domingo, afluente margen izquierdo del río Duda	02°34'37,0"N; 73°58'15,5"O			x	13/02/2018
E-21	Laguna-charco temporal, en el camino a la Laguna de Los Bocachicos	02°32'2,7"N; 73°56'03,8"O		x		14/02/2018
E-22	Laguna de Los Bocachicos, margen derecha del río Guayabero	02°31'52,1"N; 73°56'04,3"O		x		14/02/2018
E-23	Río Duda, en afloramiento rocoso del margen derecho	02°32'56,5"N; 73°57'12,9"O			x	15/02/2018
E-24	Caño Aguas Claras, detrás del campamento 2	02°32'40,0"N; 73°56'00,4"O		x		15/02/2018
E-25	Caño sin nombre "Gorra Pérdida y Finca de Chelo", afluente margen derecho del río Losada	02°11'27,8"N; 73°52'27,3"O		x		09/02/2018
E-26	Caño San José, afluente río Duda	02°33'07,3"N; 73°56'13,7"O			x	11/02/2018
E-27	Caño Aguas Claras, afluente río Duda	02°32'36,5"N; 73°55'58,5"O			x	14/02/2018
E-28	Río Guayabero, vereda Bocas del Duda	03°32'28,6"N; 73°55'53,5"O	x			14/02/2018

Anexo 2. Listado sistemático de especies, distribución por subcuencas y tipo de hábitat. * Especies registradas sólo en aguas altas; ** nuevos registros para Colombia; *** nuevos registros para la cuenca del Orinoco colombiano; ^eespecie endémica; ^eespecie de consumo; ^{e-e}especie de consumo registrada sólo por encuesta; ^b registro bibliográfico (Mesa *et al.* 2017); ^{b-e}especies en proceso de catalogación –región de Caño Cristales.

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
Chondrichthyes													
Myliobatiformes (2 spp)													
Potamotrygonidae (2 spp)													
<i>Potamotrygon orbignyi</i> (Castelnau 1855)	1		1		1					1			1
<i>Potamotrygon</i> gr. <i>scobina</i> Garman 1913	1				1								2
Actinopteri													
Characiformes (111 spp)													
Crenuchidae (5 spp)													
<i>Characidium chupa</i> Schultz 1944 ^b	x												
<i>Characidium catenatum</i> Eigenmann 1909	1	1	1	1	1								
<i>Characidium steindachneri</i> Cope 1878	1	1	1						1			1	3
<i>Characidium zebra</i> Eigenmann 1909	1	1	1	1	1				1	1		1	4
<i>Characidium</i> nsp.		1							1				5
Erythrinidae (2 spp)													
<i>Hoplerethrinus unitaeniatus</i> (Spix & Agassiz 1829) * ^e		1											
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch 1794) ^e	1	1	1						1	1	1	1	6
Parodontidae (2 spp)													
<i>Parodon apolinari</i> Myers 1930	1			1	1								
<i>Parodon pongoensis</i> (Allen 1942) ***		1	1							1			7
Cynodontidae (4 spp)													
<i>Cynodon gibbus</i> (Spix & Agassiz 1829) ^{e-e}	x												
<i>Hydrolycus armatus</i> (Jardine 1841) ^e	1	1			1								8

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Hydrolycus tatauaia</i> Toledo-Piza, Menezes & Santos 1999 ^{ce}	x												
<i>Rhaphiodon vulpinus</i> Spix & Agassiz 1829 ^{* c}		1											9
Serrasalminidae (8 spp)													
<i>Colossoma macropomum</i> (Cuvier 1816) ^{ce}	x	x	x										10
<i>Mylossoma albiscopeum</i> (Cope 1872) ^c		1			1								11
<i>Piaractus brachypomus</i> (Cuvier 1818) ^{ce}	x	x	x										12
<i>Pristobrycon calmoni</i> (Steindachner 1908) [*]		1											
<i>Pygocentrus cariba</i> (Humboldt 1821) ^c	1	1										1	13
<i>Serrasalmus altuvei</i> Ramírez 1965	1	1								1			
<i>Serrasalmus manuei</i> (Fernández-Yépez & Ramírez 1967) ^b	x												
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus 1766) ^c	1	1			1							1	14
Hemiodontidae (1 spp)													
<i>Hemiodus unimaculatus</i> (Bloch 1794) ^b	x												
Anostomidae (10 spp)													
<i>Laemolyta orinocensis</i> (Steindachner 1879) ^b	x												
<i>Leporinus arimaspi</i> Burns, Frable & Sidlauskas 2014 ^{*,** c}		1			1								15
<i>Leporinus boehlkei</i> Garavello 1988 ^E	1	1	1						1	1			16
<i>Leporinus fasciatus</i> (Bloch 1794) [*]	1	1											17
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch 1794) [*]	1												18
<i>Leporinus cf. ortomaculatus</i> Garavello 2000 ^b	x												19
<i>Leporinus parae</i> Eigenmann 1907 [*]		1											

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Leporinus y-ophorus</i> Eigenmann 1922 ^c		1			1								20
<i>Leporinus</i> sp.*		1											
<i>Schizodon scotorhabdotus</i> Sidlauskas, Garavello & Jellen 2007 ^c	1				1								21
Chilodontidae (1 sp)													
<i>Caenotropus labyrinthicus</i> (Kner 1858)		1			1								22
Curimatidae (10 spp)													
<i>Curimata incompta</i> Vari 1984	1			1									
<i>Curimatopsis macrolepis</i> (Steindachner 1876) ^b	x												
<i>Cyphocharax cf. mestomyllos</i> Vari 1992 ^b	x												
<i>Cyphocharax spilurus</i> (Günther 1864)		1			1				1				23
<i>Potamorhina altamazonica</i> (Cope 1878) [*]		1											
<i>Psectrogaster ciliata</i> (Müller & Troschel 1844) [*]		1											
<i>Steindachnerina argentea</i> (Gill 1858)	1	1							1			1	24
<i>Steindachnerina guentheri</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)		1	1						1	1	1	1	25
<i>Steindachnerina hypostoma</i> (Boulenger 1887) ^{*,***}		1											
<i>Steindachnerina pupula</i> Vari 1991	1	1	1	1						1		1	26
Prochilodontidae (2 spp)													
<i>Prochilodus mariae</i> Eigenmann 1922 ^c	1	1		1	1								27
<i>Semaprochilodus laticeps</i> (Steindachner 1879) ^{* c}		1											28
Lebiasinidae (2 spp)													
<i>Copella eigenmanni</i> (Regan 1912)		1							1				29

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Pyrrhulina lugubris</i> Eigenmann 1922	1	1							1				30
Ctenoluciidae (1 sp)													
<i>Boulengerella cuvieri</i> (Spix & Agassiz 1829)	1											1	
Acestrorhynchidae (2 sp)													
<i>Acestrorhynchus falcatus</i> (Bloch 1794)		1							1				31
<i>Acestrorhynchus microlepis</i> (Jardine 1841) ^b	x												
Characidae (52 sp)													
<i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus 1758)	1	1	1						1	1		1	32
<i>Astyanax integer</i> Myers 1930	1	1	1	1	1				1	1	1	1	33
<i>Astyanax venezuelae</i> Schultz 1944	1				1								
<i>Astyanax</i> sp.	1								1			1	34
<i>Ctenobrycon oliverai</i> Benine, Lopes & Ron 2010	1	1										1	35
<i>Ctenobrycon spilurus</i> (Valenciennes 1850)	1		1	1								1	36
<i>Gymnocorymbus bondi</i> (Fowler 1911)		1							1				37
<i>Poptella compressa</i> (Günther 1864) ^b	x												
<i>Hemigrammus barrigonae</i> Eigenmann & Henn 1914	1	1	1						1	1	1		38
<i>Hemigrammus geisleri</i> Zarske & Géry 2007		1	1						1		1		
<i>Hemigrammus schmardae</i> (Steindachner 1882) *		1											
<i>Hemigrammus newboldi</i> (Fernández-Yépez 1949) ^b	x												
<i>Hemigrammus vorderwinkleri</i> Géry 1963 ^b	x												
<i>Hyphessobrycon metae</i> Eigenmann & Henn 1914		1	1						1	1			39

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Hyphessobrycon niger</i> García-Alzate, Román-Valencia & Prada-Pedrerros 2010 E		1							1				40
<i>Moenkhausia collettii</i> (Steindachner 1882)		1	1						1		1		
<i>Moenkhausia chrysargyrea</i> (Günther 1864) ^b	x												
<i>Moenkhausia dichrourea</i> (Kner 1858)	1	1		1	1							1	
<i>Moenkhausia gracilima</i> Eigenmann 1908 **	1	1	1	1	1						1	1	41
<i>Moenkhausia lepidura</i>	1	1		1					1				42
<i>Moenkhausia mikia</i> Marinho & Langeani 2010 ***		1	1		1				1	1			
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther 1864)		1							1				43
<i>Moenkhausia</i> sp.	1		1	1									44
<i>Tyttocharax metae</i> Román-Valencia, García-Alzate, Ruiz-C. & Taphorn 2012 ^E	1	1	1						1	1			45
<i>Chrysobrycon guahibo</i> Vanegas-Ríos, Urbano-Bonilla & Azpelicueta 2015 ^E	1	1	1						1	1			46
<i>Hemibrycon metae</i> Myers 1930	1	1		1	1				1				47
<i>Creagrutus bolivari</i> Schultz 1944	1	1	1	1	1	1				1	1	1	
<i>Creagrutus calai</i> Vari & Harold 2001 ^E	1	1	1		1				1	1		1	
<i>Creagrutus gyrospilus</i> Vari & Harold 2001 ^b	x												
<i>Creagrutus maculosus</i> Román-Valencia, García-Alzate, Ruiz-C. & Taphorn 2010 ^E	1								1				48
<i>Creagrutus</i> nsp.		1			1								
<i>Bryconamericus macarenae</i> Román-Valencia, García-Alzate, Ruiz-C. & Taphorn 2010 ^E	1	1	1						1	1		1	49
<i>Knodus alpha</i> (Eigenmann 1914)	1	1										1	50

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Knodus deuterodonoides</i> (Eigenmann 1914)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	
<i>Knodus</i> nsp.	1	1	1	1	1				1	1		1	51
<i>Aphyocharax</i> sp.	1	1	1	1	1					1		1	52
<i>Aphyocharax colifax</i> Taphorn & Thomerson 1991 ^b	x												
<i>Microschemobrycon casiquiare</i> Böhlke 1953 ^b	x												
<i>Cheirodontops geayi</i> Schultz 1944	1	1	1	1	1							1	53
<i>Odontostilbe pulchra</i> (Gill 1858) * ^b	x												
<i>Odontostilbe splendida</i> Bührnheim & Malabarba 2007	1	1	1	1	1				1	1	1	1	54
<i>Tetragonopterus argenteus</i> Cuvier 1816		1	1	1					1				
<i>Acestrocephalus sardina</i> (Fowler 1913)	1	1	1	1								1	
<i>Charax metae</i> Eigenmann 1922		1							1				
<i>Galeocharax gulo</i> (Cope 1870)	1			1									
<i>Phenacogaster maculoblonda</i> Lucena & Malabarba 2010			1	1							1		
<i>Phenacogaster prolatus</i> Lucena & Malabarba 2010 ^b	x												
<i>Roeboides affinis</i> (Günther 1868)	1	1	1	1								1	55
<i>Roeboides myersi</i> Lucena 2003 *		1											56
<i>Jupiaba asymmetrica</i> (Eigenmann 1908) ***		1							1				
<i>Jupiaba polylepis</i> (Günther 1864)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	
<i>Jupiaba zonata</i> (Eigenmann 1908)		1							1				57
Gasteropelecidae (1 sp)													
<i>Thoracocharax stellatus</i> (Kner 1858)	1	1		1								1	58
Bryconidae (4 spp)													
<i>Brycon amazonicus</i> (Agassiz 1829) * ^c	1	1							1				59

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Brycon falcatus</i> Müller y Troschel 1844 ^{c-e}	x												
<i>Brycon whitei</i> Myers & Weitzman 1960	1					1							
<i>Salminus</i> sp. ^e	1				1								60
Triportheidae (2 spp)													
<i>Triportheus auritus</i> (Valenciennes 1850) *		1											
<i>Triportheus venezuelensis</i> Malabarba 2004 *		1											
Iguanodectidae (2 spp)													
<i>Bryconops collettei</i> Chernoff & Machado-Allison 2005		1	1	1	1								61
<i>Bryconops giacopinii</i> (Fernández-Yépez 1950) b	x												62
Gymnotiformes (16 spp)													
Gymnotidae (5 spp)													
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus 1766)	1				1								63
<i>Gymnotus anguillaris</i> Hoedeman 1962 ^b	x												
<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus 1758	1								1				64
<i>Gymnotus coropinae</i> Hoedeman 1962	1	1	1						1	1			65
<i>Gymnotus pedanopterus</i> Mago-Leccia 1994 ^{***}	1									1			
Hypopomidae (2 spp)													
<i>Brachyhypopomus sullivanii</i> Crampton, de Santana, Waddell & Lovejoy 2017		1	1						1	1			66
<i>Microsternarchus bilineatus</i> Fernández-Yépez 1968 b	x												67
Rhamphichthyidae (2 spp)													
<i>Rhamphichthys apurensis</i> (Fernández-Yépez 1968)	1											1	68

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Hypopygus lepturus</i> Hoedeman 1962		1							1				69
Sternopygidae (3 spp)													
<i>Eigenmannia macrops</i> (Boulenger 1897)	1		1	1	1					1			
<i>Eigenmannia</i> sp.	1		1	1						1		1	
<i>Sternopygus macrurus</i> (Bloch & Schneider 1801) ^c	1	1							1				70
Apteronotidae (4 spp)													
<i>Apteronotus bonapartii</i> (Castelnau 1855)	1			1									
<i>Apteronotus galvisi</i> de Santana, Maldonado-Ocampo & Crampton 2007 ^E			1						1	1			71
<i>Apteronotus magoi</i> de Santana, Castillo & Taphorn 2006 ^{**}	1			1									72
<i>Sternarchorhynchus</i> sp.		1	1		1		1						73
Siluriformes (96 spp)													
Trichomycteridae (9 spp)													
<i>Ituglanis guayaberenensis</i> (Dahl 1960) ^E	1	1	1						1	1			74
<i>Ituglanis metae</i> (Eigenmann 1917) ^{b-c}	x												
<i>Ochmacanthus alternus</i> Myers 1927	1	1	1						1	1	1		75
<i>Ochmacanthus orinoco</i> Myers 1927 ^b	x												
<i>Pseudostegophilus haemomyzon</i> (Myers 1942)	1			1									76
<i>Pseudostegophilus nemurus</i> (Günther, 1869)	1			1									77
<i>Schultzichthys gracilis</i> Dahl 1960 ^E			1							1	1		78
<i>Paravandellia</i> nsp.	1			1									
<i>Vandellia cirrhosa</i> Valenciennes 1846 ^{***}			1	1									79

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
Callichthyidae (5 spp)													
<i>Corydoras axelrodi</i> Rössel 1962			1							1			
<i>Corydoras delphax</i> Nijssen & Isbrücker 1983 ^E	1	1							1			1	
<i>Corydoras cf. loxozonus</i> Nijssen & Isbrücker 1983 ^E		1							1				80
<i>Corydoras melanistius</i> Regan 1912		1	1						1				81
<i>Megalechis picta</i> (Müller & Troschel 1849) ^b	x												
Loricariidae (28 spp)													
<i>Otocinclus huaorani</i> Schaefer 1997			1							1	1		
<i>Farlowella mariaelenae</i> Martín Salazar 1964	1		1						1	1	1		82
<i>Farlowella mitoupibo</i> Ballen, Urbano-Bonilla & Zamudio 2016 ^{b-c}	x												
<i>Farlowella vittata</i> Myers 1942 ^{b-c}	x												
<i>Lamontichthys llanero</i> Taphorn & Lilyestrom 1984	1		1	1	1		1						83
<i>Sturisoma tenuirostre</i> (Steindachner 1910)	1	1		1								1	84
<i>Limatulichthys griseus</i> (Eigenmann 1909)		1	1	1	1					1	1		85
<i>Loricaria</i> nsp.	1			1									
<i>Loricariichthys brunneus</i> (Hancock 1828) [*]		1											
<i>Rineloricaria eigenmanni</i> (Pellegrin 1908)			1						1	1	1		86
<i>Spatuloricaria terracanticum</i> Londoño-Burbano, Urbano-Bonilla, Rojas-Molina, Ramírez-Gil & Prada-Pedrerros 2018	1		1	1	1			1					87
<i>Acanthicus hystrix</i> Spix & Agassiz 1829	1				1								88
<i>Chaetostoma formosae</i> Ballen 2011 ^E	1		1	1	1								89

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Chaetostoma platyrhynchus</i> (Fowler 1943)	1								1				90
<i>Chaetostoma</i> sp.		1	1	1	1				1				91
<i>Hypancistrus debilitera</i> Armbruster, Lujan & Taphorn 2007		1			1								
<i>Panaque nigrolineatus</i> (Peters 1877)	1	1	1		1					1			92
<i>Panaqolus maccus</i> (Schaefer & Stewart 1993)			1				1		1				93
<i>Peckoltia lujani</i> Armbruster, Werneke & Tan 2015	1			1	1								94
<i>Aphanotorulus ammophilus</i> Armbruster & Page 1996	1											1	
<i>Aphanotorulus emarginatus</i> (Valenciennes 1840)	1	1	1	1	1				1			1	95
<i>Hypostomus niceforoi</i> (Fowler 1943) ^E	1	1	1	1	1				1	1	1	1	96
<i>Hypostomus plecostomoides</i> (Eigenmann 1922)	1		1						1	1	1	1	97
<i>Hypostomus</i> sp. ^{c-c}	x												
<i>Ancistrus lineolatus</i> Fowler 1943 ^{*,***}	1	1	1						1	1	1		
<i>Ancistrus triradiatus</i> Eigenmann 1918	1		1						1				98
<i>Ancistrus</i> nsp.	1		1						1	1			
<i>Lasiancistrus tentaculatus</i> Armbruster 2005			1								1		
Cetopsidae (3 spp)													
<i>Cetopsis montana</i> Vari, Ferraris & de Pinna 2005 ^{**}		1	1		1		1		1				99
<i>Helogenes castaneus</i> (Dahl 1960) ^E		1							1				100
<i>Helogenes marmoratus</i> Günther 1863 ^b	x												
Aspredinidae (1 sp)													

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Bunocephalus aloikae</i> Hoedeman 1961 *		1											
Auchenipteridae (9 spp)													
<i>Centromochlus altae</i> Fowler 1945 ^E			1	1					1				101
<i>Centromochlus macracanthus</i> Soares-Porto 2000 ***		1	1		1				1				
<i>Centromochlus romani</i> (Mees 1988)	1	1	1		1				1	1			102
<i>Centromochlus</i> sp.	1			1									103
<i>Tatia intermedia</i> (Steindachner 1877)		1							1				104
<i>Tatia</i> sp.	1			1									
<i>Ageneiosus inermis</i> (Linnaeus 1766) * ^c		1											105
<i>Auchenipterus nuchalis</i> (Spix & Agassiz 1829) *		1											
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus 1766) ^{c-e}	x												
Doradidae (5 spp)													
<i>Leptodoras nelsoni</i> Sabaj Pérez 2005		1			1								106
<i>Oxydoras sifontesi</i> Fernández-Yépez 1968 ^c	1				1								107
<i>Platydoras armatulus</i> (Valenciennes 1840)		1			1								
<i>Pterodoras rivasi</i> (Fernández-Yépez 1950) ^{c-e}	x												
<i>Rhinodoras gallagheri</i> Sabaj Pérez, Taphorn & Castillo G. 2008	1	1						1					108
Heptapteridae (12 spp)													
<i>Chasmocranus</i> sp. ^b	x												
<i>Cetopsorhamdia</i> sp.	1							1					109
<i>Imparfinis microps</i> Eigenmann & Fisher 1916 ^E			1							1			
<i>Imparfinis</i> nsp.			1	1									

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Nemuroglanis mariaí</i> (Schultz 1944) ^E		1	1						1	1			110
<i>Phenacorhamdia macarenensis</i> Dahl 1961 ^E	1	1	1		1		1		1				111
<i>Pimelodella figueroai</i> Dahl 1961 ^E	1		1	1						1		1	112
<i>Pimelodella megalops</i> Eigenmann 1912 ^{**}			1	1									
<i>Pimelodella metae</i> Eigenmann 1917		1	1				1		1				
<i>Pimelodella</i> sp.			1	1									113
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard 1824) ^c		1							1				114
Heptapteridae nsp.	1				1								
Pimelodidae (22 spp)													
<i>Brachyplatystoma filamentosum</i> (Lichtenstein 1819) ^{c,e}	x	x	x										115
<i>Brachyplatystoma juruense</i> (Boulenger 1898) ^{* c}	1												116
<i>Brachyplatystoma platynemum</i> Boulenger 1898 ^{c,e}	x	x	x										117
<i>Brachyplatystoma rousseauxii</i> (Castelnau 1855) ^{c,e}	x												118
<i>Brachyplatystoma vaillantii</i> (Valenciennes 1840) ^{e,e}	x		x										119
<i>Calophysus macropterus</i> (Lichtenstein 1819) ^c	1				1								120
<i>Hemisorubim platyrhynchos</i> (Valenciennes 1840) ^c	1			1	1			1					
<i>Leiarius marmoratus</i> (Gill 1870) ^c	1				1								121
<i>Megalonema platycephalum</i> Eigenmann 1912		1			1								122
<i>Pimelodus albofasciatus</i> Mees 1974	1			1								1	
<i>Pimelodus blochii</i> Valenciennes 1840 ^b	x												123

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
<i>Pimelodus garciabarrigai</i> Dahl 1961 ^E	1	1	1	1	1					1	1	1	124
<i>Pimelodus ornatus</i> Kner 1858	1	1										1	
<i>Pinirampus pirinampu</i> (Spix & Agassiz 1829) ^{ee}	x	x	x										125
<i>Platynemataichthys notatus</i> (Jardine 1841) ^{ee}	x	x											126
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i> (Bloch & Schneider 1801) ^{ee}	x		x										127
<i>Pseudoplatystoma metaense</i> Buitrago-Suárez & Burr 2007 ^{*c}		1											128
<i>Pseudoplatystoma orinocoense</i> Buitrago-Suárez & Burr 2007 ^{*c}		1											129
<i>Sorubim elongatus</i> Littmann, Burr, Schmidt & Isern 2001 ^{*c}		1											
<i>Sorubim lima</i> (Bloch & Schneider 1801) ^b	x												130
<i>Sorubimichthys planiceps</i> (Spix & Agassiz 1829) ^{ee}	x	x	x										131
<i>Zungaro zungaro</i> (Humboldt 1821) ^c	1				1								132
Pseudopimelodidae (2 spp)													
<i>Pseudopimelodus bufonius</i> (Valenciennes 1840)	1		1		1		1	1	1	1			133
<i>Rhyacoglanis annulatus</i> Shibatta & Vari 2017	1	1			1			1					134
Synbranchiformes (1 sp)													
Synbranchidae (1 sp)													
<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch 1795	1	1							1	1			135
Pleuronectiformes (1 sp)													
Achiridae (1 sp)													
<i>Hypoclinemus mentalis</i> (Günther 1862)	1	1		1	1								136

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 2. Continuación

Taxón	Subcuencas			Zona litoral		Zona pelágica			Afluentes				Foto Anexo 3
	Guayabero	Losada	Duda	Playas	Cauce principal	Rápidos o raudales	Afloramientos rocosos	Podostemáceas	Caños pequeños / quebradas	Caños medianos	Caños grandes	Laguna inundación	
Cichliformes (9 spp)													
Cichlidae (9 spp)													
<i>Apistogramma alacrina</i> Kullander 2004 ^E	1	1	1						1	1	1		137
<i>Crenicichla saxatilis</i> (Linnaeus 1758) ^b	x												
<i>Crenicichla sveni</i> Ploeg 1991	1	1	1						1	1	1	1	138
<i>Crenicichla</i> nsp.		1			1								
<i>Aequidens</i> sp. ^{E b}	x												139
<i>Aequidens tetramerus</i> (Heckel 1840) ^c		1							1				140
<i>Andinoacara</i> nsp.	1		1							1		1	141
<i>Bujurquina moriorum</i> Kullander 1986 *** ^c		1	1						1	1	1		142
<i>Laetacara flavilabris</i> (Cope 1870) *_***		1											
Cyprinodontiformes (4 spp)													
Cynolebiidae (3 spp)													
<i>Anablepsoides</i> sp 1.	1								1				
<i>Anablepsoides</i> sp 2. *		1											143
<i>Laimosemion corpulentus</i> (Thomerson & Taphorn 1993) ^{E b}	x												
Poeciliidae (1 sp)													
<i>Poecilia</i> nsp.	1		1								1	1	
Eupercaria incertae sedis (2 spp)													
Sciaenidae (2 spp)													
<i>Pachyurus gabrielensis</i> Casatti 2001 *	1												
<i>Plagioscion squamosissimus</i> (Heckel 1840) * ^c		1											145
Total de especies colectadas	113	125	83	56	63	2	7	6	77	53	27	44	
Total de especies registradas	242												

Anexo 3. Catalogo de especies.

1. *Potamotrygon orbignyi*.

2. *Potamotrygon gr. scobina*.

3. *Characidium steindachneri*.

4. *Characidium zebra*.

5. *Characidium* sp.

6. *Hoplias malabaricus*.

Lamina 1. Fotos: 1, 2. Monica A. Morales-Betancourt; 3-6. Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

7. *Parodon pongoensis*.

8. *Hydrolycus armatus*.

9. *Rhaphiodon vulpinus*.

10. *Colossoma macropomum*.

11. *Mylossoma albiscopum*.

12. *Piaractus brachipomus*.

Lamina 2. Fotos: 7. Jorge E. García-Melo; 8, 10. Monica A. Morales-Betancourt; 9, 12. Carlos A. Lasso; 11. Mark Sabaj.

Anexo 3. Continuación.

13. *Pygocentrus cariba*.

14. *Serrasalmus rhombeus*.

15. *Leporinus arimaspi*.

16. *Leporinus boehlkei*.

17. *Leporinus fasciatus*.

18. *Leporinus friderici*.

Lamina 3. Fotos: 13, 14, 16. Jorge E. García-Melo; 15, 17, 18. Monica A. Morales-Betancourt.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

19. *Leporinus cf. ortomaculatus*.

20. *Leporinus y-ophorus*.

21. *Schizodon scotorhabdotus*.

22. *Caenotropus labyrinthicus*.

23. *Cyphocharax spilurus*.

24. *Steindachnerina argentea*.

Lamina 4. Fotos: 19. Ivan Mikolji; 20, 22-24. Jorge E. García-Melo; 21. Mark Sabaj.

Anexo 3. Continuación.

25. *Steindachnerina guentheri*.

26. *Steindachnerina pupula*.

27. *Prochilodus mariae*.

28. *Semaprochilodus laticeps*.

29. *Copella eigenmanni*.

30. *Pyrrhulina lugubris*.

Lamina 5. Fotos: 25-27, 30. Jorge E. García-Melo; 28. Monica A. Morales-Betancourt; 29. Ivan Micolji.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

31. *Acestorhynchus falcatus*.

32. *Astyanax bimaculatus*.

33. *Astyanax integer*.

34. *Astyanax* sp.

35. *Ctenobrycon oliverai*.

36. *Ctenobrycon spilurus*.

Lamina 6. Fotos: 31, 33. Ivan Mikolji; 32, 34, 35. Jorge E. García-Melo; 36. Lina Ortíz (BIA-IAvH).

Anexo 3. Continuación.

37. *Gymnocorymbus bondi*.

38. *Hemigrammus barrigona*.

39. *Hyphessobrycon metae*.

40. *Hyphessobrycon niger*.

41. *Moenkhausia gracilima*.

42. *Moenkhausia lepidura*.

Lamina 7. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

43. *Moenkhausia oligolepis*.

44. *Moenkhausia* sp.

45. *Tyttocharax metae*.

46. *Chrysobrycon guahibo*.

47. *Hemibrycon metae*.

48. *Creagrutus maculosus*.

Lamina 8. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

49. *Bryconamericus macarenae*.

50. *Knodus alpha*.

51. *Knodus* sp.

52. *Aphyocharax* sp.

53. *Cheirodontops geayi*.

54. *Odontostilbe splendida*.

Lamina 9. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

55. *Roeboides affinis*.

56. *Roeboides myersi*.

57. *Jupia zonata*.

58. *Thoracocharax stellatus*.

59. *Brycon amazonicus*.

60. *Salminus* sp.

Lamina 10. Fotos: 55, 57, 58. Jorge E. García-Melo; 56, 59. Monica A. Morales-Betancourt; 60. Mark Sabaj.

Anexo 3. Continuación.

61. *Bryconops collettei*.

62. *Bryconops giacopinii*.

63. *Electrophorus electricus*.

64. *Gymnotus carapo*.

65. *Gymnotus coropinae*.

66. *Brachyhypopomus sullivanii*.

Lamina 11. Fotos: 61, 64-66. Jorge E. García-Melo; 62. Ivan Micolji; 63. Mark Sabaj.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

67. *Microsternarchus bilineatus*.

68. *Rhamphichthys apurensis*.

69. *Hypopygus lepturus*.

70. *Sternopygus macrurus*.

71. *Apteronotus galvisi*.

72. *Apteronotus magoi*.

Lamina 12. Fotos: 67. Ivan Micolji; 68-72. Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

73. *Sternarchorhynchus* sp.

74. *Ituglanis guayaberensis*.

75. *Ochmacanthus alternus*.

76. *Pseudostegophilus haemomyzon*.

77. *Pseudostegophilus nemurus*.

78. *Schultzichthys gracilis*.

Lamina 13. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

79. *Vandellia cirrhosa*.

80. *Corydoras* cf. *loxozonus*.

81. *Corydoras melanistius*.

82. *Farlowella mariaelenae*.

83. *Lamontichthys llanero*.

84. *Sturisoma tenuirostre*.

Lamina 14. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

85. *Limatulichthys griseus*.

86. *Rineloricaria eigenmanni*.

87. *Spatuloricaria terracanticum*.

88. *Acanthicus hystrix*.

89. *Chaetostoma formosae*.

90. *Chaetostoma platyrhynchus*.

Lamina 15. Fotos: 85-87, 89, 90. Jorge E. García-Melo; 88. Mark Sabaj.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

91. *Chaetostoma* sp.

92. *Panaque nigrolineatus*.

93. *Panaqolus maccus*.

94. *Peckoltia lujani*.

95. *Aphanotorulus emarginatus*.

96. *Hypostomus niceforoi*.

Lamina 16. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

97. *Hypostomus plecostomoides*.

98. *Ancistrus triradiatus*.

99. *Cetopsis montana*.

100. *Helogenes castaneus*.

101. *Centromochlus altae*.

102. *Centromochlus romani*.

Lamina 17. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

103. *Centromochlus* sp.

104. *Tatia intermedia*.

105. *Ageneiosus inermis*.

106. *Leptodoras nelsoni*.

107. *Oxydoras sifontesi*.

108. *Rhinodoras gallagheri*.

Lamina 18. Fotos: 103, 104, 107, 108. Jorge E. García-Melo; 105. Monica A. Morales-Betancourt; 106. Mark Sabaj.

Anexo 3. Continuación.

109. *Cetopsorhamdia* sp.

110. *Nemuroglanis mariaei*.

111. *Phenacorhamdia macarenensis*.

112. *Pimelodella figueroai*.

113. *Pimelodella* sp.

114. *Rhamdia quelen*.

Lamina 19. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

115. *Brachyplatystoma filamentosum*.

116. *Brachyplatystoma juruense*.

117. *Brachyplatystoma platynemum*.

118. *Brachyplatystoma rousseauxii*.

119. *Brachyplatystoma vaillantii*.

120. *Calophysus macropterus*.

Lamina 20. Fotos: 115. Astrid Acosta; 116, 117, 119. Monica A. Morales-Betancourt; 118. Juan Carlos Alonso; 120. Mark Sabaj.

Anexo 3. Continuación.

121. *Leiarius marmoratus*.

122. *Megalonema platycephalum*.

123. *Pimelodus blochii*.

124. *Pimelodus garciabarrigai*.

125. *Pinirampus pirinampu*.

126. *Platynemichthys notatus*.

Lamina 21. Fotos: 121. Mark Sabaj; 122, 124. Jorge E. García-Melo; 123, 125. Monica A. Morales-Betancourt; 126. Arnaldo Ferrer.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

127. *Phractocephalus hemioliopterus*.

128. *Pseudoplatystoma metaense* (arriba).

129. *Pseudoplatystoma orinocoense*.

130. *Sorubim lima*.

131. *Sorubimichthys planiceps*.

132. *Zungaro zungaro*.

Lamina 22. Fotos: 127-129. Monica A. Morales-Betancourt; 130. Germán Galvis; 131. Anilello Barbarino; 132. Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

133. *Pseudopimelodus bufonius*.

134. *Rhyacoglanis annulatus*.

135. *Synbranchus marmoratus*.

136. *Hypoclinemus mentalis*.

137. *Apistogramma alacrina*.

138. *Crenicichla sveni*.

Lamina 23. Fotos: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Anexo 3. Continuación.

139. *Aequidens* sp.

140. *Aequidens tetramerus*.

141. *Andinoacara* sp.

142. *Bujurquina moriorum*.

143. *Anablepsoides* sp 2.

144. *Plagioscion squamosissimus*.

Lamina 24. Fotos: 139, 144. Ivan Mikolji; 140-143. Jorge E. García-Melo.

Rayas (*Potamotrygon* gr. *scobina*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Juvenil de terecay (*Podocnemis unifilis*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Anfibios y reptiles de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Andrés R. Acosta-Galvis, Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso, Duberney Rayo, Juan Carlos Lomelín y Andrés Lomelín

Resumen. La estribación suroriental de la sierra de La Macarena, municipio de La Macarena, Meta, Colombia, es de suma importancia, pues corresponde a una de las áreas de mayor interés biótico por la mezcla entre la fauna amazónica y orinoquense (guayanesa y llanera). A pesar de dicha importancia, hay un vacío significativo de información sobre los anfibios y reptiles en las diferentes unidades de paisaje actuales. Se presenta los resultados de dos evaluaciones biológicas rápidas (RAP) sobre la herpetofauna regional, realizadas en dos épocas del año: sequía (reptiles acuáticos) y lluvia (reptiles acuáticos, terrestres y anfibios), en la cuenca de los ríos Guayabero, Losada y Duda. Esta información se complementó con información secundaria y colecciones de referencia. En total, se reconocen de manera preliminar 39 especies de anfibios y 68 reptiles. Se evidencia la presencia de especies de distribución amazónica en fragmentos de bosque y especies típicas de la Orinoquia, asociadas a sabanas naturales, formaciones rocosas del Escudo Guayanés y áreas antropizadas a consecuencia de la deforestación. La mayoría de las especies colectadas son nuevos registros para la sierra de La Macarena.

Palabras clave. Anura. Crocodylia. Lista especies. Squamata. Testudines.

Abstract. The southeastern foothills of the Sierra de La Macarena in the municipality of La Macarena (Meta) are of great importance since they are located in one of the biotic exchange areas between the Amazonian, Guiana Shield and Orinoco faunas. However, there is significant information gap, in terms of the diversity of amphibians and reptiles in the different landscape units that currently predominate. A series of Rapid Ecological Assessments (EER) were conducted at different times of the year (rainy and dry seasons), mainly aimed at characterizing the terrestrial and aquatic reptiles present in the Guayabero, Losada and Duda river basins. This information was supplemented with a sample for amphibian richness along with secondary sources of information that includes specialized literature and reference collections. In total, this inventory is recorded 39 species of amphibians and 68 reptiles, which taking into account the characteristics of the areas studied, we still consider to be a preliminary estimate. It is noteworthy that the records obtained

Acosta-Galvis, A. R. M. A. Morales-Betancourt, C. A. Lasso, D. Rayo, J. C. Lomelín y A. Lomelín. 2018. Anfibios y reptiles de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 179-209. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

are heterogeneous and an important number of species are of Amazonian distribution, found in relictual landscapes; other related elements are of Orinoco origin and typical of open areas, partly due to deforestation that is increasing vertiginously, and another corresponds to natural savannas, associated with rocky areas of Guiana Shield origin. New records are provided for almost all reported species.

Keywords. Anura. Crocodylia. List species. Squamata. Testudines.

INTRODUCCIÓN

La diversidad herpetológica de Colombia es una de las más valiosas como patrimonio biológico mundial, ya que ocupa el cuarto puesto en riqueza de reptiles y el segundo de anfibios. En contraste, las evaluaciones más recientes de riesgo de extinción, señalan que 50 especies (10%) de reptiles y 271 (33%) de los anfibios, están listadas bajo alguna categoría de amenaza y un número importante de especies no han podido ser evaluadas, puesto que no tienen información suficiente para poderlas categorizar, quedando como Datos Insuficientes-DD.

En el país, un grupo significativo de taxones, distribuidos en estos dos grupos biológicos, tienen el mayor número de especies amenazadas, incluyendo a los crocodílidos (50% de especies amenazadas y las tortugas con el 37%) (Morales-Betancourt *et al.* 2015), mientras que para la fauna Amphibia, dos familias de anuros, que incluyen Bufonidae y Craugastoridae, representan el 6% y 13 % de la diversidad amenazada de este grupo.

Una de las áreas que revisten especial interés al interior de la región cisandina (Orinoquia-Amazonia), corresponde a las llamadas áreas de transición, ya que en estas regiones ocurre un encuentro de biotas diferentes desde el punto de vista biogeográfico. En el caso de la sierra de La Macarena (SLM), estas subregiones de transición, corresponden al Área Guaviare-Vichada (AR7), propuesta por Acosta-Galvis *et al.* (2010) y señalada como una de las más desconocidas, con apenas 26 especies de anfibios y 57 de reptiles.

Para el caso particular de las estribaciones surorientales de la SLM (cuenca del Guayabero), el desconocimiento es aún

mayor (Trujillo-Pérez 2015). De acuerdo a los inventarios realizados en los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare y los Llanos del Yarí en los 90, se reconocían 14 especies de anfibios y 33 de reptiles (Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia-CIA-UDEA 1990). Recientemente, se realizó un RAP en Caño Cristales, que reportó 24 especies de anfibios y 27 de reptiles (Barrientos *et al.* 2017), pero no hay mayor información al respecto en la SLM, de ahí la importancia de los resultados que se presentan a continuación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Trabajo de campo

Para los reptiles acuáticos (tortugas y cocrilidos) se hizo una primera evaluación en la estación seca (febrero 2018), en los ríos Guayabero, Losada y Duda. Posteriormente, se volvió a evaluar este grupo durante la época de lluvias (25 de junio al 6 de julio de 2018), pero solo en el medio Guayabero y bajo Losada. Durante esta estación de lluvias se hizo también el inventario de los anfibios y reptiles terrestres. Se seleccionaron dos áreas de muestreo. La primera en la vereda Bajo Raudal, que incluye diferentes formaciones vegetales asociadas al sistema del Escudo Guayanés del río Guayabero (área evaluada entre los días 25-29 de junio de 2018); y la segunda, en la vereda Los Alpes, margen izquierda del bajo río Losada. Esta última ventana (evaluada entre el 30 de junio y el 5 de julio de 2018), incluye áreas inundables y altiplanicie. Las estaciones de muestreo se muestran en la figura 1 y las coordenadas en el anexo 1.

Figura 1. Áreas de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Para el registro de los anfibios y los reptiles se emplearon métodos estandarizados (Figura 2), en base a la selección de unidades de paisaje y su proyección de estudio acorde a los días de trabajo efectivos, siguiendo las metodologías estándar de Heyer *et al.* (1994) y el Manual de técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina (Angulo *et al.* 2006). La captura por unidad de esfuerzo consideró las horas/hombre y picos de actividad de los grupos, tanto en unidades de paisaje natural como agrícola. Los métodos de registro y captura fueron de seis tipos.

1. **Inspección visual “Visual Encounter Surveys” VES.** Se realizaron recorridos extensivos en trayectos de tiempo;

jornada diurna entre las 8:00-11:00 horas y búsqueda nocturna, entre las 19:00-22:00 horas, empleando el método libre de muestreo (Heyer *et al.* 1984, Crump y Scott 1994) (Figura 2a). Se aplicó a todos los grupos.

2. **Remoción.** Este método permitió obtener muestras de especies de lagartos y serpientes fosoriales o asociadas a rocas y troncos en descomposición, e involucra un proceso de selección de áreas potenciales de hallazgo en los macro-hábitats a estudiar. La remoción se realiza en rocas o troncos que no están fijos al sustrato y generalmente están cubiertos por vegetación circundante.

3. **Uso de mallas para remoción de estados larvales.** Permite obtener los estados larvales de algunos grupos de anfibios que dependen de los cuerpos de agua para su reproducción. La importancia de esta metodología es que permite caracterizar especies que no son observables en los estados adultos (Figura 2b).
 4. **Mallas de pesca.** Se utilizaron redes (70 m de largo, 4 m de alto, ojo de malla 14 cm) con poco plomo, las cuales se colocaron en remansos del cauce principal del río y la laguna-madrevieja. Esta técnica es dirigida a la captura de tortugas y crocodílidos. Las mallas permanecían en el agua tanto en el día como en la noche. Se revisaban cada 12 horas (Figura 2c).
 5. **Trampas con cebo.** Para las especies acuáticas (tortugas y crocodílidos); se utilizaron dos tipos de trampas que difieren en tamaño, con carnada (pescado podrido). Estas se colocaron en los caños, quebradas y laguna, se revisaron cada 12 horas (Figura 2d).
 6. **Bioacústica.** Con el fin de adicionar criterios de identificación para las especies de anfibios que vocalizaran, se realizaron grabaciones. Para eso se utilizó una grabadora *Marantz Professional* PMD 671 y un micrófono unidireccional Sennheiser MKH 60 P40. Las grabaciones fueron incorporadas y comparadas con la colección fonográfica de la cuenca del Orinoco.
- Para consolidar el listado general, se consultó la literatura científica especializada

Figura 2. Métodos de muestreo: a) inspección visual, b) malla para remoción de renacuajos, c) trampa de embudo y d) red de ahorque. Fotos: Mónica A. Morales-Betancourt.

y las colecciones de referencia de anfibios (IAvH-Am) y reptiles (IAvH-R). La propuesta taxonómica sigue a Frost (2018) para la fauna Amphibia y Uetz y Hosek (2018) para los reptiles. Los ejemplares fueron fijados en campo en formol 10% siguiendo los criterios bioéticos y posteriormente fueron conservados en una solución etanol al 70%, en la colección de anfibios del Instituto Alexander von Humboldt. También se tomaron muestras de tejido para análisis moleculares posteriores.

Análisis de información

La construcción de la lista de especies y representatividad porcentual por grupos taxonómicos (órdenes y familias), se realizó a partir de los ejemplares provenientes de los dos estudios estacionales (lluvias y sequía), colecciones de referencia y literatura científica. Debido a la complejidad de los ambientes estudiados, se realizaron curvas de acumulación de especies y de rarefacción, con el objeto de evaluar el esfuerzo y proyección del muestreo, pero no como un indicador de la diversidad potencial. En el caso de anfibios este análisis se

fundamentó en la presencia-ausencia de las localidades, mientras que en reptiles en sus abundancias; para este efecto se calcularon varios estimadores de diversidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición taxonómica y riqueza de especies

A partir de tres fuentes de información (literatura, colecciones de referencia y muestreos en las localidades), se consolidó un inventario preliminar de 39 especies de anfibios y 68 reptiles, para las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada (sierra de La Macarena) (Anexo 2, 3).

Anfibios

Este inventario preliminar permite listar 39 especies de anfibios, distribuidas en ocho familias de anuros (Figura 3), de las cuales diez son de distribución estrictamente amazónica y seis orinoquense. Las especies restantes son de amplia distribución en las tierras bajas. Debido a esta condición, todas las especies identificadas son categorizadas como preocupación menor (LC), acorde con la clasificación propuesta para la UICN.

Figura 3. Distribución taxonómica porcentual de los anfibios reportados en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada.

Entre los grupos de mayor dominancia están las ranas arborícolas de la familia Hylidae con 19 especies, seguido de las ranas silbonas (Leptodactylidae) con 10 especies. Una de las características de las unidades de paisaje estudiadas en la región, está relacionada con los frentes de deforestación que determinan la presencia de “áreas potrerizadas” (Figura 4). Estas, junto con las sabanas de la altiplanicie de origen natural, son utilizadas por especies llaneras como *Rhinella beebei*, *Leptodactylus fuscus*, *Elachistocleis ovalis*, *Scinax kennedyi*, *Scinax wandae* y *Pseudopaludicola boliviana*. No obstante, en las áreas de

bosque húmedo tropical original (relictos), se encuentran algunas especies de hábitos boscosos como *Pristimantis vilarsi*, *Boana cinerascens*, *Boana maculateralis*, *Scinax cruentommus*, *Scinax garbei*, *Sphaenorhynchus lacteus* y *Phyllomedusa tarsius*. Por otro lado, en la margen izquierda del río Guayabero -que corresponde al área protegida del Parque Nacional Natural La Macarena-, los ambientes de sabana asociados a los afloramientos rocosos, se encuentran en buen estado de conservación, aspecto que fue evidenciado por abundancia elevada de *Pristimantis vilarsi*, junto con una población de *Leptodactylus* del grupo *fuscus*.

Figura 4. Localización de las formaciones vegetales y sitios de muestreo de anfibios y reptiles terrestres en las cuencas de los ríos Guayabero-Losada. a) Sistema del Escudo Guayanés, río Guayabero, sitios evaluados (estrellas rojas) entre los días 25-29 de junio de 2018. b) Vereda Los Alpes, sitios evaluados (estrellas amarillas) en la margen izquierda del río Losada, que incluye áreas inundables con pequeñas lomas, evaluada entre el 30 de junio y el 5 de julio de 2018.

Al evaluar el grado de similaridad de los sitios estudiados (Figura 5), o de acuerdo con la información disponible, se evidencia que el 10% de las especies presentes son amazónicas, mientras que cerca del 25% son propias de la Orinoquia. Este último aspecto puede estar influenciado por los cambios antropogénicos de los ambientes originales de bosque más el aporte de especies típicas de sabanas naturales.

Curva de acumulación de especies

Esta se construyó a partir de los datos del esfuerzo de captura versus los días de muestreo, en dos de las localidades estudiadas, que incluyen el Bajo Raudal del río Guayabero y la margen derecha del río Losada, en la vereda los Alpes. De acuerdo a las diversas coberturas vegetales disponibles y el tiempo empleado en estas caracterizaciones, estas variables son limitantes en el momento de establecer una caracterización regional real. Uno de los aspectos que son críticos en la estimación de la diversidad de anfibios, es la marcada estacionalidad en los ciclos biológicos de las especies en relación con la efectividad de las técnicas de

inventario implementadas. Por ejemplo, se requieren mayores esfuerzos en la remoción de ambientes fosoriales para la captura de cecilidos (Orden Gymnophiona) o trampas de caída en ambientes de tierra firme para grupos terrestres como los dendrobátidos y microhílidos.

Desde este punto de vista y basados en la literatura científica disponible, se puede establecer que este inventario es preliminar, dada la ausencia en los muestreos de varias especies propias de las áreas inventariadas (muy heterogéneas en su paisaje) de las familias de anuros como Aromobatidae, Dendrobatidae, Bufonidae, Craugastoridae, Microhylidae e Hylidae. También de integrantes de los órdenes Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias). Este aspecto se refleja en las curvas de acumulación de especies, donde el valor teórico esperado, acorde con los diferentes índices, varía entre 25-30 especies (Figura 6). Se recomienda entonces, hacer inventarios asociados a los bosques de tierra firme y bosques inundables en el área del PNN Tinigua y sierra de La Macarena, con el objeto de evaluar los cambios que se están generando por los frentes de deforestación.

Figura 5. Similaridad taxonómica de la fauna Amphibia entre las áreas estudiadas en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada, frente a la diversidad general de anfibios de las regiones de la Orinoquia y la Amazonia.

Figura 6. Curvas de rarefacción para anfibios basado en el número de días y áreas evaluadas en las cuencas de los ríos Guayabero-Losada., entre el 25 junio y 5 de julio de 2018. Se observa que las diferentes curvas apenas alcanzan su estabilidad entre 25-30 especies en un evento de colecta.

Reptiles

Se registraron 68 especies de reptiles distribuidos en seis subórdenes, 25 familias y 49 géneros, siendo los Squamata (lagartos y serpientes) los de mayor riqueza, con el 84% de las especies (Figura 7, Anexo 3). El valor de riqueza presentado es este trabajo es similar a áreas afines de transición Orinoco-Amazonas como la Estrella Fluvial de Inírida-EFI, donde se han reportado valores cercanos a la riqueza encontrada en este trabajo (86 especies) (Renjifo y Acosta 2014), y algo mayor a lo reportado para la serranía La Lindosa, donde registraron 56 especies (Mueses-Cisneros y Caicedo-Portilla 2017, 2018). Entre los escamados identificados en la SLM, se reporta a las familias Colubridae y Teiidae como las más diversas, al igual que lo encontrado en la EFI y serranía La Lindosa.

Las 57 especies de los escamados están distribuidas en 3 subórdenes, 19 familias y 41 géneros. Las serpientes tuvieron el 61% de las especies registradas, siendo la familia Colubridae la de mayor riqueza con 19 especies (54%), donde hay que resaltar la existencia de elementos amazónicos como el

lagarto *Plica umbra* (Tropiduridae), la coral *Micrurus* aff. *albicinctus* y la culebra *Helicops hagmanni*. El suborden Sauria (lagartos) representó el 35% de la riqueza con las familias Teiidae (30%) y Dactyloidae (20%) como las más representativas (Figura 8, Anexo 3). Se registró también la especie introducida *Hemidactylus frenatus*. *Amphisbaena* estuvo representado por dos especies (*Amphisbaena alba* y *Amphisbaena fuliginosa*) y un registro para resaltar de *Bachia guianensis*, cuyos reportes disyuntos la sitúan en el departamento del Vichada. Para este orden no se registraron especies amenazadas.

No se reportan especies amenazadas de escamados (Orden Squamata), pero si hay una especie de especial interés puesto que en la evaluación de riesgo de extinción no se contó con información suficiente para su evaluación, quedando como datos insuficientes (DD). Este es el caso del lagarto *Kentropyx striata*.

Se registraron siete especies de tortugas distribuidas en cuatro familias y cinco géneros. Para este departamento se han

Figura 7. Distribución taxonómica de los reptiles reportados en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada.

Figura 8. Número de especies de Squamata registradas por familia.

referenciado ocho especies (Murillo-Pacheco *et al.* 2014, Ramírez-Villalba *et al.* 2014) y en este estudio faltaría por registrar a la tortuga charapa (*Podocnemis expansa*) que se encuentra En Peligro Crítico (CR) y posiblemente su ausencia sea porque sus poblaciones están muy diezgadas, a lo cual se le puede adicionar que esta área está en sus límites de distribución altitudinal (Martínez-Calleja *et al.* 2005). De las especies registradas, dos especies están amenazadas: la terecay (*Podocnemis unifilis*) y el morrocoy de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius*) (Morales-Betancourt *et al.* 2015a).

La terecay, es una especie acuática y muy abundante en la zona. Se colectaron ejemplares en todas las categorías de edad y sexo, por lo que la población que se localiza en La Macarena es de suma importancia para el mantenimiento de la especie en el país. Se observó una mayor riqueza de tortugas abajo del Cajón del Raudal de Angosturas 1, por lo que la distribución de estas especies, especialmente de las del género *Podocnemis* parece estar limitada por el cajón, que actuaría como una barrera natural para la dispersión de estas especies. Los habitantes locales también reconocieron este patrón. La morrocoy, especie terrestre, no fue muy abundante, sin embargo, el muestreo de tortugas estuvo enfocado en su mayoría en la parte acuática. Otro registro de interés, es el reporte de la tortuga miona (*Mesoclemmys gibba*), ya que es una especie categorizada como DD. La información obtenida en este estudio, aporta elementos técnicos al plan de conservación de tortugas del departamento del Meta (Murillo-Pacheco *et al.* 2014), ya que dicho plan no incluía información para el municipio de La Macarena.

En cuanto a los crocodílidos se registraron las cuatro especies reportadas para la Orinoquia, el caimán llanero o caimán del Orinoco (*Crocodylus intermedius*), la babilla (*Caiman crocodilus*) y los cachirres (*Paleosuchus palpebrosus* y *Paleosuchus trigonatus*). De estas *P. trigonatus* fue la más abundante. Estos registros son de interés, ya que los cachirres son especies que no

cuentan con información en el país, salvo los registros de Federico Medem publicados en los 80, precisamente para el área de La Macarena (Medem 1981).

El caimán llanero está en la categoría más alta de amenaza, En Peligro Crítico y las otras tres están categorizadas como de preocupación menor. La presencia del caimán llanero es reconocida por todos los locales y mencionan que es abundante en el río Duda, donde identifican playas de asoleamiento y áreas de postura. Esto concuerda con la literatura donde se menciona que hay dos relictos poblacionales, uno de ellos en el sistema Duda-Guayabero-Losada y el otro en el sistema Lipa-Ele-Cravo Norte en el Arauca (Medem 1981, Lugo y Ardilla-Robayo 1998). Este relicto poblacional es clave para el país, por lo que es imprescindible un trabajo continuo y articulado con la comunidad local para mantener esta población. Al respecto, Cormacarena está trabajando en la conservación de la especie (Ardila-Robayo *et al.* 2002, Moreno-Arias *et al.* 2016, Capítulo 9), pero desafortunadamente su efectividad está en discusión, y de acuerdo a los habitantes de la vereda Bocas del Duda, hay una campaña en estos momentos por parte de los locales para dar muerte a los caimanes. El único registro visual durante las salidas de campo fue el de un caimán llanero muerto en las bocas del Guayabero con el río Losada (Figura 9), este ejemplar era una hembra adulta liberada en noviembre de 2015 por Cormacarena-Unal para realizar estudios de movimientos.

Por otra parte, es indispensable establecer un programa de monitoreo al caimán llanero para obtener información poblacional, puesto que a pesar de que se han realizado varios trabajos en la zona, no hay información continua en el tiempo que permita establecer el estado de conservación (Morales-Betancourt *et al.* 2015b).

Todos las especies de tortugas y crocodílidos son de distribución compartida entre la Orinoquia y Amazonia, excepto el caimán llanero y la tortuga sabanera (*Podocnemis vogli*) que son endémicas de la Orinoquia (Colombia-Venezuela). También las especies

Figura 9. Caimán llanero (*Crocodylus intermedius*) encontrado muerto en la confluencia de los ríos Guayabero-Losada. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

de estos dos grupos tienen valor de uso especialmente como alimento, excepto la tortuga miona o galápago meón, que no tiene reportado ningún aprovechamiento (Morales-Betancourt *et al.* 2012, 2013), aunque hay que aclarar que no hay información para esta especie en el país.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se aporta al conocimiento de la riqueza de anfibios y reptiles de los ríos Guayabero, Losada y Duda, sin embargo, los listados acá presentados son preliminares y es fundamental continuar con expediciones en el área, a fin de consolidar la riqueza total de las especies. Estos muestreos deben incluir los ecosistemas de bosques de tierra firme y bosques inundables, así como todas las épocas climáticas, ya que para el caso de

las especies terrestres solo se muestreó en la temporada de lluvias.

Se resalta al área como zona de transición, puesto que en esta región hay un encuentro de biotas diferentes desde el punto de vista biogeográfico. Las especies registradas incluyen elementos amazónicos y orinoquenses. Hay que garantizar la conservación de los ecosistemas, puesto que hay áreas que antes mantenían bosques y ahora se han convertido en potreros, homogenizando así el paisaje y por lo tanto también la biota de la región.

En el área, hay especies amenazadas y con valor de uso, las cuales deben ser priorizadas para desarrollar programas de monitoreo, así como determinar, cuantificar y analizar las amenazas a estas especies en la región, con el fin de aportar a los planes de conservación a nivel local, regional y nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta-Galvis, A. R., J. C. Senaris, F. Rojas-Runjaic, D. R. Riano-Pinzon. 2010. Anfibios y reptiles. Capítulo 8. Pp. 258-289. *En*: Lasso, C. A., J. S. Usma, F. Trujillo y A. Rial (Eds.). *Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá, D. C., Colombia.
- Angulo, A., J. V. Rueda-Almonacid, J. V. Rodríguez-Maecha y E. La Marca (Eds.). 2006. Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical Andina. Conservación Internacional. Bogotá, D. C., Colombia. 300 pp.
- Ardila-Robayo, M. C., S. L. Barahona y O. P. Bonilla. 2002. Monitoreo poblacional de *Crocodylus intermedius* (caimán llanero) en los ríos Guayabero y Duda (municipio de la Macarena – Meta). Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia. Informe interno. Bogotá, D. C., Colombia.
- Barrientos, L., M. A. Morales-Betancourt, C. A. Lasso, G. Torres y P. Herrera. 2017. Anfibios y reptiles. Pp. 96-122. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). *III. Fauna de Caño Cristales, Sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia (CIA-UDEA). 1990. Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare y los Llanos del Yarí. Proyecto de Colonización. Volumen IIIB, Fauna Íctica (continuación) y Fauna Terrestre. Pp. 2312-323. *En*: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, Secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la República – SIP. *Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare y los llanos del Yarí*. Proyecto de Colonización. Medellín, Colombia.
- Crump, M. L. y N. J. Scott, Jr. 1994. Visual encounter surveys. Capítulo 2. *En*: Heyer, W. R., M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L. C. Hayek y M. S. Foster (Eds.). *Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians*. Smithsonian Institution Press, Washington.
- Heyer, W. R., M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L. C. Hayek y M. S. Foster (Eds.). 1994. Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press, Washington. 364 pp.
- Lugo, M y M. C. Ardilla-Robayo 1998. Programa para la conservación del caimán del Orinoco (*Crocodylus intermedius*) en Colombia. Proyecto 290. Programa Research Fellowship NYZS. The Wildlife Conservation Society. Proyecto 1101-13-205-92 Colciencias. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Informe interno. Villavicencio. 58 pp.
- Martínez-Calleja, S. J., C. Durán, V. P. Páez, F. Trujillo y A. Trujillo. 2015. Charapa, *Podocnemis expansa*. Pp. 132-136. *En*: Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, V. P. Páez y B. Bock. 2015. *Libro rojo de reptiles de Colombia (2015)*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Universidad de Antioquia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Mueses-Cisneros, J. J. y J. R. Caicedo-Portilla. 2017. Colombia anfibios y reptiles de la Serranía La Lindosa, Cerro Azul y El Capricho. Guía de campo. The Field Museum. http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/866_colombia_anfibios_y_reptiles_de_guaviare.pdf
- Mueses-Cisneros, J. J. y R. Caicedo-Portilla. 2018. Anfibios y reptiles. Pp. 117-126 y 220-225. *En*: Vriesendorp, C., N. Pitman, D. Alvira, A. Salazar, R. Botero, A. Arciniegas, L. de Souza, Á. del Campo, D. F. Stotz, T. Watcher, A. Ravikumar and J. Peplinski (Eds.). *Colombia: La Lindosa, Capricho, Cerritos*. Rapid Biological and Social Inventories Report 29. The Field Museum, Chicago.

- Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, F. Trujillo, J. De La Ossa, G. Forero y V. P. Páez. 2012. Amenazas a las poblaciones de tortugas continentales de Colombia. Pp. 453-492. *En*: Páez, V. P., M. A. Morales-Betancourt, C. A. Lasso, O. V. Castaño-Mora y B. C. Bock. (Eds.). *V. Biología y conservación de las tortugas continentales de Colombia*. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Morales-Betancourt, M. A., A. De La Ossa-Lacayo, J. De La Ossa, C. A. Lasso y F. Trujillo. 2013. Uso de los Crocodylia en Colombia. Pp. 212-229. *En*: Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, J. De la Ossa V. y A. Fajardo-Patiño (Eds.). *VIII. Biología y conservación de los Crocodylia de Colombia*. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, V. P. Páez y B. C. Bock (Eds.). 2015a. Libro rojo de reptiles de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Universidad de Antioquia. Bogotá, D. C., Colombia. 258 pp.
- Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, W. Martínez, M. C. Ardila-Robayo y P. Bloor. 2015b. Caimán llanero, *Crocodylus intermedius*. Pp. 186-190. *En*: Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, V. P. Páez y B. C. Bock. 2015. *Libro rojo de reptiles de Colombia (2015)*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Universidad de Antioquia. Bogotá, D. C., Colombia.
- Moreno-Arias, R. A., M. C. Ardila-Robayo, W. Martínez-Barreto y R. Suárez-Daza. 2016. Navigating with the Orinoco crocodile. *Crocodyle Specialist Group News* IMAADS 35 (2): 14-15.
- Medem, F. 1981. Los Crocodylia de Sur América. Vol I. Los Crocodylia de Colombia. Colciencias. Bogotá, D. C., Colombia. 354 pp.
- Murillo-Pacheco, R., C. Parra-Sandoval, S. L. Parada, J. A. Restrepo, A. L. Murillo y J. J. Villalba. 2014. Avances en la formulación del plan de conservación de especies de orden testudines (tortugas terrestres y dulceacuícolas), reportadas para el departamento del Meta. Cormacarena y Corporación Kotsala, Villavicencio-Meta. Colombia. 44 pp.
- Renjifo J. M. y A. R. Acosta-Galvis. 2014. Anfibios y Reptiles de la Estrella Fluvial Inírida. Pp. 131-153. *En*: Trujillo, F., J. S. Usma y C. A. Lasso (Eds.). 2014. *Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida*. WWF Colombia, CDA, Fundación Omacha, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Ramírez-Villalba, A. M., D. A. Gómez, A. A. Velásquez y S. Mendoza. 2014. Anfibios y reptiles del departamento del Meta, Colombia 1. Guía de campo. The Field Museum. doi:http://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/576_anfibios_y_reptiles_meta_a1.pdf.
- Trujillo-Pérez, G. A. 2015. Diversidad de los reptiles de la Orinoquia colombiana: análisis de los patrones de distribución y relaciones ambientales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Bogotá, D. C., Colombia. 130 pp.
- Uetz, P., Freed, P. y Jirí Hošek (Eds.). 2018. The Reptile Database, <http://www.reptile-database.org>.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

ANEXOS

Anexo 1. Localidades de referencia del muestreo de anfibios y reptiles.

Subcuenca	Localidad	Latitud	Longitud
Guayabero	Río Guayabero, Raudal Angosturas 1	2°17'48,1"N	73°53'11"O
	Río Guayabero, abajo del Raudal Angosturas 1	2°17'37,98"N	73°52'42,05"O
	Caño Temblón, afluente del río Guayabero	2°17'49,4"N	73°52'10"O
	Caño Aguas Claras, afluente del caño Temblón	02°18'01,5"N	73°52'33,4"O
	Caño Cachirre mocho, afluente del río Guayabero. Campamento Acuamen	2°17'31,83"N	73°52'38,33"O
	Río Guayabero entre las bocas con el río Losadas hasta la primera chachivera	02°14'28,14"N	73°52'6,28"O
	Mirador 1, Raudal (campamento Ecoamem)	02°17'45,00"N	73°53'17,7"O
	Ciudad de piedra	02°18'53,2"N	73°53'54,8"O
	Caño al lado de la casa de Ecoamem	02°17'27,9"N	73°52'43,1"O
	Río Guayabero, debajo de la confluencia con el río Losada	2°13'5,82"N	73°49'12,3"O
	Río Guayabero, vereda bocas del Duda, casa Jair	2°32'28,6"N	73°55'53,5"O
	Laguna los Bocachicos, madre vieja afluente del río Guayabero	02°31'52,1"N	73°56'04,3"O
Losada	Confluencia caño Chelo y río Losada	2°11'28,06"N	73°52'25,43"O
	Caño Chelo, afluente río Losada	2°11'21,5"N	73°52'28"O
	Río Losada	2°11'24,08"N	73°52'22,1"O
	Laguna escuela, vereda los Alpes	02°13'4,3"N	73°54'25,7"O
	Potreros vereda los Alpes	02°12'25,58"N	73°58'38,83"O
	Laguna-madre vieja Los Alpes	02°13'3,9"N	73°54'26,4"O
	Río Losada, vereda los Alpes	02°12'4,1"N	73°54'49,9"O
Duda	Caño San Jose, afluente río Duda	2°33'7,3"N	73°56'13,7"O
	Caño Aguas Claras, afluente del río Duda	2°32'36,5"N	73°55'58,5"O
	Caño Jair, afluente del caño Aguas Claras	2°32'31,4"N	73°45'53,5"O

Anexo 2. Lista de anfibios de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Categoría de amenaza de acuerdo a UICN: preocupación menor-LC, no evaluada-NE. Foto: corresponde al número asignado en el anexo 4.

Familia	Especie	Region_Natural	Altitud	UICN	Caño Cristales	Bajo Raudal	PNN Macarena	PNN Tinigua	Río Losada	regional	Colecciones area La Macarena	Foto en anexo 4
Bufonidae	<i>Amazophrynella minuta</i> (Melin, 1941)	Amazonia, Orinoquia	100-550	LC	1					1	IAvH-Am-14825	1
	<i>Rhinella beebei</i> (Gallardo, 1965)	Orinoquia	35-1125	LC	1				1	1	IAvH-Am-(14828, 14832, 15102, 15168-70, 15212-8, 15254-5)	2
	<i>Rhinella gr. margaritifera</i>	Amazonia, Orinoquia		LC	1	1			1	1	IAvH-Am-(15119, 15122, 15126, 15233, 15236, 15267-8)	3
	<i>Rhinella marina</i> (Linnaeus, 1758)	Amazonia, Andina, Orinoquia	0-2400	LC	1	1	1		1	1	IAvH-Am-(15123-5, 15165, 15247)	4
Craugastoridae	<i>Pristimantis vilarisi</i> (Melin, 1941)	Amazonia	200-600	LC	1	1	1	1	1	1	IAvH-Am-(14814-5, 14826, 14836, 14839, 14842, 15094-5, 15103-4, 15116-8, 15140-8, 15153-4, 15224-6, 15242, 15244-6, 15270-1, 15274)	5
Hylidae	<i>Boana boans</i> (Linnaeus, 1758)	Amazonia, Caribe, Orinoquia, Pacífico	0-1230	LC	1				1	1	IAvH-Am-(15241, 15253, 15280-4)	6
	<i>Boana cinerascens</i> (Spix, 1824)	Amazonia, Orinoquia		LC					1	1	IAvH-Am-15250	7
	<i>Boana geographica</i> (Spix, 1824)	Amazonia, Orinoquia	70-500	LC			1			1	IAvH-Am-15120-1	8
	<i>Boana lanciformis</i> (Cope, 1870)	Amazonia, Andina, Orinoquia	70-1650	LC		1		1	1	1	IAvH-Am-(15108, 15234-5)	9
	<i>Boana maculateralis</i> (Caminer & Ron 2014)	Amazonia		NE					1	1	IAvH-Am-15221-3	10
	<i>Boana punctata</i> (Schneider, 1799)	Amazonia, Orinoquia	90-1550	LC	1	1				1	IAvH-Am-(14811, 14837, 15106)	11
	<i>Boana xerophylla</i> (Duméril & Bibron, 1841)	Amazonia, Andina, Caribe, Orinoquia, Pacífico	0-2450	LC	1	1				1	IAvH-Am-(14823, 14831, 14833, 15109-10)	12
	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	Amazonia, Andina, Orinoquia	100-1125	LC	1					1		13
	<i>Osteocephalus buckleyi</i> (Boulenger, 1882)	Amazonia	100-1160	LC	0	0	0	0	0	1	IAvH-Am-3392	
	<i>Osteocephalus taurinus</i> Steindachner, 1862	Amazonia, Orinoquia	50-1100	LC	1				1	1	IAvH-Am-(15201, 15237-8, 15269, 15279)	14
	<i>Scinax cruentommus</i> (Duellman, 1972)	Amazonia		LC					1	1	IAvH-Am-(15202, 15239)	15
	<i>Scinax garbei</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	Amazonia		LC	1					1	IAvH-Am-(15220, 15272-3)	16
	<i>Scinax kennedyi</i> (Pyburn, 1973)	Orinoquia	148-405	LC	1					1	IAvH-Am-(14844, 14847)	17
	<i>Scinax rostratus</i> (Peters, 1863)	Andina, Caribe, Orinoquia	30-1100	LC					1	1		
	<i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)	Amazonia, Andina, Caribe, Orinoquia	0- 1750	LC	1				1	1	IAvH-Am-(7105, 14824, 15166-7, 15171, 15278)	18

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 2. Continuación.

Familia	Especie	Region_Natural	Altitud	UICN	Caño Cristales	Bajo Raudal	PNN Macarena	PNN Tinigua	Rio Losada	regional		Foto en anexo 4
Hylidae	<i>Scinax</i> sp.	Orinoquia		NE	1					1		
	<i>Scinax wandae</i> (Pyburn & Fouquette, 1971)	Orinoquia	35-880	LC	1	1	1		1	1	IAvH-Am-(14812, 14822, 14827, 15107, 15151, 15157, 15256-6, 15276).	19
	<i>Sphaenorhynchus lacteus</i> (Daudin, 1802)	Amazonia, Orinoquia	60-260	LC					1	1		20
	<i>Trachycephalus typhonius</i> (Laurenti, 1768)	Amazonia, Caribe, Orinoquia	0-1700	LC					1	1		21
Leptodactylidae	<i>Adenomera hylaedactyla</i> (Cope, 1868)	Amazonia	87-1400	LC	1					1		22
	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	Amazonia, Andina, Caribe, Orinoquia	0-1650	LC	1	1	1	1	1	1	IAvH-Am-(14817-9, 14834, 14835, 14858, 15105, 15113-5, 15161-3, 15203-11, 15240, 15243, 15285)	23
	<i>Leptodactylus knudseni</i> Heyer, 1972	Amazonia, Orinoquia	45-650	LC					1	1	IAvH-Am-(15229, 15277)	24
	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Amazonia	0-560	LC	1		1		1	1	IAvH-Am-15227-8	25
	<i>Leptodactylus rhodomystax</i> Boulenger, 1883	Amazonia		LC	1					1	IAvH-Am-14830	
	<i>Leptodactylus</i> sp.	Amazonia		NE			1			1	IAvH-Am-(15127-39, 15149-50, 15155)	
	<i>Leptodactylus validus</i> Garman, 1888	Orinoquia		LC	1	1			1	1	IAvH-Am-(15111, 15164, 15248-9)	26
	<i>Lithodytes lineatus</i> (Schneider, 1799)	Amazonia, Orinoquia	80- 1026	LC	1					1	IAvH-Am-(07127, 14845)	
	<i>Pseudopaludicola boliviana</i> Parker, 1927	Amazonia, Orinoquia	100-750	LC	1	1	1	1	1	1	IAvH-Am-(14821, 14840-1, 15097-101, 15112, 15152, 15156, 15158-60, 15197)	27
Microhylidae	<i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799)	Orinoquia	0-580	LC	1				1	1	IAvH-Am-(14816, 14829, 15172-96, 15198-200, 15251-2, 15275)	28
Phyllomedusinae	<i>Phyllomedusa tarsius</i> (Cope, 1868)	Amazonia	70-460	LC	0	0	0	0	0	1	USNM 313928, ICN 2970	
Pipidae	<i>Pipa pipa</i> (Linnaeus, 1758)	Amazonia, Orinoquia	100-500	LC	1	1				2	IAvH-Am-15736	29
	<i>Pipa snethlageae</i> Müller, 1914	Amazonia, Orinoquia	0-100	LC	0	0	0	0	0	1	IAvH-Am-1888	
Ranidae	<i>Lithobates palmipes</i> (Spix, 1824)	Amazonia, Andina, Orinoquia	150-1000	LC					1	1	IAvH-Am-(15219, 15230-2)	30

Anexo 3. Lista de reptiles de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Categoría de amenaza de acuerdo a Morales-Betancourt *et al.* (2015): En Peligro Crítico-CR, En peligro (EN), Vulnerable-VU, preocupación menor-LC, datos insuficientes-DD, no evaluada-NE. En rojo registros que provienen de bibliografía.

orden	Suborden	Familia	Especie	LR	Nombre común	Río Guayabero	Río Losada	Río Duda	Colección IAVH-R	Foto en anexo 4
Squamata	Amphisbaenia	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	LC	Tatacoa / Ciega	1				
			<i>Amphisbaena fuliginosa</i> Linnaeus, 1758	NE	Tatacoa / Ciega	1				
	Sauria	Dactyloidae	<i>Anolis auratus</i> Daudin, 1802	LC		1				31
			<i>Anolis fuscoauratus</i> D'Orbigny, 1837	LC		1	1		04030, 04031	
			<i>Anolis ortonii</i> Cope, 1868	LC						
			<i>Anolis scypheus</i> Cope, 1864	NE	Lagartija	1	1		8729, 8828, 8840	32
		Gekkonidae	<i>Hemidactylus frenatus</i> Duméril & Bibron, 1836		Geko	1			8779	33
		Gymnophthalmidae	<i>Bachia guianensis</i> Hoogmoed & Dixon, 1977	LC			1		8826	
			<i>Leposoma parietale</i> (Cope 1885)	LC			1		4032	
		Hoplocercidae	<i>Enyalioides laticeps</i> (Guichenot, 1855)	LC			1		4019-22, 4034	
		Iguanidae	<i>Iguana iguana</i> Linnaeus, 1758	LC	Iguana	1	1		8839	34
		Polychrotidae	<i>Polychrus</i> aff. <i>marmoratus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Camaleón			1	4024	
		Scincidae	<i>Varzea altamazonica</i> (Miralles, Barrio-Amorós, Rivas, Chaparro-Auza, 2006)	NE		1		1	1508, 4026-7	
		Sphaerodactylidae	<i>Gonatodes riveroi</i> Sturaro y Avila-Pires, 2011	NE	Salamanqueja	1		1	04028, 04029, 01503	35
		Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Lisa	1				
			<i>Cnemidophorus gramivagus</i> McCrystal & Dixon, 1987	LC	Lobito	1		1	8728	36
			<i>Cnemidophorus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)	NE		1		1	01509, 04023, 8731	37
			<i>Kentropyx pelviceps</i> (Cope, 1868)	LC				1	4025, 5969	
			<i>Kentropyx striata</i> (Daudin, 1802)	DD	Lagarto	1			8750	38
			<i>Tupinambis teguixin</i> Linnaeus, 1758	LC	Lobo pollero / Mato	1			8747	39
		Tropiduridae	<i>Plica plica</i> Linnaeus, 1758	NE	Lagartija zanquera	1			1507	
			<i>Plica umbra</i> Linnaeus, 1758	LC	Lagartija zanquera	1				40

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 3. Continuación.

orden	Suborden	Familia	Especie	LR	Nombre común	Río Guayabero	Río Losada	Río Duda	IAVH-R	Foto
Squamata	Serpientes	Aniliidae	<i>Anilius scytale</i> (Linnaeus 1758)	LC	Ciega			1	4016	
		Boidae	<i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758	LC	Guio perdicero / Boa	1		1		
			<i>Corallus hortulanus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Macabrel	1			8832	
			<i>Corallus ruschenbergerii</i> (Cope, 1875)	LC			1			
			<i>Epicrates cenchria</i> Linnaeus, 1758	LC	Boa arcoiris	1		1	4009, 8744	41
			<i>Eunectes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Guio negro / anaconda	1		1	8319, 8827	42
		Colubridae	<i>Atractus</i> sp.				1		8830	43
			<i>Chironius carinatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Lomo de machete	1				44
			<i>Drymoluber dichrous</i> (Peters, 1863)	LC	Cazadora	1				
			<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Falsa coral	1			4787	
			<i>Helicops angulatus</i> Linnaeus, 1758	LC	Mapaná de agua	1	1	1	8831, 8833-7, 8842, 8974-7, 8981	45
			<i>Helicops hagmanni</i> Roux, 1910	LC	Mapaná de agua	1		1	8824, 8971	46
			<i>Imantodes cenchoa</i> Linnaeus, 1758	LC	Bejuquillo	1		1	4012	
			<i>Leptodeira annulata</i> Linnaeus, 1758	LC	Falsa mapaná	1		1	4010, 4011, 8730, 8732	47
			<i>Leptophis ahaetulla</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Bejuquillo	1				
			<i>Lygophis lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC			1			
			<i>Mastigodryas boddaerti</i> Sentzen, 1796	LC	Cazadora	1	1			48
			<i>Oxybelis fulgidus</i> (Daudin, 1803)	LC		1				
			<i>Oxyrhopus petolaris</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Falsa coral	1			8727	49
			<i>Philodryas argentea</i> (Daudin, 1803)	LC				1	4018	
			<i>Philodryas olfersii</i> (Lichtenstein, 1823)	NE				1	4015	
			<i>Philodryas sulphureus</i>	NE		1			7156	
			<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	Toche	1				
			<i>Spilotes sulphureus</i> Boulenger 1894	NE		1			7156	
			<i>Xenodon severus</i> (Linnaeus 1758)	LC		1			4159	
		Dipsadidae	<i>Dipsas catesbyi</i> Sentzen (1796)	LC				1	4013, 8978	50
			<i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)	NE				1	4014	

Anexo 3. Continuación.

orden	Suborden	Familia	Especie	LR	Nombre común	Río Guayabero	Río Losada	Río Duda	IAvH-R	Foto
Squamata	Serpientes	Elapidae	<i>Micrurus aff. albicinctus</i> Amaral, 1925	NE	Coral	1			8829	51
			<i>Micrurus mipartitus</i> (Duméril, Bribron y Duméril, 1854)	LC	Coral	1				
			<i>Micrurus spixii</i> obscurus	NE				1	4006-8	
			<i>Micrurus surinamensis</i> (Cuvier, 1817)	LC	Coral de agua	1	1		8973	52
		Leptotyphlopidae	<i>Epictia cf. signata</i> (Jan, 1861)	NE	Ciega	1				53
		Typhlopidae	<i>Amerotyphlops reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC		1	1	1		
		Viperidae	<i>Bothrops atrox</i> Linnaeus, 1758	LC	Cuatro narices	1	1	1	3015, 4017, 8726, 8822-3, 8838, 8841, 8972, 8979	54
			<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758	LC	Cascabél	1		1	7028	
Testudines	Cryptodira	Kinosternidae	<i>Kinosternon scorpioides</i> Linnaeus, 1766	LC	Guachupe	1		1	08740, 08980	55
		Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> (Spix, 1824)	VU	Morrocroy	1	1			56
			<i>Chelonoidis denticulatus</i> (Linnaeus, 1766)	LC	Morrocroy	1				57
	Pleurodira	Chelidae	<i>Chelus fimbriata</i> Schneider, 1783	LC	Matamata	1			8746	58
			<i>Mesoclemmys gibba</i> (Schweigger, 1812)	DD	Miona	1	1		8825	59
		Podocnemididae	<i>Podocnemis unifilis</i> Troshchel, 1848	EN	Terecay	1	1			60
			<i>Podocnemis vogli</i> Müller, 1935	LC	Sabanera	1	1		8745, 8751	61
Crocodylia	Eusuchia	Alligatoridae	<i>Caiman crocodilus</i> Linnaeus, 1758	LC	Babilla, cachirre	1	1	1	08089, 08748	62
			<i>Paleosuchus palpebrosus</i> Cuvier, 1807	LC	Cachirre	1	1		8749	63
			<i>Paleosuchus trigonatus</i> Schneider, 1801	LC	Cachirre	1	1	1	8843-4	64
		Crocodylidae	<i>Crocodylus intermedius</i> (Graves, 1819)	CR	Caimán llanero	1	1	1		65

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Catalogo de especies.

1. *Amazophrynella minuta*.

2. *Rhinella beebei*.

3. *Rhinella gr. margaritifera*.

4. *Rhinella marina*.

5. *Pristimantis vilarsi*.

6. *Boana boans*.

Lamina 1. Fotos: 1. Lucas S. Barrientos; 2-6. Andrés R. Acosta-Galvis.

Anexo 4. Continuación.

7. *Boana cinerascens*.

8. *Boana geographica*.

9. *Boana lanciformis*.

10. *Boana maculateralis*.

11. *Boana punctata*.

12. *Boana xerophylla*.

Lamina 2. Fotos: 7-12. Andrés R. Acosta-Galvis.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Continuación.

13. *Dendropsophus minutus*.

14. *Osteocephalus taurinus*.

15. *Scinax cruentommus*.

16. *Scinax garbei*.

17. *Scinax kennedyi*.

18. *Scinax ruber*.

Lamina 3. Fotos: 13. Lucas S. Barrientos; 14-16, 18. Andrés R. Acosta-Galvis; 17. Camila Durán-Prieto.

Anexo 4. Continuación.

19. *Scinax wandae*.

20. *Sphaenorhynchus lacteus*.

21. *Trachycephalus typhonius*.

22. *Adenomera hylaedactyla*.

23. *Leptodactylus fuscus*.

24. *Leptodactylus knudseni*.

Lamina 4. Fotos: Andrés R. Acosta-Galvis.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Continuación.

25. *Leptodactylus mystaceus*.

26. *Leptodactylus validus*.

27. *Pseudopaludicola boliviana*.

28. *Elachistocleis ovalis*.

29. *Pipa pipa*.

30. *Lithobates palmipes*.

Lamina 5. Fotos: 25-28, 30. Andrés R. Acosta-Galvis; 29. Jorge E. García-Melo.

Anexo 4. Continuación.

31. Lagartija (*Anolis auratus*).

32. Lagartija (*Anolis scyphus*).

33. Geko (*Hemidactylus frenatus*).

34. Iguana (*Iguana iguana*).

35. Salamaqueja (*Gonatodes riveroi*).

36. Lobito (*Cnemidophorus gramivagus*).

Lamina 6. Fotos: 31. Camila Duran; 32, 34, 35. Andrés R. Acosta-Galvis; 33, 36. Lucas S. Barrientos.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Continuación.

37. Lobito (*Cnemidophorus lemniscatus*).

38. Lagarto (*Kentropyx striata*).

39. Lobo pollero / Mato (*Tupinambis teguixin*).

40. Lagartija zanquera (*Plica umbra*).

41. Boa arcoiris (*Epicrates cenchria*).

42. Güio negro / anaconda (*Eunectes murinus*).

Lamina 7. Fotos: 37. Fernando Trujillo; 38, 40. Fernando Rojas-Runjaic; 39. Monica A. Morales-Betancourt; 41 Lucas S. Barrientos; 42. Andrés R. Acosta-Galvis.

Anexo 4. Continuación.

43. Serpiente (*Atractus* sp.).

44. Lomo de machete (*Chironius carinatus*).

45. Mapaná de agua (*Helicops angulatus*).

46. Mapaná de agua (*Helicops hagmanni*).

47. Falsa mapaná (*Leptodeira annulata*).

48. Cazadora (*Mastigodryas boddaerti*).

Lamina 8. Fotos: 43, 45, 46. Andrés R. Acosta-Galvis; 44. Fernando Trujillo; 47, 48. Lucas S. Barrientos.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Continuación.

49. Falsa coral (*Oxyrhopus petolarius*).

50. Caracolera (*Dipsas catesbyi*).

51. Coral de agua (*Micrurus* aff. *albicinctus*).

52. Coral de agua (*Micrurus surinamensis*).

53. Ciega (*Epictia* cf. *signata*).

54. Cuatro narices (*Bothrops atrox*).

Lamina 9. Fotos: 49. Lucas S. Barrientos; 50, 52. Monica A. Morales-Betancourt; 51, 54. Andrés R. Acosta-Galvis; 53. Ivan Mikolji.

Anexo 4. Continuación.

55. Guachupe (*Kinosternon scorpioides*).

56. Morrocay de patas rojas (*Chelonoidis carbonarius*).

57. Morrocay de patas amarillas (*Chelonoidis denticulatus*).

58. Matamata (*Chelus fimbriata*).

59. Miona (*Mesoclemmys gibba*).

60. Terecay (*Podocnemis unifilis*).

Lamina 10. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.

Capítulo 6. ANFIBIOS Y REPTILES

Anexo 4. Continuación.

61. Sabanera (*Podocnemis vogli*).

62. Babilla, cachirre (*Caiman crocodilus*).

63. Cachirre (*Paleosuchus palpebrosus*).

64. Cachirre (*Paleosuchus trigonatus*).

65. Caimán llanero (*Crocodylus intermedius*).

Lamina 11. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.

Rana acuática (*Pipa pipa*). Foto: Jorge E. García-Melo.

Ganso del Orinoco (*Oressochen jubatus*). Foto: Federico Mosquera-Guerra.

Aves del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, con énfasis en los ríos Guayabero medio (sector Raudal de Angosturas I), bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Andrés M. Cuervo, Andrés Lomelín y Juan de la Cruz Amado

Resumen. El Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM y en particular la región de la sierra de La Macarena, son áreas de gran interés biogeográfico, pues en ellas confluyen especies andinas, orinoquenses (Llanos, Escudo Guayanés) y amazónicas. Se presenta un diagnóstico sobre la avifauna del AMEM y se incluyen los resultados de una evaluación biológica rápida de la avifauna realizada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial de La Macarena-Cormacarena, durante la estación de lluvias (2018) a los ríos Guayabero (Raudal I) y bajo Losada, junto con los estudios reportados en literatura científica, bases de datos y plataformas ornitológicas. Como resultado se reconocen 737 especies, agrupadas en 530 géneros, 71 familias y 27 órdenes. Se incluye información sobre nuevas ampliaciones de distribución. El AMEM es una de las regiones con mayor riqueza de aves en Colombia, lo cual amerita una mirada más profunda por parte de ornitólogos e instituciones responsables de la conservación en Colombia.

Palabras clave. Amazonia. Andes. Biogeografía. Escudo Guayanés. Sierra de La Macarena.

Abstract. The Special Management Area of La Macarena (AMEM) and in particular the region of the Sierra de La Macarena, are areas of great biogeographical interest, since Andean, Orinoco River (Llanos, Guiana Shield) and Amazonian species converge there. A diagnosis of the AMEM avifauna is presented along with the results of a rapid biological survey of the avifauna carried out by the Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute and the Corporation for the Sustainable Development of the Special Area of La Macarena (Cormacarena). The survey was done during the rainy season (2018) in the drainages of the Guayabero (Raudal I) and lower Losada Rivers. Records were also included from other studies of this area reported in scientific literature, databases and ornithological platforms. As a result, 737 species were listed, grouped

Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt, A. M. Cuervo, A. Lomelín y J. C. Amado. 2018. Aves del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, con énfasis en los ríos Guayabero medio (sector Raudal de Angosturas I), bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 211-261. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

into 530 genera, 71 families and 27 orders. Information on new distribution range extensions is included. We conclude that the AMEM is one of the regions of Colombia with the highest number of birds, which warrants a deeper look by ornithologists and institutions responsible for conservation in Colombia.

Keywords. Amazon River Basin. Andes Mountains. Biogeography. Guiana Shield. Sierra de La Macarena.

INTRODUCCIÓN

El Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM y en particular la sierra de La Macarena-SLM, ha sido de gran interés para naturalistas y científicos desde el siglo pasado, especialmente para botánicos y zoólogos. Entre estos últimos, destaca todo lo relativo a la avifauna, pues ha sido este grupo uno de los más estudiados de toda la biodiversidad regional. En esta región, confluyen elementos andinos, orinoquenses y amazónicos (Blake 1962, Lemke y Gertler 1978, Cadena *et al.* 2000, Losada-Prado *et al.* 2017). Entre los trabajos clásicos a destacar están los de Gillard (1942), Philipson *et al.* (1951), Blake (1962) y Lemke y Gertler (1978) sobre la SLM. En 1990, el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia/CIA-UA (1990), desarrolló una serie de muestreos en la cuenca del río Losada y en la SLM, y compiló información bibliográfica y de colecciones sobre esas áreas. Cadena *et al.* (2000) realizaron un inventario muy completo en el río Duda (PNN Tinigua) y Murillo-Pacheco y Bonilla-Rojas (2016), señalan algunas ampliaciones de distribución con especies presentes en el AMEM y SLM. Los aportes más recientes, corresponden a los trabajos de Losada-Prado *et al.* (2017) para Caño Cristales, utilizando observaciones visuales, capturas y registros auditivos, y a Stevenson (2018, este libro), que recoge los resultados de las investigaciones realizadas por Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (Universidad de Los Andes) durante la década del 90, sobre la abundancia de grandes aves en el PNN Tinigua. Por último, hay que reseñar la evaluación ornitológica más reciente en 2018, realizada por el Insti-

tuto Humboldt y Cormacarena, al área de los ríos Guayabero y Losada (Cuervo *et al.* 2018). Una síntesis histórica de la expediciones realizadas a la SLM se muestra en el trabajo de Losada-Prado *et al.* (2017).

Desde el punto de vista ornitológico, la SLM es una subregión biogeográfica claramente definida, y a pesar de las expediciones previamente señaladas, es considerada todavía con un nivel de muestreo y conocimiento bajo (Restrepo-Calle *et al.* 2010). La SLM también ha sido nominada como un área de importancia para la conservación de las aves, definida como Macarena-Tinigua-Picachos (Lasso *et al.* 2010, Restrepo-Calle *et al.* 2010). Por estas razones todo el AMEM y en especial la SLM son de especial interés para el Instituto Humboldt y Cormacarena. A continuación se muestra la actualización sobre la información ornitológica de esta región, con énfasis en los ríos Guayabero medio y bajo Losada.

MÉTODOS

Se hizo una revisión bibliográfica y de colecciones/bases de datos validadas, incluyendo todas las publicaciones disponibles al respecto (ver bibliografía). Esta matriz de datos se enriqueció con los registros del SIB y literatura publicada en el área de sierra de La Macarena-Caño Cristales y alrededores (Losada-Prado *et al.* 2017, 2018) y serranía de La Lindosa (López-O. *et al.* 2018). Con la información anterior y los datos generados derivados del trabajo de campo (Cuervo *et al.* 2018), en el marco de la evaluación biológica rápida realizada por Instituto Humboldt-Cormacarena

Figura 1. Métodos de registro de aves, observación directa y grabación auditiva. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

durante la estación lluviosa del 2018 (junio-julio) (Figura 1), se elaboró el listado de especies del AMEM (Anexo 1). También se presentan el listado de aves reportadas en eBird-Colombia, correspondientes a los 81 recorridos de observación durante la evaluación (Cuervo *et al.* 2018). Con estos datos se generó un listado de especies, el cual se ajustó a la taxonomía de Avendaño *et al.* (2017) y Remsen *et al.* (2018). Las categorías de amenaza fueron consultadas en Rengifo *et al.* (2014, 2016) y UICN; las distribuciones geográficas fueron corroboradas con Hilty y Brown (1986), Ayerbe-Quinones (2018) y los portales de datos de eBird y Neotropical Birds. Para la identificación en campo se utilizaron las guías de Hilty y Brown (1986), Restall *et al.* (2006) y Ayerbe-Quinones (2018). También se señalan las especies en las cuatro principales unidades

geográficas analizadas: Caño Cristales (Losada-Prado *et al.* 2017), sierra de La Macarena (Losada-Prado *et al.* 2018, en preparación), PNN Tinigua (Cadena *et al.* 2000) y medio río Guayabero (sector Raudal D)-bajo Losada (Cuervo *et al.* 2018).

RESULTADOS

Composición taxonómica y riqueza de especies

De acuerdo al trabajo de la revisión bibliográfica, colecciones, bases de datos, plataformas ornitológicas y trabajo de campo (2018), el AMEM tendría un número aproximado de 737 especies, agrupadas en 530 géneros, 71 familias y 27 órdenes (Anexo 1). De manera resumida, este alto número de especies fue un compilado del PNN Tinigua-río Duda (Cadena *et al.* 2000), de

Capítulo 7. AVES

Caño Cristales y alrededores (Losada-Prado *et al.* 2017), del sector río Guayabero medio (Raudal I y áreas adyacentes) y el bajo río Losada (Cuervo *et al.* 2018).

El orden más representativo fue Passeriformes (aves de percha) con 410 especies, seguido de Apodiformes (vencejos, colibríes) con 44 sp., Piciformes (capinteros, tucanes) con 33 sp., Accipitriformes (águilas) con 33 sp., Psittaciformes (guacamayas, loras, cotorras) con 28 sp., Pelecaniformes (garzas, coquitos) con 25 sp., y Galbuliformes (jacamares) con 23 sp. Los órdenes restantes presentaron menos de 20 especies. Hubo

órdenes con una sola especie o familia como los Eurypygiformes (garza del sol), Opisthocomiformes (pava hedionda), Podicipediformes (zambullidor) y Steatornithiformes (güacharos o carracos) (Figura 3). Con respecto a las familias, la que registró el mayor número de especies fue Tyrannidae (atrapamoscas) con 95 especies, seguida de Thamnophilidae (hormigueros) con 72 especies, Thraupidae (tángaras) con 58 especies y Furnariidae (trepatroncos y afines) con 44 especies. En el anexo 2 se muestran fotografías de algunas de las especies listadas, representativas del AMEM.

Figura 3. Composición taxonómica: número general de especies, géneros y familias para los diferentes órdenes.

No se encontraron especies endémicas de la región. Se consideran cuatro especies amenazadas en categoría Vulnerable a nivel global por UICN: *Agamia agami*, *Myrmotherula sunensis*, *Patagioenas subvinacea* y *Oressochen jubatus*. A nivel nacional se mantiene la categoría del ganso del Orinoco (*Oressochen jubatus*) (Renjifo *et al.* 2018). Además, 12 especies son objeto de aprovechamiento como uso alimenticio y otras 12 como mascotas. Finalmente, se registraron 67 especies consideradas migratorias, de las cuales 14 son migratorias australes, 50 son migratorias boreales; las especies *Tyrannus savana* y *Vireo olivaceus* presentan poblaciones migrantes australes y boreales y la especie *Crotophaga major* (garrapatero mayor) fue la única especie migratoria intratropical.

DISCUSIÓN

El AMEM con sus diferentes elementos paisajísticos y unidades biogeográficas, se convierte en una de las regiones con mayor riqueza de especies (737) en Colombia. En esta área se encuentra el 38,6% del total de especies conocidas para el país y el 97 % del Escudo Guayanés colombiano (Losada-Prado *et al.* 2018). Ya el CIA-UDEA (1990), reconocía para todo el complejo de las cuencas Guayabero-Duda-Losada-Guaviare y Llanos del Yari, 218 especies de aves, de las cuales 11 eran registradas para la SLM y 66 para el río Losada. La riqueza de especies registrada para cada una de las cuatro unidades analizadas, puede considerarse como alta en comparación con otros estudios realizados a nivel de inventarios en áreas vecinas de los Andes, Amazonia y Orinoco (Llanos-Escudo Guayanés) de Colombia. Por ejemplo, la región de la serranía de La Lindosa registra 226 especies (López-O. *et al.* 2018), el PNN Chiribiquete 358 (Stiles y Naranjo 2017) y la Estrella Fluvial Inírida 527 especies (Naranjo *et al.* 2014). Por otro lado, el área del Escudo Guayanés venezolano tiene 889 especies registradas (Lentino *et al.* 2018). Estas comparaciones dan una idea del gran potencial avifaunístico de la región

En el estudio realizado en época de lluvias en los ríos Guayabero y Losada (Cuervo *et al.* 2018), hay que destacar las ampliaciones de distribución geográfica, así como la grabación de audios de especies muy poco conocidas en Colombia. Por ejemplo, se registró al carpintero telegrafista (*Picumnus ruficeps*), más al norte de su área de distribución conocida, incluida la SLM y el departamento del Meta; las grabaciones del canto registradas para esta especie -aunque requieren un análisis más profundo- muestran que son divergentes a los cantos del sur (Amazonia ecuatoriana y peruana). El hormiguerito de várzea amazónica (*Hylophylax punctulatus*, *Thamnophilidae*), era considerada como una especie muy rara, apenas conocida de unos pocos ejemplares y reseñada solo para el PNN Tinigua en el río Duda (Cadena *et al.* 2000), sin embargo, fue muy abundante en el bosque rebalse del río Losada durante la evaluación realizada en el 2018 por el Instituto Humboldt y Cormacarena. Otra especie, *Schiffornis major* -Tityridae- observada en dicha evaluación, constituye el primer registro para el Meta y se cuenta con grabaciones que así lo demuestran (Cuervo *et al.* 2018). Otras especies muy interesantes y raras por lo poco abundantes en otras áreas, son el atrapamoscas (*Tolmomyias traylori*, *Tyrannidae*), que fue muy común en los bosques de rebalse del río Losada y *Hemitriccus striaticollis* -*Tyrannidae*-, una especie con una distribución disyunta, conocida de la Amazonia brasileña y peruana, que se registró con frecuencia en los muestreos en arbustales y sabanas de La Macarena. En ambos casos se cuentan con grabaciones. A este listado se le podrían sumar especies no detectadas en un principio en campo y presentes en las grabaciones sonoras, particularmente de los coros del amanecer (Cuervo *et al.* 2018), por lo que la riqueza global del área como se mencionó anteriormente podría ser aún mayor.

Otro aspecto importante a mencionar, se refiere a los patrones biogeográficos detectados, dada la confluencia de elementos andinos, orinoquenses y amazónicos. Por ejemplo, en el río Guayabero la ornitofauna

es típicamente orinoquense, con especies llaneras (sabaneras) y del Escudo Guayanés (bosques). Por otro lado, en el río Losada las aves registradas son en su gran mayoría amazónicas. Al respecto, es muy posible que los corredores de los ríos favorezcan la dispersión de las especies orinoquenses, aunque no hay que descartar que la deforestación en muchas áreas del AMEM haya favorecido este proceso, en especial para las especies de sabana. Olivares (1962), ya había reconocido la mayor afinidad de la avifauna de la SLM con las tierras bajas amazónicas. Igualmente Losada-Prado *et al.* (2017), señalaron que la importancia o particularidad de la avifauna en la región de Caño Cristales radica en que se encuentra constituida por especies de las regiones andina, amazónica y especialmente del Escudo Guayanés. Así, si se comparan, por ejemplo, los estudios realizados en Caño Cristales con los del Escudo Guayanés venezolano (Lentino 2006, Lentino y Salcedo 2008, Lentino *et al.* 2009), destaca el registro de géneros de especies compartidas como *Cephalopterus*, *Amazona*, *Eupsittula*, *Forpus*, *Chloroceryle*, *Pteroglossus*, *Pata-gioenas*, *Mionectes*, *Myrmotherula*, y especies de la familia Tyrannidae, entre otras, lo cual estaría indicando una conexión directa entre estas dos regiones y demuestra cómo la región de La Macarena es un área de gran incidencia en el establecimiento de avifauna de la gran región biogeográfica del Escudo Guayanés (Losada-Prado *et al.* 2017).

En cuanto a la conservación de la avifauna regional, salvo los casos de áreas puntuales deforestadas -que no obstante van incrementando de manera alarmante en número y superficie-, puede decirse que el estado de conservación de las aves en el AMEM está en buenas condiciones. El PNN Sierra de La Macarena y el PNN Tinigua a pesar de que también son objeto de afectaciones recientes como incendios y deforestación, garantizan en gran medida la conservación de la avifauna regional. También aportan a la conservación los Distritos de Manejo Integral-DMI de Cormacarena (Lasso y Morales-Betancourt 2017). Asimismo, de toda la región y según datos

disponibles, el río Duda sería la zona mejor conservada. En esta parte hay aves de gran tamaño que difícilmente se encuentran en otras regiones intervenidas. En sentido, Stevenson (Capítulo 11, este libro), reporta la presencia de poblaciones abundantes de aves grandes de interés alimenticio como paujiles (*Mitu salvini* y *Crax alector*), trompeteros (*Psophia crepitans*) y las pavas carrozas (*Penelope jacquacu*) y cuyuyas (*Pipile cumanensis*). Es importante resaltar que varias especies son utilizadas para consumo aunque no hay datos del efecto de este tipo de cacería sobre cada una de dichas especies. Tampoco hay información sobre especies objeto de tráfico en el AMEM, pero se conoce que en el departamento del Meta las aves constituyen el 54,6% de total del número de especies decomisadas, siendo *Amazona farinosa* la más abundante. Al respecto, el mayor número de especies decomisadas provienen de los municipios más cercanos a las áreas protegidas como el PNN Sierra la Macarena (MADS 2012).

El alto número de especies migratorias convierte a ésta área en un indicador efectivo de corredor de movimiento para aves, migratorias, lo que debe traducirse en un área importante para el estudio de este tipo de aves y, sobretodo, para la conservación de hábitats específicos. Finalmente, el gran número de aves polinizadoras y dispersoras de semillas tiene un valor incalculable al momento de evaluar temas sobre bienes y servicios, ecosistémicos a escalas regionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

La riqueza de especies registrada a escala regional (AMEM) puede considerarse como muy alta, y a escala local -por unidades de análisis- como alta. Muchas de las especies pueden considerarse como emblemáticas o ser consideradas como objetos de conservación por las autoridades ambientales regionales (PNN y Cormacarena), y sobre todo, aquellas especies con amplias áreas de distri-

bución, para aprovechar su efecto sombilla sobre ecosistemas terrestres y acuáticos.

La región ha sido nominada como un área importante para la conservación de aves, definida como Macarena-Tinigua-Picachos (Lasso *et al.* 2010, Restrepo-Calle *et al.* 2010), por lo que es fundamental seguir realizando estudios en toda la región incluyendo la parte alta de los ríos principales y en especial el *plateau* o tope de la meseta de la Sierra. Además, sería conveniente revisar otras estrategias de conservación como “corredores de conservación” que involucren áreas hacia el oriente de esta

región para así conectar áreas específicas y alejadas, como por ejemplo, la cuenca media del río Guaviare.

Con respecto a las especies de uso alimenticio, se requiere de estudios que evalúen el efecto de dicho consumo sobre los tamaños poblacionales, demografía de las especies y sobre sus dinámicas poblacionales.

Finalmente, es recomendable realizar monitoreos en la región para evaluar las especies raras y con pocos registros especificados en la discusión, también fomentar la práctica de aviturismo u observación de aves dado el gran potencial en el área.

BIBLIOGRAFÍA

- Avendaño, J. E., C. I. Bohórquez, L. Rosselli, D. Arzuza-Buelvas, F. A. Estela, A. M. Cuervo, F. G. Stiles y L. M. Renjifo. 2017. Lista de chequeo de las aves de Colombia: Una síntesis del estado del conocimiento desde Hilty y Brown (1986). *Ornitología Colombiana* 16: 1-86.
- Blake, M. R. 1962. Birds of the Sierra de La Macarena, Eastern Colombia. *Chicago Natural History Museum* 44 (11): 69-112.
- Cadena, C. D., M. Alvarez, J. L. Parra, Jiménez, I. Mejía, C. A. Santamaría, M. Franco, A. M. Botero, C. A. Mejía, G. D. Umaña y A. Calixto. 2000. The birds of CIEM, Tinigua National Park, Colombia: an overview of 13 years of ornithological research. *Cotinga* 13: 46-54.
- Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia. 1990. Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare y los Llanos del Yarí. Proyecto de Colonización. Volumen IIIB, Fauna Íctica (continuación) y Fauna Terrestre. Pp. 2312-323. *En:* Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, Secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la República – SIP. *Diagnóstico y plan de desarrollo de las cuencas de los ríos Duda-Guayabero-Losada Guaviare y los llanos del Yarí*. Proyecto de Colonización. Medellín, Colombia.
- Cuervo, A. M., A. Lomelín y J. De La Cruz-Amado. 2018. Aves. Pp. 45-59. *En:* Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Comp.). *Evaluación de la biodiversidad acuática del río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta. II: aguas altas*. Convenio No17-194 IAvH. PE GDE 1.4.7.17.030 de 2017. Cormacarena-IAvH. Informe final. Bogotá, D. C., Colombia.
- Gilliard, E. T. 1942. The Cordillera Macarena, Colombia. *The Geographical review* 32 (3): 462-470.
- Hilty, S. y W. L. Brown. 1986. A guide to the birds of Colombia. New Jersey: Princeton University Press. 836 pp.
- Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt. 2017. III. Fauna de Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Serie Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 187 pp.
- Lasso, C. A., J. S. Usma, F. Trujillo y A. Rial (Eds.). 2010. Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá, D. C., Colombia. 609 pp.

- Lemke, T. O. y P. E. Gertler. 1978. Recent observations on the birds of the sierra de La Macarena, Colombia. *The Condor* 80 (4): 453-455.
- Lentino, M. 2006. Avifauna de la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, Estado Amazonas, Venezuela. Pp 136-140. *En*: Lasso, C. A., J. C. Señaris, A. Rial y A. L. Flórez (Eds.). *Evaluación Rápida de la Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos en la Confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, Estado Amazonas (Venezuela)*. Conservación Internacional. Caracas, Venezuela. 241 pp.
- Lentino, M. y M. Salcedo. 2008. Aves de la cuenca alta del río Paragua, Estado Bolívar. Pp. 144-150. *En*: Señaris, J. C., C. A. Lasso y A. L. Flórez (Eds.). *Evaluación Rápida de la Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos de la Cuenca Alta del Río Paragua, Estado Bolívar, Venezuela*. Conservación Internacional. Caracas, Venezuela. 308pp.
- Lentino, M., M. Salcedo y D. Ascanio. 2009. Aves de la cuenca alta del río Cuyuní, Estado Bolívar: Resultados del RAP alto Cuyuní 2008. Pp. 156-163. *En*: Lasso, C. A., J. C. Señaris, A. Rial y A. L. Flórez (Eds.). *Evaluación Rápida de la Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos de la Cuenca Alta del Río Cuyuní, Guayana Vebezolana*. Conservación Internacional. Caracas, Venezuela. 235 pp.
- Lentino, M., M. Salcedo y V. Malavé. 2018. Aves del Escudo Guayanés venezolano. Pp. Xxxx. *En*: Lasso, C. A. y J. C. Señaris (Eds.). *VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Levatich, T. y F. Padilla. 2017. EOD - eBird Observation Dataset. Cornell Lab of Ornithology. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/aomfnb> accessed via GBIF.org on 2018-09-18.
- López-O. J. P., E. Carrillo y W. A. Ramírez. 2018. Aves. Pp 127-138. *En*: Vriesendorp, C., N. Pitiman, D. Alvira, A. Salazar, R. Botero, A. Arciniegas, L. de Souza, Á. del Campo, D. F. Stotz, T. Watcher, A. Ravikumar and J. Peplinski (Eds.). *Colombia: La Lindosa, Capricho, Cerritos*. Rapid Biological and Social Inventories Report 29. The Field Museum, Chicago.
- Losada-Prado, S., E. A. Tenorio y M. F. Alfonso. 2017. Aves. Pp. 125-156. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). 2017. *III. Fauna de Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Losada-Prado, S., Gaitán-García, C. D. 2018. Aves de la Guayana colombiana. Pp. ----. *En*: Lasso, C. A. y J. C. Señaris. *VI. Fauna silvestre del Escudo Guayanés (Colombia-Venezuela)*. Serie Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- MADS-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012. Estrategia nacional para la prevención y control al tráfico ilegal de especies silvestres: diagnóstico y plan de acción ajustado. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, D. C., Colombia. 100 pp.
- Murillo-Pacheco, J. I. y W. F. Bonilla-Rojas. 2016. New records and distribution extensions of some bird species in the Colombian Andean-Orinoco, department of Meta. *Check List* 12 (2): 1876.
- Naranjo, L. G., S. Restrepo y J. Zamudio 2014. Aves de la Estrella Fluvial Inírida. Pp. 155-167. *En*: Trujillo, F., J. S. Usma y C. A. Lasso (Eds.). *Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida*. WWF Colombia, CDA, Fundación Omacha, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Olivares, A. 1962. Aves de la región sur de la Sierra de La Macarena, Meta. Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias* 11 (44): 305-344.
- Philipson, W. R., C. C. Doncaster y J. M. Idrobo. 1951. An expedition to the Sierra de la Macarena, Colombia. *The Geographical Journal* 117 (2): 188-199.
- Raz, L. y H. Agudelo. 2016. ICN - Universidad Nacional de Colombia. Version 2.2. Universidad Nacional de Colombia. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15472/v2lnzj> accessed via GBIF.org on 2018-09-20.

- Red Nacional de Observadores de Aves-RNOA. 2014. DATAVES. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/mbwuat> accessed via GBIF.org on 2018-09-18.
- Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz by K. J. Zimmer. Version [01/10/2018]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Renjifo, L. M., A. M. Amaya-Villarreal, J. Burbano-Girón, y J. Velásquez-Tibatá. 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abiertos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Renjifo, L. M., M. F. Gómez, J. Velásquez-Tibatá, A. M. Amaya-Villarreal, G. H. Kattan, J. D. Amaya-Espinel y J. Burbano-Girón. 2014. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen I: Bosques Húmedos de los Andes y la Costa Pacífica. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Restall, R., C. Rodner y M. Lentino. 2006. Birds of Northern South America. An Identification Guide. Yale University Press, New Haven and London. 656 pp.
- Restrepo, S., M. Lentino y L. G. Naranjo. 2010. Aves. Pp. 291-310. *En*: Lasso, C. A., J. S. Usma, F. Trujillo y A. Rial (Eds.). *Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad*. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá, D. C., Colombia.
- Stiles, G. y L. G. Naranjo. 2017. La avifauna del Parque Nacional Natural Chiribiquete: resultados de tres expediciones recientes a sectores previamente inexplorados. *Revista Colombiana Amazonica* 10: 141-160.

ANEXOS

Anexo 1. Listado de aves reportadas para el Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, basado en registros bibliográficos, de colecciones y listado de la evaluación realizada al río Guayabero (Raudal I) y bajo Losada (Cuervo *et al.* 2018) de junio 25 y julio 6 de 2018. El orden taxonómico y nomenclatura sigue a Avendaño *et al.* (2017) y Remsen *et al.* (2018). R: residentes; Mb: migratorio boreal; Ma: migratorio austral; R-Mb-Ma: migratorias boreales y australes; R-MI: migratorio intratropical; C: cacería; M: mascotas.

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada <i>et al.</i> 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena <i>et al.</i> 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus major</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Tinamus guttatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Crypturellus cinereus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Crypturellus soui</i>	R	LC	LC	C	x	x	x		
		<i>Crypturellus undulatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Crypturellus duidae</i>	R	LC	NT	C	x				
		<i>Crypturellus variegatus</i>	R	LC	LC				x	x	
Anseriformes	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i>	R	LC	LC			x	x		1
	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Oressochen jubatus</i>	R	VU	VU				x	x	2
		<i>Cairina moschata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	R-Ma?	LC	LC					x	
		<i>Anas discors</i>	Mb-R	LC	LC				x	x	
Galliformes	Cracidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Penelope argyrotis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Penelope montagnii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Penelope jacquacu</i>	R	LC	LC	C	x	x	x		
		<i>Pipile cumanensis</i>	R	LC	LC				x	x	3
		<i>Ortalis ruficauda</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Ortalis guttata</i>	R	LC	LC	C	x	x	x		
		<i>Nothocrax urumutum</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Crax alector</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Mitu tomentosum</i>	R	LC	LC					x	4
		<i>Mitu salvini</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Mitu tuberosum</i>	R	LC	LC					x	
	Odontophoridae	<i>Colinus cristatus</i>	R	LC	LC	C	x	x			
		<i>Odontophorus gujanensis</i>	R	LC	LC			x	x		

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	R	LC	LC		x				
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Int	LC	LC		x	x			
		<i>Patagioenas speciosa</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Patagioenas cayennensis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Patagioenas plumbea</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Patagioenas subvinacea</i>	R	LC	VU		x	x	x		5
		<i>Geotrygon montana</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Leptotila verreauxi</i>	R	LC	LC			x		x	
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	R	LC	LC		x	x	x		6
		<i>Zenaida auriculata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Columbina passerina</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Columbina minuta</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Columbina talpacoti</i>	R	LC	LC		x	x			7
		<i>Columbina squammata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Claravis pretiosa</i>	R	LC	LC		x	x	x		8
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	R-MI	LC	LC		x	x	x		
		<i>Crotophaga ani</i>	R	LC	LC		x	x	x	x	9
		<i>Crotophaga sulcirostris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tapera naevia</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Dromococcyx phasianellus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Neomorphus rufipennis</i>	H	LC	LC					x	
		<i>Coccyzua minuta</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Piaya cayana</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Piaya melanogaster</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Coccyzus melacoryphus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Coccyzus americanus</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Mb	LC	LC				x	x	
Steatornithiformes	Steatornithidae	<i>Steatornis caripensis</i>	R	LC	LC				x	x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al. 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Nyctibiformes	Nyctibidae	<i>Nyctibius grandis</i>	R	LC	LC		x		x		10
		<i>Nyctibius griseus</i>	R	LC	LC		x		x		11
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles nacunda</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Chordeiles pusillus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chordeiles rupestris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Chordeiles acutipennis</i>	R-Mb	LC	LC					x	
		<i>Chordeiles minor</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Lurocalis semitorquatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Nyctipolus nigrescens</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Nyctidromus albigollis</i>	R	LC	LC		x	x	x		12
		<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Hydropsalis climacocerca</i>	R	LC	LC				x	x	
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides cryptus</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Streptoprocne zonaris</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Chaetura spinicaudus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chaetura cinereiventris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chaetura viridipennis</i>	R?	LC	LC					x	
		<i>Chaetura brachyura</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Aeronautes montivagus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tachornis squamata</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Panyptila cayennensis</i>	R	LC	LC					x	
	Trochilidae	<i>Topaza pyra</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Florisuga mellivora</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Glaucis hirsutus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Threnetes leucurus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phaethornis rupurumii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Phaethornis atrimentalis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Phaethornis griseogularis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phaethornis ruber</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Phaethornis augusti</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phaethornis hispidus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Phaethornis bourcierii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Phaethornis longirostris</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al/2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis malaris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Heliothryx auritus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Polytmus guainumbi</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Polytmus theresiae</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Avocettula recurvirostris</i>	V	LC	LC					x	
		<i>Anthracothonax nigricollis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Discosura popelairii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Discosura langsdoerffi</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Lophornis chalybeus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Adelomyia melanogenys</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Heliodoxa schreibersii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Heliodoxa aurescens</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Heliomaster longirostris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Calliphlox amethystina</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	R	LC	LC			x	x	x	
		<i>Campylopterus largipennis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Thalurania furcata</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Amazilia versicolor</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Amazilia fimbriata</i>	R	LC	LC		x	x	x		13
		<i>Amazilia viridigaster</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chrysuronia oenone</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hylocharis sapphirina</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Hylocharis cyanus</i>	R	LC	LC				x	x	
Opisthocomiformes	Opisthocomidae	<i>Opisthocomus hoazin</i>	R	LC	LC	C	x	x	x		14
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	R	LC	LC				x	x	
	Psophiidae	<i>Psophia crepitans</i>	R	LC	LC				x	x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	R	LC	LC			x	x		15
		<i>Anurolimnas viridis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Laterallus exilis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Porzana carolina</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Mustelirallus albicollis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Porphyrio martinica</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Porphyrio flavirostris</i>	Ma?	LC	LC				x	x	
		<i>Fulica americana</i>	R-Mb	LC	LC					x	
	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	R	LC	LC	C	x				
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus cayanus</i>	R	LC	LC			x	x		16
		<i>Vanellus chilensis</i>	R	LC	LC		x	x	x		17
		<i>Charadrius collaris</i>	R	LC	LC				x	x	
	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	R	LC	LC					x	
	Burhinidae	<i>Burhinus bistriatus</i>	R	LC	LC		x		x		
	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Calidris minutilla</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Calidris melanotos</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Gallinago paraguaiiae</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Actitis macularius</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Tringa solitaria</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Tringa melanoleuca</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Tringa flavipes</i>	Mb	LC	LC					x	
	Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	R	LC	LC				x	x	18

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Charadriiformes	Laridae	<i>Sternula superciliaris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phaetusa simplex</i>	R	LC	LC				x	x	19
	Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	R	LC	LC				x	x	20
Eurypygiformes	Eurypygidae	<i>Eurypyga helias</i>	R	LC	LC		x		x		21
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Jabiru mycteria</i>	R	LC	LC					x	22
		<i>Mycteria americana</i>	R	LC	LC				x	x	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	R	LC	LC			x	x		
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	R	LC	LC			x	x		23
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	R	LC	LC				x	x	24
		<i>Agamia agami</i>	R	LC	VU				x	x	
		<i>Cochlearius cochlearius</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Zebrilus undulatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Botaurus pinnatus</i>	R?	LC	LC					x	
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Nyctanassa violacea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Butorides virescens</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Butorides striata</i>	R	LC	LC		x	x	x		25
		<i>Bubulcus ibis</i>	R	LC	LC		x		x		26
		<i>Ardea herodias</i>	Mb	LC	LC				x	x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	R	LC	LC		x	x	x		27
		<i>Ardea alba</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	R	LC	LC		x	x	x		28
		<i>Pilherodius pileatus</i>	R	LC	LC			x	x		29
		<i>Egretta tricolor</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Egretta thula</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Egretta caerulea</i>	R-Mb	LC	LC				x	x	30
	Threskiornithidae	<i>Eudocimus albus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Eudocimus ruber</i>	R	LC	LC				x	x	31
		<i>Plegadis falcinellus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Phimosus infuscatus</i>	R	LC	LC			x	x		32
		<i>Theristicus caudatus</i>	R	LC	LC	C	x				33
		<i>Platalea ajaja</i>	R	LC	LC				x	x	34
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	R-Mb	LC	LC		x	x	x		
		<i>Cathartes burrovianus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cathartes melambrotus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Coragyps atratus</i>	R	LC	LC		x	x	x		35
		<i>Sarcoramphus papa</i>	R	LC	LC				x	x	
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Mb	LC	LC				x	x	36
	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Gampsonyx swainsonii</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Chondrohierax uncinatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Leptodon cayanensis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Elanoides forficatus</i>	R-Mb	LC	LC			x	x		
		<i>Morphnus guianensis</i>	R	NT	NT				x	x	
		<i>Harpia harpyja</i>	R	NT	NT					x	
		<i>Spizaetus tyrannus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Spizaetus melanoleucus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Spizaetus ornatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Busarellus nigricollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Helicolestes hamatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Harpagus bidentatus</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Circus buffoni</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Accipiter poliogaster</i>	Ma?	LC	LC					x	
		<i>Accipiter superciliosus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Accipiter bicolor</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Geranoospiza caeruleascens</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Buteogallus schistaceus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Buteogallus meridionalis</i>	R	LC	LC	C	x		x		37
		<i>Buteogallus urubitinga</i>	R	LC	LC				x	x	38
		<i>Rupornis magnirostris</i>	R	LC	LC	C	x	x	x		
		<i>Parabuteo unicinctus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	R	LC	LC	C	x	x			39
		<i>Pseudastur albicollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Leucopternis melanops</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Buteo nitidus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Buteo platypterus</i>	Mb	LC	LC	C	x				
		<i>Buteo brachyurus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Buteo albonotatus</i>	R	LC	LC				x	x	
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	R	LC	LC					x	
	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	R	LC	LC		x	x	x		40
		<i>Megascops watsonii</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Pulsatrix perspicillata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Ciccaba virgata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Glaucidium brasilianum</i>	R	LC	LC				x	x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Trogon melanurus</i>	R	LC	LC		x	x	x		41
		<i>Trogon viridis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Trogon ramonianus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Trogon curucui</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Trogon rufus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Trogon collaris</i>	R	LC	LC					x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Chloroceryle amazona</i>	R	LC	LC		x		x		42
		<i>Chloroceryle americana</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Chloroceryle inda</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Chloroceryle aenea</i>	R	LC	LC		x		x		43
	Motacitidae	<i>Baryphthengus martii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Momotus momota</i>	R	LC	LC			x	x		
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbalcyrrhynchus leucotis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Brachygalba lugubris</i>	R	LC	LC		x	x	x		44
		<i>Galbula albirostris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Galbula ruficauda</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Galbula galbula</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Galbula tombacea</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Galbula leucogastra</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Galbula dea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Jacamerops aureus</i>	R	LC	LC				x	x	
	Bucconidae	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Notharchus ordii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Notharchus tectus</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Bucco macrodactylus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Bucco tamatia</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Bucco capensis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Malacoptila fusca</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Micromonacha lanceolata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Nonnula rubecula</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Nonnula brunnea</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Monasa nigrifrons</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Monasa morphoeus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Monasa flavirostris</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	R	LC	LC		x	x	x		45
Piciformes	Capitonidae	<i>Capito aurovirens</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Capito auratus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Eubucco richardsoni</i>	R	LC	LC			x	x		

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al/2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos tucanus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Ramphastos vitellinus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Selenidera reinwardtii</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Selenidera nattereri</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pteroglossus inscriptus</i>	R	LC	LC	M	x		x		
		<i>Pteroglossus castanotis</i>	R	LC	LC	M	x		x		
		<i>Pteroglossus pluricinctus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Pteroglossus azara</i>	R	LC	LC				x	x	
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus pumilus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Picumnus lafresnayi</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Picumnus exilis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Picumnus squamulatus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Picumnus rufiventris</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Melanerpes cruentatus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Melanerpes rubricapillus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Picoides fumigatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Veniliornis kirkii</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Veniliornis passerinus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Veniliornis affinis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Piculus flavigula</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Piculus chrysocloros</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Colaptes punctigula</i>	R	LC	LC		x	x	x		46
		<i>Celeus grammicus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Celeus elegans</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Celeus flavus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Celeus torquatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dryocopus lineatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Campephilus pollens</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Campephilus rubricollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Campephilus melanoleucos</i>	R	LC	LC		x	x	x		
Falconiformes	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Micrastur ruficollis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Micrastur gilvicollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Micrastur semitorquatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Caracara cheriway</i>	R	LC	LC					x	47

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Falconiformes	Falconidae	<i>Ibycter americanus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Daptrius ater</i>	R	LC	LC		x	x	x		48
		<i>Milvago chimachima</i>	R	LC	LC		x	x	x		49
		<i>Falco sparverius</i>	R-Mb?	LC	LC					x	
		<i>Falco rufigularis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Falco deiroleucus</i>	R	DD	NT				x		
		<i>Falco femoralis</i>	R	LC	LC					x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Touit huetii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Touit purpuratus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Brotogeris sanctithomae</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Brotogeris versicolurus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Brotogeris cyanoptera</i>	R	LC	LC	M	x	x	x		
		<i>Pyrilia barrabandi</i>	R	LC	NT	M	x		x		
		<i>Pionus menstruus</i>	R	LC	LC	M	x	x	x		
		<i>Amazona festiva</i>	R	LC	NT					x	
		<i>Amazona ochrocephala</i>	R	LC	LC	M	x	x	x		50
		<i>Amazona farinosa</i>	R	LC	NT			x	x		
		<i>Amazona amazonica</i>	R	LC	LC	M	x				51
		<i>Forpus passerinus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Forpus xanthopterygius</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Forpus conspicillatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Forpus modestus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pionites melanocephalus</i>	R	LC	LC	M	x		x		52
		<i>Deroptyus accipitrinus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pyrrhura melanura</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Eupsittula pertinax</i>	R	LC	LC	M	x	x			53
		<i>Aratinga weddellii</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Orthopsittaca manilatus</i>	R	LC	LC	M	x	x	x		54
		<i>Ara ararauna</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Ara macao</i>	R	LC	LC	M	x		x		55
		<i>Ara chloropterus</i>	R	LC	LC					x	56
		<i>Ara severus</i>	R	LC	LC	M	x	x	x		57
		<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Psittacara wagleri</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Psittacara leucophthalmus</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al/2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Euchrepomis spodioptila</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cymbilaimus lineatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Frederickena fulva</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Taraba major</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Sakesphorus canadensis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Thamnophilus doliatus</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Thamnophilus multistriatus</i>	R	LC	LC				x		
		<i>Thamnophilus tenuepunctatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Thamnophilus schistaceus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Thamnophilus murinus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Thamnophilus punctatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Thamnophilus aethiops</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Thamnophilus amazonicus</i>	R	LC	LC		x	x	x		58
		<i>Megastictus margaritatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Neotantes niger</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Dysithamnus mentalis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Thamnomanes caesius</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Isleria hauxwelli</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Pygiptila stellaris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Epinecrophylla haematonota</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Epinecrophylla ornata</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Epinecrophylla erythrura</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myrmotherula brachyura</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myrmotherula ignota</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmotherula ambigua</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmotherula surinamensis</i>	H	LC	LC				x	x	
		<i>Myrmotherula multostriata</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Myrmotherula cherriei</i>	R	LC	LC		x		x		59
		<i>Myrmotherula axillaris</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Myrmotherula schisticolor</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myrmotherula sunensis</i>	R	LC	VU				x		
		<i>Myrmotherula longipennis</i>	R	LC	LC				x	x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada <i>et al.</i> 2017)	Losada-Guayábero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena <i>et al.</i> 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Dichrozona cincta</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Herpsilochmus dugandi</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Microrhopias quixensis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Formicivora grisea</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Drymophila devillei</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hypocnemis flavescens</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Hypocnemis peruviana</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cercomacroides tyrannina</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Cercomacroides serva</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Cercomacroides nigrescens</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cercomacra cinerascens</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Cercomacra nigricans</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myrmoborus leucophrys</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Myrmoborus myotherinus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sclateria naevia</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Percnostola rufifrons</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmelastes schistaceus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmelastes hyperythrus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmelastes leucostigma</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Akletos melanocephalus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Hafferia fortis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Aprositornis disjuncta</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myrmophylax atrothorax</i>	R	LC	LC		x	x	x		60
		<i>Ammonastes pelzelni</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pithys albifrons</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Gymnophithys leucaspis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Rhegmatorhina cristata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Rhegmatorhina melanosticta</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hylophylax naevius</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Hylophylax punctulatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Willisornis poecilinotus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Phlegopsis erythroptera</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga aurita</i>	R	LC	LC					x	
	Grallariidae	<i>Myrmothera campanisona</i>	R	LC	LC			x	x		
	Formicariidae	<i>Formicarius colma</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Formicarius analis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Chamaeza nobilis</i>	R	LC	LC				x	x	
	Furnariidae	<i>Sclerurus mexicanus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sclerurus rufifigularis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sclerurus caudacutus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sittasomus griseicapillus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Deconychura longicauda</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Dendrocincla merula</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	R	LC	LC		x	x	x		61
		<i>Dendrexetastes rufigula</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Nasica longirostris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dendrocolaptes certhia</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hylexetastes stresemanni</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Xiphorhynchus elegans</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Dendroplex picus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Campylorhamphus procurvovides</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Lepidocolaptes duidae</i>	H	LC	LC					x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada <i>et al</i> 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena <i>et al</i> 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Furnariidae	<i>Xenops tenuirostris</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Xenops minutus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Berlepschia rikeri</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Microxenops milleri</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Philydor erythropterus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Philydor pyrrhodes</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Ancistrops strigilatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Clibanornis rubiginosus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Automolus rufipileatus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Automolus ochrolaemus</i>	R	LC	LC			x	x	x	
		<i>Automolus subulatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Automolus infuscatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Thripophaga cherriei</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cranioleuca vulpina</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cranioleuca gutturata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Synallaxis gujanensis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Synallaxis moesta</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Synallaxis albigularis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Synallaxis albens</i>	R	LC	LC		x	x			62
		<i>Synallaxis rutilans</i>	R	LC	LC				x	x	
	Tyrannidae	<i>Tyrannulus elatus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Myiopagis gaimardii</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Myiopagis caniceps</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myiopagis flavivertex</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Elaenia flavogaster</i>	R	LC	LC		x				63
		<i>Elaenia albiceps</i>	R-Ma	LC	LC					x	
		<i>Elaenia parvirostris</i>	Ma	LC	LC			x	x		
		<i>Elaenia gigas</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Elaenia cristata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Elaenia chiriquensis</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Elaenia ruficeps</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Ornithion inermis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Phaeomyias murina</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Capsiempis flaveola</i>	R	LC	LC		x		x		

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Corythopsis torquatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Zimmerius gracilipes</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Mionectes oleagineus</i>	R	LC	LC		x	x	x		64
		<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Leptopogon superciliosus</i>	R	LC	LC				x		
		<i>Sublegatus obscurior</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sublegatus modestus</i>	Ma	LC	LC					x	
		<i>Inezia subflava</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myiornis ecaudatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Lophotriccus pileatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Lophotriccus vitiensis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Lophotriccus galeatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Atalotriccus pilaris</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Hemitriccus zosterops</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Hemitriccus striaticollis</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Poecilotriccus latirostris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Poecilotriccus sylvia</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Todirostrum maculatum</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Todirostrum cinereum</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Tolmomyias sulphureus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tolmomyias traylori</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Tolmomyias assimilis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Tolmomyias flaviventris</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Neopipo cinnamomea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Platyrinchus saturatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Platyrinchus coronatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Onychorhynchus coronatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myiobius barbatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Terentotriccus erythrurus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hirundinea ferruginea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Lathrotriccus eulerti</i>	Ma-R?	LC	LC					x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Empidonax alnorum</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Contopus cooperi</i>	Mb	NT	NT					x	
		<i>Contopus virens</i>	Mb	LC	LC		x				65
		<i>Sayornis nigricans</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Pyrocephalus rubinus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Knipolegus poecilocercus</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Ochthornis littoralis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Fluvicola pica</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Arundinicola leucocephala</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Colonia colonus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Machetornis rixosa</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Legatus leucophaeus</i>	R	LC	LC		x	x	x		66
		<i>Myiozetetes cayanensis</i>	R	LC	LC		x	x	x		67
		<i>Myiozetetes similis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Myiozetetes granadensis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Myiozetetes luteiventris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	R	LC	LC		x	x	x		68
		<i>Pitangus lictor</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Conopias parvus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	R	LC	LC				x		
		<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	R-Ma	LC	LC			x	x		
		<i>Megarynchus pitangua</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Empidonomus varius</i>	Ma	LC	LC			x	x		
		<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Ma	LC	LC					x	
		<i>Tyrannus albogularis</i>	H	LC	LC					x	
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	R-Ma	LC	LC		x	x	x		69
		<i>Tyrannus savana</i>	R-Mb-Ma	LC	LC			x	x		
		<i>Tyrannus tyrannus</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Rhytipterna simplex</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Rhytipterna immunda</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sirystes albocinereus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Myiarchus tuberculifer</i>	R	LC	LC		x	x			70
		<i>Myiarchus swainsoni</i>	Ma	LC	LC					x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al/2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Myiarchus tyrannulus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Attila cinnamomeus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Attila citriniventris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Attila spadiceus</i>	R	LC	LC				x	x	
	Cotingidae	<i>Phoenicircus nigricollis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Rupicola rupicola</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Querula purpurata</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Cephalopterus ornatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Perissocephalus tricolor</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cotinga maynana</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Cotinga cotinga</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cotinga cayana</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Lipaugus vociferans</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Xipholena punicea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Gymnoderus foetidus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
	Pipridae	<i>Tyranneutes stolzmanni</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Neopelma chrysocephalum</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Xenopipo atronitens</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cryptopipo holochlora</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Lepidothrix coronata</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Heterocercus flavivertex</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Manacus manacus</i>	R	LC	LC		x	x	x		71
		<i>Pipra filicauda</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Machaeropterus regulus</i>	R	LC	LC		x		x		72
		<i>Dixiphia pipra</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	R	LC	LC			x	x		
	Tityridae	<i>Tityra inquisitor</i>	R	LC	LC				x		
		<i>Tityra cayana</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Tityra semifasciata</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Schiffornis major</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Schiffornis turdina</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Laniocera hypopyrra</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Iodopleura isabellae</i>	R	LC	LC				x	x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus rufus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pachyramphus castaneus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Pachyramphus polychopterus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Pachyramphus marginatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Pachyramphus minor</i>	R	LC	LC				x	x	
	Incertae Sedis	<i>Piprites chloris</i>	R	LC	LC			x			
	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Hylophilus flavipes</i>	R	LC	LC		x				
		<i>Hylophilus semicinereus</i>	H	LC	LC					x	
		<i>Hylophilus brunneiceps</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Hylophilus thoracicus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Vireo olivaceus</i>	R-Mb-Ma	LC	LC		x	x	x		74
		<i>Vireo flavoviridis</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Vireo altiloquus</i>	Mb	LC	LC					x	
	Corvidae	<i>Cyanocorax violaceus</i>	R	LC	LC		x	x	x		75
		<i>Cyanocorax heilprini</i>	R	LC	LC					x	
	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	R-Ma	LC	LC					x	
		<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Atticora fasciata</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Atticora tibialis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Progne tapera</i>	R-Ma	LC	LC			x	x		
		<i>Progne chalybea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tachycineta albiventer</i>	R	LC	LC		x	x	x		76
		<i>Riparia riparia</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Hirundo rustica</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Mb	LC	LC					x	
	Troglodytidae	<i>Microcerculus marginatus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Troglodytes aedon</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Campylorhynchus griseus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Campylorhynchus turdinus</i>	R	LC	LC			x	x		

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al/2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Pheugopedius coraya</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Cantorchilus leucotis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Henicorhina leucosticta</i>	R	LC	LC		x	x	x		77
		<i>Cyphorhinus arada</i>	R	LC	LC					x	
	Polioptilidae	<i>Microbates collaris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Ramphocaenus melanurus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Polioptila plumbea</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Polioptila guianensis</i>	H	LC	LC					x	
	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	R	LC	LC				x	x	
	Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Catharus minimus</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Catharus ustulatus</i>	Mb	LC	LC		x		x		78
		<i>Turdus leucomelas</i>	R	LC	LC		x	x			79
		<i>Turdus fumigatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Turdus hauzwelli</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Turdus nudigenis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Turdus lawrencii</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Turdus ignobilis</i>	R	LC	LC		x	x	x		80
		<i>Turdus albicollis</i>	R	LC	LC				x	x	
	Mimidae	<i>Mimus gilvus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
	Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	R	LC	LC					x	
	Thraupidae	<i>Chlorophanes spiza</i>	R	LC	LC				x		
		<i>Hemithraupis guira</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Hemithraupis flavicollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sicalis columbiana</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sicalis flaveola</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Sicalis luteola</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Volatinia jacarina</i>	R	LC	LC		x	x	x		81
		<i>Tachyphonus cristatus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tachyphonus surinamus</i>	R	LC	LC		x		x		

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	R	LC	LC		x		x		82
		<i>Tachyphonus rufus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Tachyphonus phoenicius</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Eucometis penicillata</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Ramphocelus carbo</i>	R	LC	LC		x	x	x		83
		<i>Lanio fulvus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cyanerpes nitidus</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Cyanerpes caeruleus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Cyanerpes cyaneus</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Tersina viridis</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Dacnis albiventris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Dacnis lineata</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Dacnis flaviventer</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Dacnis cayana</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Sporophila bouvronides</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sporophila lineola</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sporophila castaneiventris</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sporophila minuta</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Sporophila angolensis</i>	R	LC	LC		x	x	x		84
		<i>Sporophila crassirostris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sporophila intermedia</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Sporophila murallae</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sporophila fringilloides</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sporophila luctuosa</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sporophila nigricollis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Sporophila schistacea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sporophila plumbea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Saltator maximus</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Saltator coerulescens</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Saltator grossus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Emberizoides herbicola</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Coereba flaveola</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Paroaria nigrogenis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Paroaria gularis</i>	R	LC	LC			x	x		85
		<i>Schistochlamys melanopis</i>	R	LC	LC		x	x			86
		<i>Cissopis leverianus</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cayana</i>	R	LC	LC		x	x			
		<i>Tangara nigrocincta</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Tangara mexicana</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Tangara chilensis</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Tangara velia</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Tangara callophrys</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Tangara gyrola</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Tangara xanthocephala</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Tangara schrankii</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Thraupis episcopus</i>	R	LC	LC		x	x	x		87
		<i>Thraupis palmarum</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Ixothraupis xanthogastra</i>	R	LC	LC					x	
	Emberizidae	<i>Chlorospingus flavigularis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Ammodramus humeralis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Ammodramus aurifrons</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Arremonops conirostris</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Arremon taciturnus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Zonotrichia capensis</i>	R	LC	LC		x	x			88
	Cardinalidae	<i>Piranga rubra</i>	Mb	LC	LC		x		x		89
		<i>Piranga olivacea</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Habia rubica</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Granatellus pelzelni</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Caryothraustes canadensis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Cyanoloxia cyanoides</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Spiza americana</i>	Mb	LC	LC					x	
	Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Mb	LC	LC		x		x		
		<i>Protonotaria citrea</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Leiothlypis peregrina</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Oporornis agilis</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Geothlypis philadelphia</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Setophaga ruticilla</i>	Mb	LC	LC		x		x		
		<i>Setophaga castanea</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Setophaga fusca</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Setophaga petechia</i>	Mb	LC	LC					x	

Capítulo 7. AVES

Anexo 1. Continuación

Órdenes	Familias	Especies	Estatus	Categoría de amenaza	Categoría UICN	Uso	Caño Cristales (Losada et al. 2017)	Losada-Guayabero (Cuervo 2018)	Dagua (Cadena et al. 2000)	GBIF (2018)	Foto en el anexo 3
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	Mb	LC	LC				x	x	
		<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Cardellina canadensis</i>	Mb	LC	LC				x	x	
	Icteridae	<i>Psarocolius angustifrons</i>	R	LC	LC		x	x	x		90
		<i>Psarocolius viridis</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Psarocolius decumanus</i>	R	LC	LC		x	x	x		91
		<i>Psarocolius bifasciatus</i>	R	LC	LC		x		x		92
		<i>Cacicus solitarius</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Cacicus cela</i>	R	LC	LC		x	x	x		
		<i>Cacicus haemorrhous</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Icterus croconotus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Icterus cayanensis</i>	R	LC	LC		x		x	x	93
		<i>Icterus nigrogularis</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Gymnomystax mexicanus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Lamprosar tanagrinus</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Chrysomus icterocephalus</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Molothrus oryzivorus</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Molothrus bonariensis</i>	R	LC	LC		x		x		
		<i>Quiscalus lugubris</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Mb	LC	LC					x	
		<i>Sturnella magna</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Sturnella militaris</i>	R	LC	LC		x	x			94
	Fringillidae	<i>Euphonia plumbea</i>	R	LC	LC					x	
		<i>Euphonia chlorotica</i>	R	LC	LC			x			
		<i>Euphonia lanirostris</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Euphonia chrysopasta</i>	R	LC	LC			x	x		
		<i>Euphonia minuta</i>	R	LC	LC				x	x	
		<i>Euphonia xanthogaster</i>	R	LC	LC		x				95
		<i>Euphonia rufiventris</i>	R	LC	LC				x	x	

Anexo 2. Listados de aves (81) reportados en eBird-Colombia, correspondientes a los 81 recorridos de observación.
Fuente: Cuervo *et al.* (2018).

<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928235>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928354>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928370>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928381>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928397>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928408>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928416>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928420>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928438>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928445>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928456>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928461>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928468>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928476>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928496>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928516>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928522>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928529>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928534>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928542>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928550>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928559>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928568>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928574>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928581>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928592>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928602>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928608>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928626>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928641>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928652>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928668>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928679>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928693>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928706>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928719>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928732>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928740>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928750>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928757>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928765>

<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928775>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928783>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928788>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928794>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928805>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928813>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928817>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46929042>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962039>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962060>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962068>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962086>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962122>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962142>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962157>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962177>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022939>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022961>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022993>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023002>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023154>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023195>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023294>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023707>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023723>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47024322>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47025676>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026044>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026056>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026143>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026670>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026686>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026699>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026713>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47027343>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028537>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028546>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028557>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028584>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47029868>
<https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47032155>

Anexo 3. Catálogo fotográfico de algunas especies de aves del AMEM.

1. *Anhima cornuta*.

2. *Oressochen jubatus*.

3. *Pipile cumanensis*.

4. *Mitu tomentosum*.

5. *Patagioenas subvinacea*.

6. *Leptotila rufaxilla*.

Lamina 1. Fotos: 1, 3. Jorge E. García-Melo; 2, 4. Federico Mosquera-Guerra; 5. Elkin A. Tenorio; 6. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH).

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

7. *Columbina talpacoti*.

8. *Claravis pretiosa*.

9. *Crotophaga ani*.

10. *Nyctibius grandis*.

11. *Nyctibius griseus*.

12. *Nyctidromus albigollis*.

Lamina 2. Fotos: 7, 8, 12. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 9, 10, 11. Elkin A. Tenorio.

Anexo 3. Continuación.

13. *Amazilia fimbriata*.

14. *Opisthocomus hoatzin*.

15. *Aramides cajaneus*.

16. *Vanellus cayanus*.

17. *Vanellus chilensis*.

18. *Jacana jacana*.

Lamina 3. Fotos: 13. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 14. Sergio Losada-Prado; 15, 16, 18. Monica A. Morales-Betancourt; 17. Fernando Trujillo.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

19. *Phaetusa simplex*.

20. *Rynchops niger*.

21. *Eurypyga helias*.

22. *Jabiru mycteria*.

23. *Anhinga anhinga*.

24. *Tigrisoma lineatum*.

Lamina 4. Fotos: 19, 23. Jorge E. García-Melo; 20, 22. Federico Mosquera-Guerra; 21. Tatiana Hernández (BIA-IAvH); 24. Monica A. Morales-Betancourt.

Anexo 3. Continuación.

25. *Butorides striata*.

26. *Bubulcus ibis*.

27. *Ardea cocoi*.

28. *Syrigma sibilatrix*.

29. *Pilherodius pileatus*.

30. *Egretta caerulea*.

Lamina 5. Fotos: 25, 26. Elkin A. Tenorio; 27, 30. Monica A. Morales-Betancourt; 28. Jorge E. García-Melo; 29. Federico Mosquera-Guerra.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

31. *Eudocimus ruber*.

32. *Phimosus infuscatus*.

33. *Theristicus caudatus*.

34. *Platalea ajaja*.

35. *Coragyps atratus*.

36. *Pandion haliaetus*.

Lamina 6. Fotos: 31, 32, 35. Jorge E. García-Melo; 33, 36. Federico Mosquera-Guerra; 34. Sergio Losada-Prado

Anexo 3. Continuación.

37. *Buteogallus meridionalis*.

38. *Buteogallus urubitinga*.

39. *Geranoaetus albicaudatus*.

40. *Megascops choliba*.

41. *Trogon melanurus*.

42. *Chloroceryle amazona*.

Lamina 7. Fotos: 37. Fernando Trujillo; 38. Monica A. Morales-Betancourt; 39. Sebastián Krieger (BIA-IAvH); 40, 41. Sergio Losada-Prado; 42. Federico Mosquera-Guerra.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

43. *Chloroceryle aenea*.

44. *Brachygalba lugubris*.

45. *Chelidoptera tenebrosa*.

46. *Colaptes punctigula*.

47. *Caracara cheriway*.

48. *Daptrius ater*.

Lamina 8. Fotos: 43, 46. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 44, 45. Elkin A. Tenorio; 47. Monica A. Morales-Betancourt; 48. Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

49. *Milvago chimachima*.

50. *Amazona ochrocephala*.

51. *Amazona amazonica*.

52. *Pionites melanocephalus*.

53. *Eupsittula pertinax*.

54. *Orthopsittaca manilatus*.

Lamina 9. Fotos: 49. Monica A. Morales-Betancourt; 50. José Mauricio Salcedo (BIA-IAvH); 51, 53. Sergio Losada-Prado; 52, 54. Elkin A. Tenorio.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

55. *Ara macao*.

56. *Ara chloropterus*.

57. *Ara severus*.

58. *Thamnophilus amazonicus*.

59. *Myrmotherula cherriei*.

60. *Myrmophylax atrothorax*.

Lamina 10. Fotos: 55, 57. Jorge E. García-Melo; 56. Monica A. Morales-Betancourt 58. Sergio Losada-Prado, 59. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 60. Elkin A. Tenorio.

Anexo 3. Continuación.

61. *Glyphorhynchus spirurus*.

62. *Synallaxis albescentis*.

63. *Elaenia flavogaster*.

64. *Mionectes oleagineus*.

65. *Contopus virens*.

66. *Legatus leucophaius*.

Lamina 11. Fotos: 61, 62, 65. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 63. José Mauricio Salcedo (BIA-IAvH); 64. Sergio Losada-Prado; 66. Elkin A. Tenorio.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

67. *Myiozetetes cayanensis*.

68. *Pitangus sulphuratus*.

69. *Tyrannus melancholicus*.

70. *Myiarchus tuberculifer*.

71. *Manacus manacus*.

72. *Machaeropterus regulus*.

Lamina 12. Fotos: 67, 68, 69, 72. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 70. Mayra Villanueva (BIA-IAvH); 71. Sergio Losada-Prado.

Anexo 3. Continuación.

73. *Psarocolius angustifrons*.

74. *Vireo olivaceus*.

75. *Cyanocorax violaceus*.

76. *Tachycineta albiventer*.

77. *Henicorhina leucosticta*.

78. *Catharus ustulatus*.

Lamina 13. Fotos: 73, 74, 77. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 75, 76. Jorge E. García-Melo; 78. Elkin A. Tenorio.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

79. *Turdus leucomelas*.

80. *Turdus ignobilis*.

81. *Volatinia jacarina*.

82. *Tachyphonus luctuosus*.

83. *Ramphocelus carbo*.

84. *Sporophila angolensis*.

Lamina 14. Fotos: 79, 81, 82, 83, 84. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 80. Jorge E. García-Melo.

Anexo 3. Continuación.

85. *Paroaria gularis*.

86. *Schistochlamys melanopis*.

87. *Thraupis episcopus*.

88. *Zonotrichia capensis*.

89. *Piranga rubra*.

90. *Psarocolius angustifrons*.

Lamina 15. Fotos: 85. Monica A. Morales-Betancourt; 86, 89. Francisco Nieto Montaña (BIA-IAvH); 87. Elkin A. Tenorio; 88. Sergio Losada-Prado; 90. Jorge E. García-Melo.

Capítulo 7. AVES

Anexo 3. Continuación.

91. *Psarocolius decumanus*.

92. *Psarocolius bifasciatus*.

93. *Icterus cayanensis*.

94. *Sturnella militaris*.

95. *Euphonia xanthogaster*.

Lamina 16. Fotos: 91, 92. Sergio Losada-Prado; 93. Elkin A. Tenorio; 94. Monica A. Morales-Betancourt; 95. Francisco Nieto Montañó (BIA-IAvH).

Eudocimus ruber. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Macarenia clavigera. Foto: Ivan Mikolji.

Algas epifitas asociadas a *Macarenia clavigera* P. Royen, en Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Sara G. Rodríguez Álvarez, Jhon Ch. Donato-Rondón y María I. Castro-Rebolledo

Resumen. Se describe la composición y la distribución de algas del epifiton sobre *Macarenia clavigera* en Caño Cristales, Meta, Colombia. Este sistema fluvial oligotrófico y con aguas desmineralizadas, drena la sierra de La Macarena, conocida por su formación geológica antigua y sus paisajes de alta biodiversidad, así como por la convergencia de elementos andinos, orinoquenses y amazónicos. Se encontraron 20 especies asociadas a *M. clavigera*, distribuidas en 13 géneros. *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Cosmarium* y *Staurastrum* fueron los más abundantes entre las desmidiadas, mientras que *Brachysira*, *Eunotia* y *Frustulia*, entre las diatomeas. Estos géneros generalmente representan ambientes oligotróficos y son indicadores ecológicos y de calidad del agua. Se destaca la importancia de *M. clavigera* y las algas epifitas para programas de conservación y manejo de Caño Cristales.

Palabras clave. Caños. Desmidiadas. Diatomeas. Plantas acuáticas. Podostemaceae.

Abstract. The composition and distribution of algae in the epiphyton on *Macarenia clavigera* in Caño Cristales, Meta are described. This oligotrophic fluvial system with demineralized waters drains the Macarena mountain range, known for its ancient geological formation and its high biodiversity landscapes, as well as for the convergence of the biotic elements of the Andes, savannas of the Orinoco and the rainforest of the Amazonian system. Found 20 species associate distributed in 13 genera; *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Cosmarium* and *Staurastrum* were the most abundant among the desmidiadas, while *Brachysira*, *Eunotia* and *Frustulia* stood out among the diatoms. These genera generally represent oligotrophic environments and are ecological and water quality indicators. The importance of *Macarenia clavigera* and epiphytic algae for the conservation and management programs of Caño Cristales.

Keywords. Aquatic plants. Creek. Desmids. Diatoms. Podostemaceae.

Rodríguez, S. G., J. C. Donato-Rondón y M. I. Castro-Rebolledo. 2018. Algas epifitas asociadas a *Macarenia clavigera* P. Royen, en Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 263-271. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

INTRODUCCIÓN

Las plantas acuáticas suministran un sustrato adecuado para el crecimiento de algas y otros microorganismos. Son pocos los estudios que abordan el conocimiento y las relaciones ecológicas de esas comunidades, y en especial en los ecosistemas acuáticos del Neotrópico.

Los lechos de *Macarenia clavigera* (Podostemaceae), son particularmente conspicuos en los rápidos de los cursos de quebradas, caños y arroyos oligotróficos y desmineralizados que drenan especialmente macizos y rocas precámbricas del Escudo Guayanés colombiano en la sierra de La Macarena (Lasso y Morales-Betancourt 2017). Esta macrófita desarrolla microambientes más estables que contrarrestan la velocidad del agua, la desecación y la limitación de nutrientes del agua. Estos lechos son el componente substancial en la producción primaria. Además, contrarrestan el movimiento del agua, retienen materia orgánica e incrementan la complejidad del hábitat al permitir una diversidad y coexistencia de especies, suministrando un espacio disponible para la colonización y establecimiento de especies de algas, macroinvertebrados acuáticos (Granados-Martínez y Batista 2017), peces (Mesa-S. *et al.* 2017) y biofilm.

Son varias las hipótesis que explican el crecimiento de las comunidades epifitas y el papel de soporte de las plantas acuáticas en ambientes acuáticos. La hipótesis de sustrato neutral (Blindow 1987), establece que la estructura epifita no es afectada por la planta acuática hospedera. Sin embargo, Carignan y Kalff (1982) y Eminson y Moss (1980), destacaron que la transferencia de nutrientes, aunque sí bien es de menor magnitud, influyen en la estructura de los ensambles de algas epifitas (Blanco *et al.* 2014). En esencia, las Diatomeas y Desmidiáles del epifiton son utilizadas como indicadores biológicos, incluso independiente de la planta acuática (Cejudo-F. *et al.* 2010) y reflejan las características ecológicas de los cuerpos de agua. Además, los ensambles de

algas epifitas que crecen sobre la arquitectura y sustratos de las plantas acuáticas, contribuyen con la productividad primaria, particularmente en sistemas oligotróficos (Frankovich *et al.* 2006).

La sierra de La Macarena es la continuación de una cadena de mesetas que vienen en serie desde las Guayanas y su formación es una de las más antiguas de Suramérica, cuyo basamento paleo-cristalino sobrepasa los 1.500 millones de años. Es el punto de convergencia de las sabanas del sistema del Orinoco y de la selva del sistema amazónico (Bejarano 1951). En esta se encuentra, Caño Cristales, un sistema fluvial que corre sobre un paisaje de una matriz montañosa con un tipo de relieve de crestas. Tiene una datación geológica aproximada del Eoceno-Oligoceno y consiste principalmente de areniscas de grano muy fino. Caño Cristales fluye al río Guayabero, el cual es un tributario del río Guaviare (cuenca del Orinoco) (Morales -Betancourt *et al.* 2017).

Con el propósito de estudiar los ensambles de algas epifitas que crecen sobre *Macarenia clavigera*, se describió y caracterizó la estructura de algas epifitas, particularmente desmidiáles y diatomeas, encontradas sobre *M. clavigera* en Caño Cristales, ecosistema fluvial de primer orden ubicado en la sierra de la Macarena, Meta, Colombia.

METODOLOGÍA

Fase de campo

Se establecieron a lo largo del curso del Caño Cristales varios tramos de 50 m de longitud. En cada tramo se midió el pH (H^+), la conductividad ($\mu S/cm$), la temperatura ($^{\circ}C$) y el oxígeno disuelto ($mg/l O_2$).

Con el propósito de obtener muestras de algas del epifiton asociadas a *Macarenia clavigera*, se hicieron estrujamientos de 10 segmentos de partes foliares de las plantas en los tramos Pailones (1), Potreros (2), Piscina El Turista (3) y Caño Escondido (4), todos sobre el curso de Caño Cristales. Todas las muestras fueron fijadas con una solución Transeau (1.1).

Fase de laboratorio

Para estimar la abundancia se realizó el conteo de algas en un microscopio óptico (40x) hasta completar 400 individuos de la especie más abundante.

Para la identificación taxonómica de las diatomeas se utilizaron las claves de Krammer y Lange-Bertalot (1986, 1991), Lange-Bertalot y Genkal (1999), Lange-Bertalot (1993, 2001), Metzeltin y Lange-Bertalot (1998, 2007) y Romrich *et al.* (2000). Para los Zygnemphyceae y otras clases de algas del perifiton se utilizó Bicudo y Menezes (2017), Bicudo y Bicudo (1970) y Parra y Bicudo (1996).

Fase de análisis

Se elaboraron histogramas por estación de las abundancias de los géneros más abundantes. Para cada tramo se estimó la riqueza de especies de Margalef y el índice de diversidad de Simpson, estos análisis se realizaron mediante el programa PAST 3.0. Así mismo, se graficó la curva de acumulación utilizando CHAO 1 por medio del programa Estimates 9.1.

RESULTADOS

Los parámetros medidos en campo variaron ligeramente entre los diferentes tramos estudiados. En términos generales, Caño Cristales es un curso de agua con valores de pH ligeramente ácidos hasta neutros, las aguas son subsaturadas en oxígeno y se encuentran desmineralizadas (Tabla 1).

Según la tendencia observada en la curva de acumulación para el ensamble de algas

epifitas, se evidencia que el esfuerzo de muestro fue óptimo, ya que se representa el 100% de la riqueza de especies (20 especies en 13 géneros, 6 familias y 5 órdenes) y la curva tiende aproximarse a una asíntota (Figura 1).

Las Desmidiáles seguidas de las Eunotiales y en mucho menor proporción las Naviculales y Cymbellales, fueron los órdenes predominantes sobre las frondas de *Macarenia clavifera* (Figura 2).

En total se contabilizaron 4.470 individuos, distribuidos en 13 géneros en las proporciones que se observan en la figura 3. El punto 1 (Pailones) tuvo la abundancia más alta, a diferencia del punto 2 cuya abundancia fue la más baja. Se encontraron entre las Desmidiáles especies de *Cosmarium* (Figura 4a), *Euastrum*, *Actinotaenium*, *Bambusina*, *Staurostrum*, *Staurodesmus* y entre las diatomeas especies de *Eunotia* (Figura 4b), *Brachysira* (Figura 4c), *Gomphonema* y *Frustulia* (Figura 4d).

El primer punto de muestreo representó la mayor abundancia total del estudio, con 1.443 individuos que representan los 32%, distribuidos en 19 especies, 12 géneros, 7 familias y 5 órdenes, siendo este el punto con la mayor abundancia y mayor riqueza. De estos órdenes reportados, al igual que en los otros tres puntos de muestreo, el más abundante fue el de las Desmidiáles. El segundo punto tuvo la menor abundancia con 595 individuos, los cuales representan el 13% de la abundancia, estos organismos se distribuyen en 11 especies, 8 géneros, 2 familias y 2 órdenes siendo este punto el de menor riqueza. En el punto tres se observaron 1.362 individuos que representan el

Tabla 1. Variables físicas y químicas. T: temperatura, pH: potencial de Hidrogeno, Cond: conductividad, OD: oxígeno disuelto.

Sitio de muestreo	T (°C)	pH (H ⁺)	Cond (QS/cm)	OD (mg/l)
Pailones	29,2	6,1	4,3	4,6
Potrero	27,6	5,1	5,3	5,4
Piscina El Turista	28,7	5,7	4,3	4,6
Caño Escondido	25,3	4,8	5,7	4,1

Figura 1. Curva de acumulación de algas colectadas en los cuatro puntos de muestreo.

Figura 2. Abundancia de órdenes en cada punto de muestreo.

Figura 3. Número de individuos por punto de muestreo.

Figura 4. Géneros representativos de las algas del epifiton de *Macarenia clavigera*: a) *Cosmarium* sp., b) *Eunotia* sp., c) *Brachysira* sp. d) *Frustulia* sp. Fotos: Jhon Charles Donato.

30% de la abundancia total, presentando 16 especies distribuidas en 11 géneros, 4 familias y 4 órdenes. El punto cuatro representó el 23% de la abundancia con 170 individuos, 17 especies, 10 géneros, 4 familias y 4 órdenes (Figura 3).

Euastrum sp. 1 fue la especie de mayor abundancia y representa el 36,6% del total de la abundancia del estudio, mientras que *Cosmarium* sp. 8 fue la menos abundante, representando el 0,08% de la abundancia total (Figura 5). En el punto uno se observó el mayor número de especies; sin embargo, la abundancia fue mayor en el punto tres.

En términos generales, aunque si bien se encontraron diferencias en los cuatro tramos, la riqueza de especies de algas epífitas fue relativamente alta (Figura 6), con excepción

del punto dos el cual fue el más bajo. Como se observa en la figura 7, los puntos 1 y 3 presentaron la mayor diversidad mientras los restantes puntos los más bajos.

DISCUSIÓN

Los lechos de *Macarenia clavigera* albergan en gran medida una riqueza relativamente alta de algas epífitas, particularmente Desmidiaceas y Diatomeas. En este sentido, los resultados demuestran que los substratos de *Macarenia* proporcionan hábitats óptimos que contribuyen con el crecimiento de algas y en cierta manera con la productividad primaria de ecosistemas oligotróficos que drenan los macizos precámbricos de la sierra de La Macarena.

Figura 5. Abundancias relativas de los principales géneros y especies (morfotipos) de los ensambles de algas epifitas encontradas sobre *Macarenia clavigera* en Caño Cristales, sierra de la Macarena (Meta, Colombia).

Figura 6. Índice de riqueza de especies de Margalef registradas en el epifiton de *Macarenia clavigera*.

Figura 7. Índice de diversidad de Simpson para las algas del epifiton de *Macarenia clavigera*.

Por otra parte, la predominancia de las Desmidiáles refleja el endemismo y la riqueza de este grupo en América del Sur; lo que para Coesel (1996) tiene que ver con el largo período de aislamiento de este continente desde el Cretácico Medio hasta el Plioceno tardío. Esta hipótesis, soporta el origen tropical de las algas Desmidiáceas y concuerda con las temperaturas óptimas (Coesel y Wardenaar 1990), que se registran en el trópico. En cuanto a las Diatomeas, estas muestran cambios estructurales relacionados con las condiciones ecológicas (Smucker y Vis 2011), suministran una segura predicción del estado trófico y de la química del agua (Blanco *et al.* 2014) e incluso se ha reportado que viven en hábitats muy específicos, como por ejemplo, en las raíces de plantas acuáticas (Buczkó 2007). Para el caso del Caño Cristales, se reportó *Eunotia* y *Frustulia*, las cuales se asocian con ambientes de baja mineralización (Bicca *et al.* 2011). Así mismo, las Desmidiáles (Coesel 1992), junto con las Diatomeas epífitas, son utilizadas como indicadores ecológicos (Soininen 2007, Passy 2008). La especificidad de estas especies podría explicar la riqueza de especies encontradas, aunque se esperaría una diversidad más pronunciada. En ese sentido, estudios realizados en los ríos Guayabero – sistema donde afluye Caño Cristales-, Duda y Losada, han permitido identificar 66 morfoespecies, donde las diatomeas representaron la

mayor riqueza, con un predominio de dos clases, Fragillariophyceae (géneros *Ulnaria* y *Synedra*) y Bacillariophyceae (género *Encyonema*; le siguen las desmidiáles de los géneros *Cosmarium* y *Closterium* (Núñez-Avellaneda y Perdómo, Capítulo 3).

Macarenia clavigera es una planta endémica de la sierra de La Macarena y serranía de La Lindosa (Lasso com. pers.), que estructura los lechos precámbricos drenados por los caños oligotróficos del Escudo Guayanés. Por este motivo, es substancial para la productividad y como sustrato para el crecimiento de otras comunidades epífitas e incluso de macroinvertebrados (Granados-Martínez y Batista 2017) y peces (Mesa S. *et al.* 2017). Así, por estas razones, deben ser consideradas como elemento clave en la conservación de estos ambientes fluviales.

La conservación de Caño Cristales es importante no solo por sus características biológicas y ecológicas, sino porque también es una región de interés cultural, social, ambiental y económico.

En conclusión, este estudio reporta el desarrollo de organismos epífitos, principalmente Desmidiáles y Diatomeas que se adhieren a *Macarenia clavigera* y demuestra el valor funcional y ecológico de estas plantas en este tipo de ambientes. También destaca el papel como especie estructuradora en los microhábitats de Caño Cristales (Lasso y Morales-Betancourt 2017).

BIBLIOGRAFÍA

- Bejarano, J. 1952. La cordillera de La Macarena y la estación «José Jeronimo «La Macarena» Biológica Triana». *Revista de la Facultad de Medicina* 20 (7): 413-420.
- Bicca, A., L. Carvalho y C. Bahi. 2011. Eunotiaceae (Eunotiales, Bacillariophyta) em ambientes lacustres na Planície Costeira do Sul do Brasil. *Revista Brasileira de Botanica* 34 (1): 1-19.
- Bicudo, C. y R. Bicudo. 1970. Algas de aguas continentales brasileiras. FBDE. Sao Paulo, Brazil. 222 pp.
- Bicudo, C. y M. Menezes. 2017. Chave de identificação e descrições-Rhodophyceae Pp. 505-521. *En: Necchi, Jr. O. (Ed.). Gêneros de algas de águas continentais do Brasil*. Editorial RIMA Sao Paulo, Brazil.
- Blanco, S., C. Cejudo-F., I. Alvarez- Blanco, E. van Donk, E. Gross, L. A. Hansson, K. Irvine, E. Jeppesen, T. Kairesalo, B. Moss, T. Nöges y E. Bécares. 2014. Epiphytic Diatoms along environmental Gradients in Western European shallow lakes. *Clean – Soil, air, água* 42 (3): 229-235.
- Blindow, I. V. 1987. The composition and density of epiphyton on several species of submerged macrophytes. The neutral hypothesis tested. *Aquatic Botany* 29: 157- 168.
- Buczkó, K. 2007. The occurrence of the epiphytic diatom *Lemnicola hungarica* on different European Lemnaceae species. *Fottea, Olomouc* 7 (1): 77-84.
- Carignan, R. y J. Kalff. 1982. Phosphorus release by submerged macrophytes: significance to epiphyton and phytoplankton. *Limnology and Oceanography* 27: 419-427.
- Cattaneo, A., G. Galanti, S. Gentinetta y S. Romo. 1998. Epiphytic algae and macroinvertebrates on submerged and floating-leaved macrophytes in an Italian Lake. *Freshwater Biology* 39: 725-740.
- Cejudo-Figueiras, C., I. Álvarez- Blanco, E. Bécares y S. Blanco. 2010. Epiphytic diatoms and water quality in shallow lakes: the neutral substrate hypothesis revisited. *Marine and Freshwater Research* 61: 1457-1467.
- Coesel, P. F. M. 1992. Desmid assemblies along altitude gradients in Colombia. *Nova Hedwigia* 55: 353-366.
- Coesel, P. F. M. 1996. Biogeography of desmids. *Hydrobiologia*. Pp. 41-53. *En: Kristiansen, J. (Ed.). Biogeography of Freshwater Algae*. Editorial Springer, Netherlands.
- Coesel, P. F. M. y K. Wardenaar, 1990. Growth responses of planktonic desmid species in a temperature-light gradient. *Freshwater Biology* 23: 551-560.
- Eminson, D. y B. Moss. 1980. The composition and ecology of periphyton communities in freshwaters. 1. The influence of host type and external environment on community composition. *British Phycological Journal* 15: 429-446.
- Frankovich, T. A., E. E. Gaiser, J. C. Zieman y A. H. Wachnicka. 2006. Spatial and temporal distributions of epiphytic diatoms growing on *Thalassia testudinum* Banks ex König: relationship to water quality. *Hydrobiologia* 569: 259-271.
- Granados-Martínez, C y A. Batista. 2017. Macroinvertebrados acuáticos. Pp. 46-55. *En: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). III. Fauna de Caño Cristales, Sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Krammer, K. y H. Lange-Bertalot. 1986. Bacillariophyceae, 1. Teil: Naviculaceae. VEB. Gustav Fisher Verlag, Jena. 576 pp.
- Krammer, K. y H. Lange-Bertalot. 1991. Subwasserflora von Mitteleuropa. Bacillariophyceae 3, Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Gustav Fischer Verlag Stuttgart. 599 pp.
- Lange-Bertalot, H. 1993. Neue taxa. 1993. *Bibliotheca Diatomologica*. Band 27. 434 pp.
- Lange-Bertalot, H. 2001. Diatoms of Europe. Vol. 2 Ed. E.R.G. Gantner Verlag K.G. Germany. 526 pp.
- Lange -Bertalot, H. y S. Genkal. 1999. ¿Diatoms from Siberia I. A. R. G. Gantner Verlag K. G. 295 pp.

- Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds). 2017. III. Fauna de Caño Cristales, sierra La Macarena, Meta, Colombia. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia. 187 pp.
- Mesa-S., L. M., C. A. Lasso, M. A. Morales-Betancourt y P. Herrera. 2017. Peces. Pp. 66-95. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). *III. Fauna de Caño Cristales, Sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Metzeltin, D. y H. Lange-Bertalot. 1998. Tropische Diatomeen in Sudamerika I. 700 überwiegend Wenig bekannte oder neue Taxa repräsentativ als Elemente der neotropischen Flora. *Iconogr Diatomol* 5:1-695.
- Metzeltin, D. y H. Lange-Bertalot. 2007. Tropical diatoms of South America II. Special remark on biogeographic disjunction. *Iconogr. Diatomol* 18:1-876.
- Morales-Betancourt, M. A., C. A. Lasso, C. Granados-Martínez y L. M. Mesa-S. 2017. Área de estudio. *En*: Lasso, C. A. y M. A. Morales-Betancourt (Eds.). *III. Fauna de Caño Cristales, Sierra La Macarena, Meta, Colombia*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Parra, O. y C. M. Bicudo. 1996. Algas de Aguas Continentales: Introducción a la Biología y Sistemática. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción, Chile 268 pp.
- Passy, S. I. 2008. Continental diatom biodiversity in stream benthos declines as more nutrients become limiting. *Proceeding National Academy Sciences* 105:9663–9667. doi: 10.1073/pnas.0802542105.
- Rumrich, U., H. Lange-Bertalot y H. Rumrich. 2000. Diatomeen der Andes von Venezuela bis Patagonien (Feuerland). *Iconogr Diatomol* 9:1-649.
- Smucker, N. J. y L. Vis Morgan. 2011. Spatial factors contribute to benthic diatom structure in streams across spatial scales: considerations for biomonitoring. *Ecologica Indicators* 11:191–203.
- Soininen J. 2007. Environmental and spatial control of freshwater diatoms—a review. *Diatom Res* 22: 473–490. doi: 10.1080/0269249X.2007.9705724.

Caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*). Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Interacciones entre crocodilianos y humanos en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Rafael A. Moreno-Arias, Nidia Farfán-Ardila y María C. Ardila-Robayo*

Resumen. Actualmente las interacciones negativas entre los humanos y la vida silvestre se están incrementando, por lo que entenderlas es fundamental para la coexistencia futura entre el ser humano con la vida silvestre. Se describen las interacciones con los crocodilianos en la región de La Macarena, donde las actividades humanas se han incrementado en los últimos años y se encontró que aún persiste un hábitat en buen estado de conservación donde se pueden encontrar hasta tres especies de crocodilianos, no obstante, sus abundancias varían de acuerdo con la intensidad de las actividades antrópicas. Particularmente, el caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*) y cachirre (*Palesosuchus palpebrosus*) son más abundantes cuando hay una mayor cobertura de bosque ribereño y menor número de pescadores. Aunque no se detectaron interacciones negativas entre crocodilianos y humanos, si se identificaron ciertas actividades que aumentarían la vulnerabilidad al conflicto humano-cocodrilo como: 1) el mal manejo de los desechos en la pesca y los paseos de olla; 2) la presencia de animales domésticos en las riberas de los ríos; 3) la falta de servicios de agua potable en algunas veredas de la región, que obliga a los habitantes a buscarla en el hábitat de los crocodilianos y 4) una baja tolerancia de los humanos hacia estos animales por el poco conocimiento que tienen sobre su historia natural.

Palabras clave. *Caiman*. Conflicto humano-cocodrilo. *Crocodylus*. Hábitat. *Palesosuchus*.

Abstract. Recently the negative human-wildlife interactions are increasing, then understand them is key to maintain a stable coexistence between wildlife and us. Here we describe the crocodile-human interaction at La Macarena region where our activities are lastly increasing. We found a habitat with a good conservation status where three crocodilian species inhabit, however we found that species abundances relate with human activities. In that sense, the Orinoco crocodile (*Crocodylus intermedius*) and the cachirres (*Palesosuchus palpebrosus*) are more numerous at sites where the riparian forest coverage is high, and the fisherman numbers are low. Despite we do not identified negative human-crocodile interactions, we identified several activities that could increase the human-crocodile conflict as: 1) an incorrect management of waste from fishing and picnics at rivers; 2) pets and cattle prowling around beaches and riparian forests; 3) the absence of

Moreno-Arias, R. A., N. Farfán-Ardila y M. C. Ardila-Robayo†. 2018. Interacciones entre crocodilianos y humanos en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 273-287. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

domestic water in some villages that causes people search it across the crocodilian's habitat, and 4) a low tolerance of people to crocodilians, mainly due to the low knowledge about crocodilians natural history people have.

Keywords. *Caiman*. *Crocodylus*. Habitat. Human-crocodile conflict. *Paleosuchus*.

INTRODUCCIÓN

El conflicto entre el hombre y la fauna silvestre se genera cuando comparten los mismos hábitats y recursos, y debido a esa interacción se generan consecuencias negativas para ambos. Actualmente, el aumento de la población humana y sus actividades económicas incrementa el riesgo del conflicto humano-vida silvestre (Madden 2004, Aust *et al.* 2009). En el conflicto humano-cocodrilo, las interacciones entre ambos pueden generar ataques que pueden producir lesiones y muertes de personas, pero también esos ataques pueden generar daños económicos si ocurren sobre recursos ganaderos o pesqueros (Lamarque *et al.* 2009). Por otro lado, los cocodrilos son afectados directamente con el exterminio de individuos como una respuesta emocional de los hombres a los daños generados por los cocodrilos, lo que tiene efectos negativos en la forma en que la sociedad se relaciona con las especies (Caldicott *et al.* 2005, García-Grajales *et al.* 2008, Aust *et al.* 2009, Lamarque *et al.* 2009).

Entre las principales causas de los ataques de cocodrilos sin provocación de los humanos, se destacan la defensa del territorio, defensa de sus nidos y crías, cacería para su alimentación (humanos, mascotas, recursos pesqueros) o aumento de las interacciones entre humanos y cocodrilos debido a las dinámicas naturales (p. e. dinámica hidrográfica, dinámica de presas). No obstante, los ataques también pueden ocurrir por imprudencia de los humanos al intentar manipular cocodrilos, por un mal manejo de animales domésticos que se aproximan al hábitat de los cocodrilos, por malas prácticas en la pesca ya sea por las artes de pesca utilizadas o la manipulación de los productos en el hábitat del cocodrilo, por la ignorancia sobre los hábitos de la especie y por falsas

creencias sobre los cocodrilos (Pooley *et al.* 1989, Caldicott *et al.* 2005, García-Grajales *et al.* 2008).

En general, el conflicto humano-cocodrilo tiene consecuencias a varios niveles. A nivel local, la molestia y miedo generalizado de la población al verse afectados por la presencia de los cocodrilos genera acciones negativas en su contra, especialmente la cacería indiscriminada de individuos de la especie, con el agravante que estas acciones no representan una solución a las afectaciones generadas por el conflicto (Lamarque *et al.* 2009). En el nivel de gubernamental, el conflicto pone en evidencia la falta de conocimiento del mismo por parte de las autoridades ambientales y la consecuente ausencia de planes de prevención y medidas de manejo para minimizar el riesgo de conflicto y manejo de las contingencias generadas por este. A nivel ecológico, la muerte de los cocodrilos afecta el desempeño de sus poblaciones y al ser los cocodrilos depredadores tope en las cadenas tróficas, su desaparición desencadena desequilibrios poblacionales en especies presas (peces) y competidoras (otros crocodilianos) (García-Grajales *et al.* 2008).

Colombia con seis especies, cuatro géneros y dos familias es el país más diverso del mundo en crocodilianos. En la Orinoquia colombiana se pueden encontrar cuatro de esas seis especies: los cachirres o caimanes enanos (*Paleosuchus palpebrosus* y *P. trigonatus*), la babilla (*Caiman crocodilus*) y el caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*). Actualmente las tres primeras se encuentran en un estado aceptable de conservación, según la lista roja de la UICN estas especies no se categorizan con una amenaza de extinción y presentan un bajo riesgo y preocupación menor para su conservación, mientras que el cocodrilo del Orinoco es la especie de cocodriliano con

mayor grado de amenaza en el Neotrópico y en esa misma lista está categorizado como críticamente amenazado de extinción (CSG 1996a-c, Balaguera-Reina *et al.* 2018).

No obstante, aunque recientemente se han realizado acciones para la conservación del cocodrilo del Orinoco (p. e. Antelo 2015, Moreno-Arias *et al.* 2016), aún persisten amenazas de origen antrópico que no solo afectan a esta especie sino al resto de crocodilianos. Entre estas amenazas todavía está, aunque en baja intensidad, la cacería por miedo o para consumo como alimento. Como una amenaza mayor están la transformación de los hábitats naturales, la contaminación de los cuerpos de agua, la pesca con trasmallos y el aumento del tráfico fluvial (Morales-Betancourt *et al.* 2013, Balaguera-Reina *et al.* 2018). La primera y las dos últimas amenazas parecen haberse incrementado especialmente por el ingreso de más personas a zonas que estuvieron vedadas hasta la desmovilización de los grupos insurgentes ilegales en los últimos años.

En ese sentido, la región de La Macarena, Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y las áreas aledañas, han sido una de esas zonas donde por mucho tiempo fueron un fortín para dichos grupos ilegales y que después de la firma del acuerdo de paz con estos grupos, las actividades humanas aumentaron. Si bien

algunas de ellas como el incremento del turismo de naturaleza son beneficiosas para los pobladores locales, otras como el aumento de pesca comercial para surtir el comercio en otras regiones del país, no son tan beneficiosas ni para los pobladores locales ni para los cocodrilianos. Esa reducción de recursos de alimentación para humanos y crocodilianos puede ser, en un futuro cercano, uno de los detonantes para el incremento del conflicto humano-cocodrilo. Por las razones expuestas anteriormente, el presente estudio buscó documentar la relación entre humanos y crocodilianos y el ambiente que comparten, así como describir la percepción que tienen las personas sobre el cocodrilo del Orinoco con el objeto de obtener información para el manejo y conservación de los crocodilianos e identificar elementos que puedan aumentar la probabilidad de desencadenar el conflicto humano-cocodrilo.

MÉTODOS

En octubre de 2016, con el objeto caracterizar el hábitat usado por los cocodrilos y la población humana, y la abundancia de crocodilianos y la intensidad de actividades humanas, se hicieron recorridos diurnos y nocturnos en tres tramos de los ríos Guayabero y Losada (Figura 1):

Figura 1. a) Río Guayabero y b) río Losada. Fotos: Rafael Moreno-Arias.

1. Alto río Guayabero –AG, 18 km desde el casco urbano de La Macarena, hasta el raudal Angosturas I (2°17'39,74"N - 73°52'43,68"O y 2°11'6,52"N - 73°47'14,64"O).
2. Bajo río Guayabero –BG, 44 km desde el casco urbano de La Macarena hasta el caserío La Catalina (2°11'6,52"N - 73°47'14,64"O y 2°23'4,94"N - 73°35'28,04"O).
3. Bajo río Losada –BL, 21 km desde la desembocadura del río Losada hasta el caserío El Vergel (2°12'36,90"N - 73°56'45,67"O y 2°12'20,89"N - 73°51'20,12"O).

Cada uno de estos se tramos se dividió en transectos consecutivos de 3 km (en AG y BL) y 4 km (en BG).

Para caracterizar el hábitat ribereño se utilizó el método de caracterización de hábitat propuesto por Moreno-Arias *et al.* (2013), la información se obtuvo en muestras de 600 m de curso de cada transecto en los tramos de AG y BL, mientras que en BG las muestras correspondieron a 800 m. Este muestreo correspondió al 20 % de cada tramo estudiado. En cada uno de los transectos (muestras) se cuantificaron las siguientes variables:

1. Número de enramadas (termorre Regulación, refugio y forrajeo).
2. Número de árboles con ramas que están a ras del agua (refugio y forrajeo).
3. Número de playas aptas para anidación de *Crocodylus intermedius* (reproducción).
4. Cobertura lineal en metros de bosque ribereño en ambas orillas (alimentación y reproducción).
5. Número de embarcaciones con motor y sin motor (tráfico fluvial).
6. Número de pescadores.
7. Número de viviendas en las riberas.

8. Presencia y tipo de animales domésticos en las riberas del río.
9. Tipo de actividades humanas en las riberas.

Las variables 2 a 4 correspondieron a elementos del hábitat que se relacionan con las necesidades biológicas de las especies. Las variables 4 a 9 correspondieron a la presencia e intensidad de uso del hábitat por parte de la población humana. Por último, se cuantificaron las variables como la abundancia de cada una dividido por la longitud del transecto. Particularmente para la variable de bosque de ribera, el valor de la variable correspondió al porcentaje de cobertura boscosa en el transecto.

Para caracterizar las poblaciones de crocodilianos se hicieron censos nocturnos y se detectaron a los individuos por medio del reflejo de la luz en sus ojos (Chabreck 1966). Para la identificación específica se procedió a aproximarse al individuo y determinar las siguientes características morfológicas de las especies: la presencia de arista interocular únicamente en *Caiman crocodilus*; el cuarto diente mandibular expuesto en *Crocodylus intermedius*; para diferenciar a las especies *Paleosuchus* se tuvo en cuenta el escamado de las regiones occipital, sacra y caudal, así como la forma del canto rostral (Magnusson 1992); cuando la identificación no fue posible el individuo se registró como solo ojos. Estos censos se hicieron en los mismos transectos de hábitat, con excepción del río Losada donde solamente fue posible censar los últimos 3 km de río hasta su desembocadura en el río Guayabero. Finalmente, se obtuvo la abundancia relativa de cada especie en cada transecto como el número de individuos observado dividido por la distancia del transecto, para todas las variables excepto el bosque de ribera y el tipo de actividad. Para describir las relaciones de abundancia la abundancia de cocodrilos con el hábitat y las actividades humanas se realizaron pruebas correlación de Spearman.

Figura 2. Entrevistas a los habitantes de las riberas de los ríos Guayabero y Losada. Foto: Nidia Farfán-Ardila.

Para determinar la vulnerabilidad al conflicto humano-cocodrilo y la tolerancia que tienen las personas hacia las especies, se hicieron entrevistas a pobladores ribereños. Estas entrevistas se realizaron con el acompañamiento de la Defensa Civil del municipio de La Macarena (Figura 2) y se basaron en la propuesta de caracterización de conflicto humano-cocodrilo de Moreno-Arias y Farfán-Ardila (en preparación) incluyendo algunas preguntas sobre los procesos de reintroducción que se hicieron recientemente. En total se entrevistaron 36 personas en las veredas La Bocana del Perdido, El Vergel y Los Andes (14 personas); Bajo Raudal, Bajo Losada y El Billar (13 personas); y San José, El Carmen, Peña Roja, Nuevo Milenio y Yarusmales (9 personas).

RESULTADOS

Hábitat y actividades humanas

En el tramo BL se registró la mayor cobertura boscosa, seguido por el tramo BG y por último el tramo AG (Tabla 1). El mayor número de enramadas, de árboles a ras de agua y de playas para anidación se registraron en BL, seguido por el AG y por último BG (Tabla 1). La mayor influencia humana se registró en el alto río Guayabero, donde

se observó el mayor número de pescadores, embarcaciones y viviendas (Tabla 1). Las actividades humanas más frecuentes fueron el transporte de turistas y la pesca deportiva y de subsistencia. En el tramo BG se detectó la extracción de madera y en BL minería para construcción. En todos los tramos se detectaron animales domésticos deambulando en las riberas del río, principalmente ganado vacuno y aves de corral, en menor proporción perros y cerdos. En las playas, los animales más frecuentes fueron el ganado vacuno y los perros.

Abundancia de cocodrilianos

En los tres tramos estudiados se registraron tres especies de crocodilianos (Figura 3), distribuidos en tres géneros y dos familias; en total se identificaron a nivel de especie, 97 individuos y 56 como solo ojos. El mayor número de individuos se registró en AG, seguido por BG y por último BL (Tabla 2). La especie con mayor abundancia relativa fue *Caiman crocodilus* con 2,06 individuos/km seguida por *Paleosuchus palpebrosus* con 0,51 individuos /km y *Crocodylus intermedius* con 0,20 individuos/km, esta última especie solo se registró en BG y AG con abundancias de 0,19 y 0,22 individuos/km, respectivamente.

Figura 3. Especies de crocodilianos registrados en los ríos Guayabero y Losada: a) *Crocodylus intermedius*, b) *Caiman crocodilus*, c) *Paleosuchus palpebrosus*. Fotos: Rafael Moreno-Arias.

Tabla 1. Valores de las variables de hábitat registrados en los tramos estudiados en los ríos Guayabero y Losada. N: número de transectos.

Variable/tramo de río	Bajo Losada (N=7)	Alto Guayabero (N=6)	Bajo Guayabero (N=11)
Bosque de ribera (% cobertura)	69,9	60,1	45,9
Enramadas (#/km)	32,1	15,6	23,1
Árboles a ras (#/km)	30,0	21,5	22,8
Playas de anidación (#/km)	3,1	2,7	3,8
Pescadores (#/km)	0,7	0,3	2,5
Embarcaciones (#/km)	3,3	2,6	12,4
Viviendas (#/km)	2,9	5,5	6,8

Tabla 2. Número de individuos de crocodilianos por especie y familia registrado en los tramos estudiados de los ríos Guayabero y Losada. N: número de transectos.

Familia	Especie	Bajo Losada (N=1)	Alto Guayabero (N=6)	Bajo Guayabero (N=4)
Crocodylidae	<i>C. intermedius</i>	0	4	3
Alligatoridae	<i>Ca. ccrocodilus</i>	4	25	43
	<i>P. palpebrosus</i>	1	14	3
Solo ojos		0	37	19
Total		5	80	68

Relaciones entre el hábitat, los crocodi- lianos y la actividad humana

La abundancia de *C. intermedius* se relacionó positivamente con la cobertura del bosque de ribera y el número de playas (N = 11; r = 0,556, *p* = 0,038; N = 11 r = 0,534, *p* = 0,045 respectivamente). La abundancia de *P. palpebrosus* se relacionó negativamente con el número de pescadores (N = 11; r = -0,601, *p* = 0,025). El número de individuos identificados como solo ojos se relacionó, negativamente con la cobertura boscosa y la abundancia de enramadas (N = 11; r = -0,711, *p* = 0,007; N = 11 r = -0,813, *p* = 0,001 respectivamente); y positivamente con el número de viviendas y la intensidad de tráfico fluvial –número de embarcaciones

(N = 11; r = 0,611 *p* = 0,023, N = 11; r = 0,684 *p* = 0,010).

Actividades humanas y vulnerabilidad del conflicto humano-cocodrilo

Las principales actividades económicas de los entrevistados fueron la agricultura y la ganadería, las labores domésticas y el transporte fluvial (Figura 4). El 53% tiene agua potable; el número de predios que cuentan con servicio de energía eléctrica es bajo (25%), por lo que se emplea energía solar (67%) principalmente. Los predios están habitados en promedio por 3 ± 2,9 niños y 3 ± 1,5 adultos, en los cuales se pueden encontrar 6 ± 7,3 personas visitantes que trabajan

Capítulo 9. INTERACCIONES ENTRE CROCODILIANOS Y HUMANOS

o realizan alguna actividad temporal, principalmente de forma informal. Tan solo el 11% de los predios presentan miembro del núcleo familiar afiliado a la seguridad social.

En cuanto a las actividades humanas que se realizan con mayor frecuencia en el río y que podrían aumentar la vulnerabilidad

al conflicto humano-cocodrilo, se encontró que la mayoría corresponden a la recreación, la pesca de subsistencia, el transporte y el aseo personal o lavado de ropa (Tabla 3). Por diferentes rangos de edad, la mayoría de los entrevistados manifestaron que adultos fueron los que realizaron con mayor frecuencia actividades en el río.

Figura 4. Actividades económicas de los habitantes ribereños de los ríos Guayabero y Losada en el municipio de La Macarena, Meta.

Tabla 3. Clasificación por rango de edad, temporada, frecuencia y hora del día de las actividades realizadas en los ríos y playas de los ríos Guayabero y Losada por los habitantes de sus riberas.

Clasificación/tipo de actividad		Recreación	Pesca de subsistencia	Caza	Pesca comercial	Transporte	Aseo personal y lavado de ropa
Rango de edad	Niños	19	8		-	11	14
	Adultos	24	32	8	-	33	21
Temporada	Lluvias	1	17	4	-	29	13
	Seca	22	29	8	-	29	25
Frecuencia	Diaria	12	11		-	9	21
	Semanal	9	19	6	-	18	5
	Mensual	1	2	2	-	4	-
Hora del día	Mañana (6-12h)	20	9	1	-	31	17
	Tarde (12-18h)	19	20	5	-	30	16
	Noche (18-24h)	2	24	7	-	11	1
	Madrugada (24-6h)	-	2	-	-	-	-

Al consultar a los entrevistados sobre la frecuencia con que realizaban las actividades anteriormente mencionadas, manifestaron que la recreación y la pesca de subsistencia se realizan en época seca, diaria y semanalmente, respectivamente, mientras que el transporte ocurre semanalmente en ambas épocas climáticas (Tabla 3). Las actividades recreativas como nadar y hacer paseos de olla, se realizan principalmente en horas de la mañana y de la tarde al igual que el transporte y aseo personal, mientras que la pesca de subsistencia se realiza principalmente en la noche y la tarde, al igual que la cacería (Tabla 3). El 56% de los entrevistados, manifestó que, al realizar actividades de pesca, cacería, o actividades recreativas como asados o paseos de olla, manipulan animales vivos o muertos cerca al agua (playas o desde los botes). El 61% recoge agua del río para alimentación o alguna otra actividad del predio.

En los predios visitados, la mayoría de las personas tienen animales domésticos para subsistencia, principalmente aves de corral, cerdos, vacas y caballos. Estos animales generalmente no tienen ningún tipo de manejo y pueden deambular libremente y acceder al río y sus playas (Tabla 4). De la misma forma, en casi todos los predios tienen animales domésticos de compañía como perros y gatos que igualmente no son sometidos a ningún

tipo de manejo, en algunos predios también se detectaron animales silvestres utilizados con fines de ornato o compañía (Tabla 4).

Percepción de los humanos sobre el cocodrilo del Orinoco

Al evaluar la tolerancia de los entrevistados frente al cocodrilo del Orinoco, el 97% considera que es un animal peligroso para el hombre o los animales domésticos, porque no beneficia al ser humano (81%), al no tener ningún uso (97%). No obstante, el 97% de los entrevistados no ha sido objeto de alguna amenaza por los cocodrilos. Al consultar sobre la percepción frente a que existan cocodrilos en los ríos de la región, para el 81% es malo, 11% es indiferente y para el 8% es bueno. Para el 97%, el cocodrilo del Orinoco no es un animal importante para la cultura llanera o para el país.

La mayoría de las personas (29, 81 %) tuvieron conocimiento sobre la liberación de los cocodrilos en los ríos Losada y Guayabero realizada en 2015 y también la mayoría los han observado (8 %), reconociéndolos por la presencia del transmisor y la antena (Figura 5). La opinión sobre la reintroducción de los cocodrilos fue mayoritariamente negativa: el 69 % (25 personas) de los entrevistados consideraron que liberar cocodrilos en los ríos es peligroso para la comunidad y el 11 % (cuatro personas) consideraron que

Tabla 4. Tipo de uso y manejo de los animales domésticos por parte de los habitantes de las riberas de los ríos Guayabero y Losada. *Danta (*Tapirus terrestris*) y Guacamaya (*Ara* sp.).

Tipo de animal	Tipo de uso			Tipo de manejo	
	Subsistencia	Compañía	Comercio	Libres	Controlados
Aves de corral	36	-	-	28	4
Ovino	1	-	-	1	-
Porcino	7	-	-	4	3
Vacuno y Equino	20	-	1	12	10
Perros-Gatos	-	29	-	29	-
Otros	-	2*	-	2	-

Figura 5. Individuo de cocodrilo del Orinoco reintroducido en el río Guayabero con un dispositivo de seguimiento satelital. Foto: Rafael Moreno-Arias.

al liberarlos se reduciría el pescado. Por otra parte, el resto de entrevistados manifestaron que mientras no ocurrieran ataques la reintroducción no sería un problema (2 personas), que desconocían el propósito de las reintroducciones (6%) o que la reintroducción les era indiferente (3%).

DISCUSIÓN

En términos generales el hábitat para los crocodilianos en la región de La Macarena presenta un aceptable a buen estado de conservación, especialmente para los tramos del río Losada y el alto Guayabero y el bajo Guayabero, en inmediaciones del sitio de La Catalina. En las riberas de estos lugares predomina una cobertura vegetal original sobre coberturas transformadas, la densidad de humanos es baja y sus acti-

vidades también. Asimismo, se conservan elementos del hábitat como enramadas y playas que son claves para la biología de los crocodilianos. Asociados a los lugares en mejor estado de conservación, estuvieron las abundancias más altas de *C. intermedius* y mientras que la mayor abundancia de *C. crocodilus* se asoció a riberas donde la cobertura boscosa fue reemplazada por pastos para ganadería, mientras que la abundancia de *P. palpebrosus* disminuyó en los sectores con mayor presencia de pescadores.

Aunque no se identificaron otras relaciones significativas entre las abundancias de las otras especies con las actividades humanas, predominó una tendencia de disminución de los crocodilianos en general y por especie en sectores con mayor intensidad de actividades humanas como el tráfico fluvial, el número de viviendas y el

número de pescadores. Particularmente, fue llamativa la relación positiva de los individuos identificados como solo ojos con la densidad de viviendas y la intensidad del tráfico fluvial, indicando que en sectores con esas condiciones los individuos tienden a ser más tímidos y por lo tanto fue más difícil aproximarse a ellos a una distancia que permitiera identificarlos.

Las tendencias de cambios negativos en la abundancia o en el comportamiento asociadas a las actividades humanas en La Macarena, ya han sido documentadas en diferentes lugares del país (Medem 1981, Moreno-Arias *et al.* 2013, Vilorio-Lagares *et al.* 2017) y de Suramérica (Thorbjarnarson 1992, Brazaitis *et al.* 1996, Magnusson *et al.* 1997), demostrando la ubicuidad de este patrón. Aunque el estado de conservación de La Macarena es propicio para sostener especies amenazadas de extinción como el cocodrilo del Orinoco y comunidades ricas de crocodilianos, es importante empezar a desarrollar medidas para controlar la sobrepesca (Moreno-Arias obs. pers. 2017, 2018) y disminuir la intensidad de la pérdida del hábitat natural que se ha venido incrementado desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que en esta región las estimaciones indican una deforestación de al menos 14.861 hectáreas en 2017 (Ideam 2017).

En un mundo en el que los hábitats se reducen y la competencia por los recursos naturales incrementa por el aumento de la población y las necesidades del ser humano, los depredadores potencialmente peligrosos, son los que nos alertan sobre la dificultad actual y a la que nos someteremos para coexistir con la vida silvestre (Chapron *et al.* 2014). Por esta razón, la implementación de medidas que permitan a las comunidades humanas locales reducir la vulnerabilidad al conflicto con los crocodilianos, son hoy día muy necesarias (Pooley *et al.* 2017). Esas medidas, constantes y de largo plazo, que mejoren la coexistencia entre humanos y cocodrilos, es uno de los grandes retos de los procesos de conservación de grandes depre-

dadores no solo en la región de La Macarena, sino en todo el país.

Estas medidas, en la región de La Macarena -y quizás en otras regiones del país- donde la vulnerabilidad al conflicto entre humanos y cocodrilos se origina por las mismas causas, se deberían enfocar en el buen manejo de los animales domésticos y en el cambio de la forma en que los humanos realizan sus actividades en los ecosistemas acuáticos. Estas medidas deberían implementarse lo más pronto posible, sin importar que los datos históricos evidencien una baja tasa (3 %) de encuentros negativos entre humanos y cocodrilos en la región (Ardila-Robayo *et al.* 2002), y adelantarse a futuros escenarios cuando la densidad de humanos aumente la competencia por recursos con los crocodilianos y la probabilidad de encuentro con ellos.

Unas de las actividades que aumentan la probabilidad de encuentro entre humanos y crocodilianos y que requieren especial atención son los paseos de olla y la pesca de subsistencia. En estas actividades se manipulan animales vivos o muertos, o desperdicios de estos en las riberas de los ríos y lagunas donde habitan los crocodilianos. Esta manipulación genera olores y ruidos que funcionan como atrayentes de depredadores oportunistas como los crocodilianos. Sin embargo, esta problemática es de fácil solución a través de la capacitación de las personas en buenas prácticas de pesca y de manejo de productos que funcionan como atrayentes de crocodilianos.

Por otro lado, el poco control que tienen las comunidades humanas sobre sus animales domésticos permite que estos deambulen libremente en las riberas de los ríos, lo que los transforma en presas potenciales de los cocodrilos. Los animales domésticos son comparativamente presas más fáciles que los animales silvestres, por lo que en las riberas donde los animales domésticos se mueven libremente -y que muchas veces también son en las que se mueven los humanos-, se incrementa la frecuencia de uso por parte de los cocodrilos. Esta vulnerabilidad debe abordarse a través del fomento

de medidas de manejo de animales domésticos como corrales y abrevaderos para evitar que merodeen en zonas potencialmente peligrosas.

Otro aspecto que se encontró como un generador a la vulnerabilidad al conflicto humano-cocodrilo, fue la cobertura deficiente de los servicios de agua potable y electricidad en la zona rural donde vive cerca del 83% de la población del municipio de la Macarena (Concejo Municipal de La Macarena 2002). Esta falta de cobertura ocasiona que los habitantes se tengan que desplazar a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua para adquirir el agua de consumo diario, pero también para actividades como el aseo personal y lavado de ropa. Estas actividades también aumentan la probabilidad de encuentros entre humanos y cocodrilos. Así, una medida, en responsabilidad de los gobiernos locales, es incrementar la cobertura de los servicios de agua y electricidad que impactará efectivamente disminuyendo la vulnerabilidad del humano-cocodrilo.

Adicional a las medidas mencionadas, la educación debe estar presente de manera transversal a ellas, pero todas las medidas de capacitación que mejoren la coexistencia entre humanos y crocodilianos deben estar en consonancia con la idiosincrasia de la comunidad sin chocar negativamente con ella. También es importante que en la región se fortalezcan entidades como la Defensa Civil o las Unidades de Gestión de Riesgos por medio de capacitaciones a sus funcionarios sobre la forma de respuesta y mitigación de casos de ataques a humanos o animales por parte de cocodrilos, pero también de otros depredadores como los felinos. Toda estrategia educativa deberá ser periódica y abarcar los diferentes grupos etarios de la comunidad para que se cumplan los objetivos de disminuir la vulnerabilidad y mejorar la tolerancia de los humanos sobre los crocodilianos.

Lo anterior se sustenta con el hecho de que a pesar de que antes de la reintroducción de los cocodrilos se hicieron tres talleres en 2014 informando sobre el proyecto (Martínez-Robayo com. pers.), la

comunidad expresó información ambigua. Por una parte, la comunidad expresó la falta de divulgación del proyecto, la preocupación de que los animales provenientes de cautiverio pudieran ser más agresivos que los silvestres que se encuentran en la región y que redujeran la cantidad de pescado que usan para su subsistencia. Por otra parte, fue notable el conocimiento y la información que expresaban sobre la reintroducción, de los lugares que habitaban los individuos reintroducidos y de la fácil identificación de los animales por el dispositivo de seguimiento satelital que tienen instalado.

Esta ambigüedad pudo deberse a que los talleres no fueron efectivos por varios factores: 1) porque la metodología implementada no fue la más adecuada para el público objetivo; 2) porque los temas tratados no fueron los más relevantes para la comunidad en particular y 3) porque el número de talleres fue insuficiente o por una conjunción de esos factores. No obstante, los factores mencionados, se puede considerar que la reintroducción realizada en 2015 ha sido exitosa porque hasta el momento se sabe que solamente uno de los cuatro cocodrilos reintroducidos ha muerto, pero no se sabe si esto ha ocurrido directamente por una acción humana o no, mientras que los otros tres se establecieron en unos territorios específicos donde coexisten parcialmente con los humanos (Moreno-Arias y Ardila-Robayo datos no publicados).

Además de las medidas concretas expuestas anteriormente, la educación de las comunidades ribereñas es uno de los grandes desafíos que se deben enfrentar de forma prioritaria en la región, ya que a diferencia de otras regiones en el país como el Caribe colombiano, donde los crocodilianos tienen una importancia económica y cultural (Balaguera-Reina y González-Maya 2010), en el municipio de La Macarena las personas consideran al cocodrilo del Orinoco como un animal peligroso sin valor económico y cultural. No obstante que las comunidades ribereñas de los ríos Losada y Guayabero en el municipio de La Macarena han coexistido durante mucho tiempo con cocodrilos,

tienen poco conocimiento sobre la importancia ecológica de la especie y de los usos potenciales para el aprovechamiento de esta, lo que refleja una pérdida del vínculo histórico que ha habido entre humanos y crocodilianos en la Orinoquia. Aunque los encuentros negativos entre personas

y crocodilianos han sido extremadamente raros en la región, eso no quiere decir que el conflicto humano-cocodrilo no pueda ocurrir por ello es importante reconstruir ese vínculo histórico a través de medidas que tengan en cuenta la justa proporción de los saberes locales y científicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Antelo, R. 2015. First Orinoco crocodile reintroduction in Colombia. *Crocodile Specialists Group NewslMADS* 34 (2): 18–19.
- Ardila-Robayo, M. C., S. L. Barahona y O. P. Bonilla. 2002. Monitoreo poblacional de *Crocodylus intermedius* (Caimán llanero) en los ríos Guayabero y Duda. Informe Final. Universidad Nacional de Colombia. 30 pp.
- Aust, P., B. Boyle, R. Fergusson y T. Coulson. 2009. The impact of Nile crocodiles on rural livelihoods in Northeastern Namibia. *South African Journal of Wildlife Research* 39: 57-69.
- Balaguera-Reina, S. A. y J. F. González-Maya. 2010. Percepciones, conocimiento y relaciones entre los Crocodylia y dos poblaciones humanas de la Vía Parque Isla de Salamanca (Caribe colombiano). *Latin American Journal of Conservation* 1 (1): 53-63.
- Balaguera-Reina, S. A., A. Espinosa-Blanco, R. Antelo, M. A. Morales-Betancourt y A. Seijas. 2018. *Crocodylus intermedius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T5661A3044743. Descargado en agosto de 2018.
- Brazaitis, P., G. H. Rebêlo, C. Yamashita, E. A. Odierna y E. Watabane. 1996. Threats to Brazilian crocodilian populations. *Oryx* 30 (4):275-284.
- Caldicott, D. G., E. Crozer, C. Manolis, G. Webb y A. Britton. 2005. Crocodile attack in Australia: An analysis of its incidence and review of the pathology and management of crocodilian attacks in general. *Wildern and Environmental Medicine* 16: 143-159.
- Chabreck, R. H. 1966. Methods of determining the size and composition of alligator population in Louisiana. *Proceedings of the Annual Conference Southeastern Association of Game and Fish Commissioners* 20: 105 - 112.
- Chapron, G., P. Kaczensky y J. D. Linnell. 2014. Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. *Science* 346: 1517-1519.
- Concejo Municipal de La Macarena. 2002. Plan estratégico Meta. Diagnóstico de la zona insular del municipio de La Macarena (Meta). Gobernación de Meta. Meta, Colombia. 489 pp.
- Crocodile Specialist Group. 1996a. *Caiman crocodilus*. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T46584A11062106. Descargado en agosto de 2018.
- Crocodile Specialist Group. 1996b. *Paleosuchus palpebrosus*. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T46587A11062803. Descargado en agosto de 2018.
- Crocodile Specialist Group. 1996c. *Paleosuchus trigonatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T46588A11063247. Descargado en agosto de 2018.
- García-Grajales, J., A. Buenrostro-Silva y J. D. Brandon-Pliego. 2008. Negative fatal interaction with American crocodile in Oaxaca, Mexico. *Crocodile Specialists Group Newsl-MADS* 27: 4-5.
- Lamarque, F., J. Anderson, R. Fergusson, M. Lagrange, Y. Osei-Owusu y L. Bakker. 2009. Human-wildlife conflicts in Africa: causes, consequences and management strategies. Forestry Paper N° 157. FAO. Roma, Italia. 108 pp.

Capítulo 9. INTERACCIONES ENTRE CROCODILIANOS Y HUMANOS

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 2017. Núcleos activos por deforestación 2017-I. Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia. Disponible en: <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023708/boletinDEF.pdf>. Página visitada en septiembre de 2018.
- Madden, F. 2004. Creating coexistence between humans and wildlife: Global perspectives on local efforts to address human-wildlife conflict. *Human Dimens Wildl* 9: 247-257.
- Magnusson, W. E. 1992. *Paleosuchus*. *Catalogue of American Amphibians and Reptiles* 553: 1-4.
- Magnusson, W. E., A. P. Lima, V. L. Costa, A. C. Lima y M. C. Araújo. 1997. Growth during middle age in Schneider's Dwarf caiman, *Paleosuchus trigonatus*. *Herpetological Review* 28 (4): 183.
- Medem F. 1981. Los Crocodylia de Sur América, los Crocodylia de Colombia. Volumen I. Colciencias. Bogotá. Colombia. 354 pp.
- Morales-Betancourt M. A., C. A. Lasso, J. de La Ossa y A. Fajardo-Patiño. 2013. VIII. Biología y conservación de los Crocodylia de Colombia. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 336 pp.
- Moreno-Arias, R. A., M. C. Ardila-Robayo, W. Martínez-Barreto y R. Suárez-Daza. 2013. Ecología poblacional de la babilla (*Caiman crocodilus fuscus*) en el valle del río Magdalena (Cundinamarca, Colombia). *Caldasia* 35 (1): 25-36.
- Moreno-Arias, R. A., M. C. Ardila-Robayo, W. Martínez-Barreto y R. Suárez-Daza. 2016. Navigating with the Orinoco crocodile. *Crocodile Specialist Group News/MADS* 35 (2): 14-15.
- Pooley, S., M. Barua, W. Beinart., A. Dickman, G. Holmes, J. Lorimer, D. Loveridge, D. W. Macdonald, G. Marvin, S. Redpath, C. Sillero-Zubiri, A. Zimmermann y E. J. Milner-Gulland. 2017. An interdisciplinary review of current and future approaches to improving human-predator relations. *Conservation Biology* 31 (3): 513-523 doi:10.1111/cobi.12859.
- Pooley, T. 1989. Discoveries of a Crocodile Man. Collins. Londres, RU. 85 pp.
- Thorbjarnarson, J. y G. Hernández. 1992. Recent investigation on the status and distribution of Orinoco crocodile *Crocodylus intermedius* in Venezuela. *Biological Conservation* 62: 179-188.
- Viloria-Lagares, T., R. A. Moreno-Arias y P. Bloor. 2017. Assessment of American crocodile *Crocodylus acutus* & Brown caiman *Caiman crocodilus fuscus* (Crocodylia: Alligatoridae) populations in the Paramillo National Natural Park, Colombia. *Herpetological Conservation and Biology* 12: 24-32.

Río Guayabero. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Tonina o delfin rosado (*Inia geoffrensis humboldtiana*). Foto: Fernando Trujillo.

Aspectos poblacionales y biogeográficos de la tonina o delfín de río, *Inia geoffrensis humboldtiana* Pilleri & Gihl, 1978 (Cetartiodactyla, Iniidae) en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia

Federico Mosquera-Guerra, Fernando Trujillo, Carlos A. Parra Sandoval, Juan D. Carvajal-Castro y Hugo Mantilla-Meluk

Resumen. Las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco contienen la mayor diversidad de especies de delfines de río en el planeta. Procesos vicariantes de aislamiento han contribuido a la especiación del género *Inia* en diferentes cuencas al interior del continente, así como las incursiones a sistemas dulceacuícolas amazónicos por delfines marinos ocasionaron la especiación del género *Sotalia*. La Fundación Omacha y Cormacarena, realizaron dos expediciones científicas entre los años 2016 y 2018 a los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales (afluente del Guayabero), con el objetivo de establecer los parámetros poblacionales de *I. g. humboldtiana* durante dos periodos hidrológicos contrastantes. Los valores de densidad registrados para los delfines estuvieron relacionados con los tipos de hábitats estudiados, encontrando para las aguas en descenso (2016), en el río principal una $D=0,1$ *Inia*/km²; confluencia $D=0,2$ *Inia*/km² y canal $D=0,4$ *Inia*/km²; para el tipo de hábitat “isla” no se registraron observaciones. Para las aguas en ascenso (2018), los valores en el río principal fueron $D=0,3$ *Inia*/km² y confluencia $D=2,6$ *Inia*/km² para los otros hábitats (canal e isla), no se registraron observaciones. Se destaca la importancia de las confluencias entre los ríos Guayabero y Losada y el río Guyabero y caño Yarumales, para los procesos ecológicos de la especie, así como los procesos geomorfológicos como el raudal Angosturas I que delimitan la distribución más occidental y altitudinalmente más elevada, para *I. g. humboldtiana* en la cuenca del Orinoco. Se propone el uso de los delfines de río como indicadores biológicos para determinar el estado de salud de los ecosistemas acuáticos asociados al Distrito de Manejo Especial de La Macarena y al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

Palabras clave. Cuenca del río Orinoco. Delfines de río. Densidad. Distribución. Hábitats.

Mosquera-Guerra, F., F. Trujillo, C. A. Parra, J. D. Carvajal-Castro y H. Mantilla-Meluk. 2018. Aspectos poblacionales y biogeográficos de la tonina o delfín de río, *Inia geoffrensis humboldtiana* Pilleri & Gihl, 1978 (Cetartiodactyla, Iniidae) en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 289-305. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

Abstract. The basins of the rivers Amazon and Orinoco contain the largest diversity of river dolphin species on the planet. Vicarious isolation processes have contributed to the speciation of the genus *Inia* in different basins in the interior of the continent, as well as incursions into Amazonian freshwater systems by marine dolphins caused the speciation of the genus *Sotalia*. The Omacha Foundation and Cormacarena carried out two scientific expeditions between 2016 and 2018 to the rivers Guayabero, Losada and Caño Yarumales with the objective of establishing the population parameters of *I. g. humboldtiana* during two contrasting hydrological periods. The density values registered for the river dolphins during the periods evaluated was a function of the types of habitats studied, finding for the descending waters (2016), in the Main River $D = 0,1$ *Inia*/km², Confluence $D = 0,2$ *Inia*/km² and Channel $D = 0,4$ *Inia*/km², for the habitat type Island there were no observations, and for the rising waters (2018) in the Main River $D = 0,3$ *Inia* /km² and Confluence $D = 2,6$ *Inia*/km², for the types of Channel and Island habitats were not recorded observations. The importance of the confluences between the Guayabero and Losada rivers and the Guyabero and Caño Yarumales rivers is reported for the ecological processes of the species. As well as geomorphological processes such as the Raudal de Angosturas I that delimit the most western and altitudinally higher distribution for *I. g. humboldtiana* in the Orinoco basin. The use of river dolphins is proposed as biological indicators to determine the state of health of the aquatic ecosystems associated with the Special District of La Macarena and the Sierra de la Macarena National Natural Park.

Keywords. Density. Distribution. Habitats. Orinoco River basin. River dolphins.

INTRODUCCIÓN

El proceso de especiación de los delfines de río en Suramérica, inicia con el ingreso de los ancestros del género *Inia* (Cetartiodactyla: Iniidae) a los mares epicontinentales al interior del continente. Posteriormente, eventos geomorfológicos trajeron consigo procesos vicariantes de aislamiento entre poblaciones en las diferentes cuencas, lo que dio lugar a tres especies: 1) *I. geoffrensis*, con las subespecies: *I. g. geoffrensis* para la cuenca del Amazonas e *I. g. humboldtiana* para la cuenca del Orinoco; 2) *I. boliviensis*, en las cuencas del Mamoré, Itenez, Grande y alta del río Madeira en Bolivia, y 3) *I. araguaiaensis*, en el complejo hidrográfico formado por los ríos Tocantins-Araguaia, en la Amazonia brasileña (Hrbek *et al.* 2014, Mosquera-Guerra *et al.* 2015). El género *Sotalia* (Cetartiodactyla: Delphinidae) incluye dos especies: *Sotalia fluviatilis* (continental y simpátrica con *I. g. geoffrensis*), que corresponde a individuos distribuidos en la cuenca del río Amazonas y *Sotalia guianensis* (cuenca media y delta

del río Orinoco, Lago de Maracaibo y costas del Océano Atlántico en Centro y Suramérica). Los individuos de esta última especie, establecidos en la cuenca del Orinoco son simpátricos con *I. g. humboldtiana* y presentan 600 mil años de divergencia genética de las poblaciones costeras (Carvajal-Castro *et al.* 2015, Caballero *et al.* 2017). Estos procesos biogeográficos complejos ubican a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco como las más diversas del planeta para este grupo cetáceos, registrando el mayor número de especies de delfines de río e incluso superando al continente asiático (Mosquera-Guerra *et al.* 2015).

En la actualidad, los delfines de río en el continente presentan una serie de amenazas a su conservación, como son el aislamiento y disminución de la variabilidad genética de sus poblaciones por la construcción de hidroeléctricas en Brasil, Perú y Bolivia (Trujillo *et al.* 2010, Mosquera-Guerra *et al.* 2015a, Pavanato *et al.* 2016), biomagnificación de mercurio total (Hg) (Rosas y Kesii 1996, Trujillo *et al.* 2005, Mosquera-Guerra

Figura 1. Ubicación espacial de los tramos evaluados para determinar la estimación poblacional de *Inia g. humboldtiana* en: 1) río Guayabero, 2) río Losada y 3) río Guayabero - caño Yarumales.

et al. 2015b y c), destrucción de sus hábitat (Utrera *et al.* 2013), hidrovías (Trujillo y Diazgranados 2012), interacciones biológicas y operacionales con las pesquerías comerciales y artesanales (Mosquera-Guerra *et al.* 2015c; Williams *et al.* 2016), capturas dirigidas para ser usados como carnada en las pesquerías del pez mota (*Calophysus macropterus*) (Salinas *et al.* 2013, Mosquera-Guerra *et al.* 2015c), aumento en la contaminación acústica por el incremento en el tránsito de embarcaciones (Trujillo *et al.* 2010) y alteraciones en los ciclos estacionales debido al cambio climático (Mosquera-Guerra *et al.* 2015a). Estos factores hacen que los delfines de río en los géneros *Inia* y *Sotalia* se encuentren entre las especies de cetáceos más amenazadas del planeta (Trujillo *et al.* 2013).

La importancia de estos cetáceos en los ecosistemas acuáticos dulceacuícolas donde habitan se sustenta, por un lado, en su valor biológico como depredadores tope

e indicadores de la salud del ecosistema. Otro aspecto, es su significancia cultural y mitológica en etnias como los Sikuani del Orinoco y los Ticuna del Amazonas, y recientemente su valor económico, principalmente como atractivo turístico en los municipios de La Macarena, Puerto Gaitán y Puerto López en departamento del Meta (Mosquera-Guerra *et al.* 2016).

En este sentido, el presente caso de estudio documenta los tamaños poblacionales de *I. g. humboldtiana* en los ríos Guayabero y Losada durante dos períodos climáticos contrastantes entre los años 2016 y 2018, además de destacar la importancia de las barreras biogeográficas como el raudal Angosturas I en los procesos de diversificación de la especie y de resaltar las acciones para el manejo y conservación de esta población realizadas por la Fundación Omacha y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena-Cormacarena.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2016 (aguas en descenso) y 29 y 30 de julio de 2018 (aguas en ascenso), se realizaron dos evaluaciones para la estimación poblacional de *I. g. humboldtiana* en la cuenca del río Guayabero y tributarios (Figuras 1 y 2). Los tramos evaluados comprendieron los muestreos entre: 1) La Macarena - Raudal de Angosturas I (río Guayabero); 2) Bocas del río Losada-Laguna del Losada (2° 11' N y 73° 46' O); 3) y la Sección caño Yarumales-Macarena (río Guayabero) (2° 12' N y 73° 46' O) (Tabla 1).

Fase de campo

Para la estimación poblacional de *I. g. humboldtiana* se empleó una embarcación de madera de cuatro metros de largo y dos de ancho propulsada por un motor de 40 hp. A lo largo de las dos expediciones científicas, se recorrieron 144 km a una velocidad promedio de 10-13 km/h. Se ubicaron dos posiciones de observación en la embarcación, una en la proa con un (1) observador,

y otra en la popa con un (1) observador. Las observaciones realizadas en proa fueron independientes de las observaciones en popa, y las posiciones de los observadores en cada plataforma fueron rotadas en un intervalo de tiempo de dos horas. Todos los observadores que participaron en los muestreos tenían experiencia previa con estudios de delfines de río (Gómez-Salazar *et al.* 2011).

Diseño de los transectos

Se establecieron cuatro tipos de hábitats usados por los delfines: río principal, confluencias, canales e islas (Tabla 2 y 3). En el diseño de muestreo para los tipos de hábitat establecidos, se emplearon transectos en banda (paralelos a la orilla manteniendo una distancia de 100 m), siguiendo lo propuesto por Gómez-Salazar *et al.* (2011). En el caso de los tipos de hábitat donde el ancho es menor a 300 m se tomó la distancia a lado y lado de la orilla (Gómez-Salazar *et al.* 2011 y 2011a). Se diligenció una planilla de esfuerzo de muestreo donde se registraron los datos de distancia de los transectos, coordenadas de la zona y tipos de eventos.

Figura 2. Río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

Tabla 1. Tipos de hábitat estudiados: área, longitud de los transectos y N trans.: número de transectos realizados por tipo de hábitat. S: transectos en banda y L: transectos en línea.

Cuenca	Ríos	Tipo de hábitat	Área		Longitud		N trans.	
			(km²)		(km)			
			S	L	S	L	S	L
Orinoco	Guayabero	Canal	2		10		4	
		Confluencia	0,5					
		Río principal	20		100		42	
		Islas	0,8		4		2	
	Losada	Canal	4		20		8	
		Confluencia	0,5		5		2	
		Río principal	2,88		14,4		6	
		Islas						
	Caño Yarumales	Canal	1		5		2	
		Confluencia						
		Río Principal						
		Islas						
Total Investigado		Todos los transectos	31,68		144		66	

Tabla 2. Definición de tipos de hábitat utilizados en este estudio. Los tipos de agua siguen la propuesta de Gómez-Salazar *et al.* (2011) y Trujillo *et al.* (2011).

Tipo de hábitat	Características	Áreas muestreadas
Río principal	Aguas blancas con origen de los Andes, típicamente turbias, de color marrón, con baja transparencia, pH básico, y ricas en sedimentos (Sioli 1984).	Ríos Guayabero y Losada: de 200-500 m de ancho; 15 m profundidad promedio.
Confluencias	Áreas de intersección entre ríos, canales o tributarios. Las confluencias están disponibles para los delfines de río durante todas las épocas del año, y pueden ser de aguas blancas o negras.	Confluencias con los ríos Losada y el caño Yarumales.
Canales	Cursos de agua con no más de 300 metros de ancho, asociados a islas y sistemas de ríos principales. La navegación en este hábitat es restringida de acuerdo a la época hidroclimática.	
Islas	Área acuática adyacente a las islas en los ríos principales, y donde la vegetación puede aparecer o desaparecer de acuerdo al periodo hidroclimático.	

Capítulo 10. ASPECTOS POBLACIONALES Y BIOGEOGRÁFICOS DE LA TONINA

Tabla 3. Tipos de orilla. Fuente: Gómez-Salazar *et al.* (2011).

Tipo de orilla	Características
Bosque	Vegetación densa, solamente representada por árboles mayores (>6 m).
Arbustos	Vegetación baja (<6 m), por lo general en parches a lo largo del continuo orilla, en ocasiones al borde del bosque
Vegetación inundada	Bosques y matorrales inundados durante la temporada de aguas altas.
Gramíneas	Hierba que cubre la orilla.
Pastos flotantes	Vegetación flotante principalmente representado por las plantas acuáticas (es decir, <i>Eichhornia</i> sp., <i>Paspallum</i> sp., <i>Pistia</i> sp.).
Barranco	Despeñadero con o sin vegetación.
Playa	Bancos de arena o barro en la orilla o en las islas principales, ubicados en el medio de los cuerpos de agua.
Rocas	Las grandes rocas en la orilla. De vez en cuando en relación con los rápidos.

Formatos de avistamiento

Se consideró un avistamiento el momento que un individuo o grupo de individuos fueron detectados. Dos formatos fueron diligenciados, uno para la plataforma de observación y otro de esfuerzo. Cada vez que se avistaron delfines, se registró la siguiente información: hora, posición geográfica (GPS, Garmin 60CSx), especie y número de individuos (tamaño grupal). Un grupo fue definido como el número de animales que pueden ser observados dentro de una distancia de 200 m con respecto a los observadores (Trujillo 2000, Gómez-Salazar *et al.* 2011 y 2011a). Cuando se realizaron avistamientos, la velocidad fue constante y no se detuvieron los muestreos. En cada plataforma se ubicaron transportadores geométricos en la mitad de la embarcación para medir el ángulo desde la plataforma de observación respecto al primer delfín avistado por el observador. Al mismo tiempo, se estimó visualmente la distancia desde la embarcación al individuo.

Formato de esfuerzo

La información en este formato se registró en intervalos de 2,5 km, cada vez que había un avistamiento de delfines. La información registrada fue la siguiente: posición geográfica, hora, velocidad de la embarcación,

dirección de navegación, número de kilómetros recorridos por transecto (longitud del transecto), tipo de transecto, visibilidad (brillo solar: fuerte, medio, bajo, ausente; estado del río: calmado, pequeñas olas, olas medianas, olas grandes), tipo de hábitat, tipo de orilla. Para los muestreos realizados en cada expedición se registró la fecha, el periodo hidroclimático (aguas en descenso y ascenso).

Estimaciones de densidad y tamaño de grupo

Los valores de densidad para *I. g. humboldtina* fueron obtenidos a través de los transectos en banda y fueron estimados empleando los valores de P_k y $g_{(0)}$ calculados para la especie por Gómez-Salazar *et al.* (2011) (Buckland *et al.* 2001, Thomas *et al.* 2002, Thomas *et al.* 2010).

$$D = nE(i)f(0)/2Lg(0)$$

Donde:

n: número de grupos observados.

E (i): estimado del tamaño para cada grupo de la población en un hábitat tipo i.

f (0): densidad probable a distancia perpendicular 0.

L: longitud del transecto total.

g (0): probabilidad de observación de un grupo en la línea de transecto.

Usando los datos de la plataforma de observación se estimó el $g(0)$. La función de detección fue de aproximadamente 50 m. Tres modelos de detección fueron usados: Uniform, half-normal, y hazard-rate (Buckland *et al.* 2001). El modelo fue seleccionado usando Akaike's Information Criterion (AIC) (Burnham y Anderson 2002).

Los valores de (P_k) estimados para la especie correspondieron a los calculados por Gómez-Salazar *et al.* (2011), para las cuencas del Orinoco-Amazonas que corresponden a: $P_1=0,91$ (distancias del observador 5-100 y 100-150m) y $P_2= 0,523$ (0-50 y 150-200 m), de acuerdo a las áreas de detección del tipo de hábitat (Buckland *et al.* 2001). El $g_{(0)}$ fue tomado de Gómez-Salazar *et al.* (2011), siendo 0,947 (0,025) para *Inia*.

$$Di = \frac{E(i) [n_{0-50}/P_2 + n_{50-100}/P_1 + n_{100-150}/P_1 + n_{150-200}/P_2]}{W Li g(0)}$$

Donde:

Li: longitud total de los transectos banda en cada hábitat.

W: ancho de banda (200m).

SE: se estimó el coeficiente de variación

(CV) para la tasa de encuentro, CV para la detección de probabilidad y CV para el $g(0)$.

La proporción media de animales detectados en las bandas de 50 m de ancho paralelas a la línea de transecto, correspondió a P_1 y P_2 y fue calculado como el área bajo a curva de función de detección $g_{(x)}$ en cada banda de 50 m de ancho de la siguiente forma:

$$P_1 = P_{0-50} = \frac{\int_0^{50} g_{(x)} dx}{50} \quad P_1 = P_{0-50} = \frac{\int_0^{50} g_{(x)} dx}{50}$$

$$P_2 = P_{50-100} = \frac{\int_{50}^{100} g_{(x)} dx}{50}$$

Siguiendo los métodos propuestos por Gómez-Salazar *et al.* (2011) se calculó la desviación estándar (SD) de las tasas de observación:

$$SE(D) = \sqrt{Dx \sqrt{(CV \text{ encounter_rate})^2 + (CV \text{ encounter_probabilidad})^2 + (CV(g(0)))^2}}$$

Donde:

CV: tasa de encuentro, que fue obtenida para transectos de banda de 200 m de ancho para calcular la desviación estándar (SD) de las tasas de observación de individuos con el tipo de hábitat (por km de transecto; $S_k = z_k / l_k$), donde z_k es el número de individuos observados en el transecto k .

$$CV_{\text{encounter_rate}} = SD(sk) / \text{Mean}(sk)$$

Basado en el procedimiento de Jackknife (Sokal y Rohlf 1981), los valores de P_k se obtuvieron de la curva de detección para dejar afuera todos los delfines observados por fuera de este rango, y, dejando (P_{k-y}) y donde se obtienen nuevas estimaciones de densidad.

$$Di_{-y} = \frac{E(i) [n_{0-50}/P_{2,-y} + n_{50-100}/P_{1,-y} + n_{100-150}/P_{1,-y} + n_{150-200}/P_{2,-y}]}{W Li g(0)}$$

Donde:

Cuando los “seudo valores” (Sokal y Rohlf 1981) fueron calculados como:

$$\phi y = m Di - (m-1) Di_{-y}$$

Donde:

m: número de ríos, y aproximadamente SE :

$$SE(Di) = SD(\phi y) / \sqrt{n}$$

La CV (probabilidad de detección) fue obtenida por fuera del canal la corrección aplicada para estimar el error estándar (SE) de los valores, Di :

$$CV_{\text{detection_probability}} = SE(Di) / Di$$

Tamaño de la población: El tamaño de la población (N_i) para los delfines de río en cada hábitat i , fue calculado:

$$N_i = A_i D_i$$

En general el coeficiente de variación del total estimado para el río fue calculado de la siguiente manera:

$$CV(N_i) = \sqrt{\sum SE(N_i)^2 / \sum N_i}$$

RESULTADOS

Estimaciones de densidad y tamaño de grupo

Los resultados obtenidos se presentan en función al número estimado de animales, entendido este como la relación entre el total de individuos observados para cada tipo de hábitat por el área (km^2) (Figura 3).

Los valores de las densidades registradas para *I. g. humboldtiana*, estuvieron en función del tipo de hábitat y periodo evaluado. Así, durante las aguas en descenso (2016) los valores fueron: río principal $D=0,1$ *Inia/km*², confluencia $D=0,2$ *Inia/km*² y canal $D=0,4$ *Inia/km*². Para el tipo de hábitat isla no se registraron observaciones (Figura 3, Tabla 4). Para las aguas en ascenso (2018) los valores fueron: río principal $D=0,3$ *Inia/km*² y confluencia $D=2,6$ *Inia/km*². Para los tipos de hábitats canal e isla no se registraron observaciones (Figura 4, Tabla 4).

Se estimó un tamaño poblacional de 11 (CV: 0,04) delfines para el periodo evaluado en 2016, durante las aguas en descenso para los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales y 14 (CV:0,18), en el periodo de aguas en ascenso en 2018. El tamaño de grupo promedio para la especie en 2016 correspondió a 1,5 (SD: 1,9) y de 2,3 (SD: 0,8) para el 2018 (Figura 5).

Figura 3. Observaciones de *I. g. humboldtiana* en los dos periodos evaluados (2016-2018) para los ríos Guayabero y Losada, La Macarena, Meta.

Figura 4. Valores de densidad para *I. g. humboldtiana* para los diferentes tipos de hábitats muestreados en los periodos hidrológicos de aguas en descenso (2016) y ascenso (2018) para los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales.

Tabla 4. Promedio de la tasa de avistamiento (n/l), estimativo de densidad (D) y coeficiente de variación para la tasa de encuentro CV (er).

Expediciones	Items	Tipo de Hábitat			
		Canal	Confluencia	Isla	Río principal
Aguas en descenso 2016	n/l	0,38	0,58	0	0,89
	D Inia/Km²	0,4	0,2	0	0,1
	CV(er)	0,94	1,06	0	0,64
Aguas en ascenso 2016	n/l	0	0,76	0	0,55
	D Inia/Km²	0	2,6	0	0,3
	CV(er)	0	0,42	0	0,23

DISCUSIÓN

Estimaciones de densidad y tamaño de grupo

Los valores para la densidad de la especie en los diferentes periodos hidrológicos evaluados coinciden con lo expuesto por Gómez-Salazar *et al.* (2011) y Mosquera-Guerra *et al.* (2015), para la cuenca del río Meta, con la diferencia de que Gómez-Salazar *et al.* (2011), registran densidades de $D=1,24$ Inia/

km² para el tipo de hábitat isla en cuenca del río Meta. Esta variación en los resultados reportados para este tipo de hábitat en específico, puede deberse a la mayor área muestreada por Gómez-Salazar *et al.* (2011) en los tramos: Puerto Gaitán (Meta)-Puerto Carreño (Vichada), al igual que las

Figura 5. Individuo de *I. g. humboldtiana* en el río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Foto: Fernando Trujillo, Fundación Omacha.

características de la cuenca del río Meta como el ancho y microhábitats como playas y remansos, donde se concentran los peces. Este tipo de hábitats no están presentes en los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales, dada la altitud donde se realizó la presente investigación.

Estos resultados permitieron identificar que las confluencias entre los ríos Guayabero y Losada y Guayabero y Caño Yarumales, son áreas muy productivas en relación al recurso pesquero durante los diferentes periodos hidrológicos y zonas de importancia para la especie, dado que en este tipo de hábitat se observaron las densidades mayores. Este echo coincide con lo expuesto por Trujillo y Diazgranados (2004) y Gómez-Salazar *et al.* (2011), que relacionan el mayor número de individuos en las confluencias para los ríos Meta y Orinoco, donde posiblemente se puedan

presentar conflictos con los pescadores por el recurso pesquero (Mosquera-Guerra *et al.* 2015a) (Figura 6). La información obtenida permite establecer la importancia de estas áreas como fuente de alimentación debido al encuentro de aguas con diferente productividad -blancas más productivas que las claras- y el paso además, obligado para la mayoría de peces que realizan migraciones entre los ríos principales y sus tributarios, convirtiéndose en lugares preferentes por los delfines para su alimentación (Smith 1993, Trujillo 1997, Trujillo 2000, Mosquera-Guerra *et al.* 2015, a, c y Mosquera-Guerra *et al.* 2016). Igualmente, Trujillo (1997, 2000), Trujillo y Diazgranados (2004) y Mosquera-Guerra *et al.* (2016), sugieren la realización de esfuerzos de conservación en las confluencias garantizando de esta forma no solo la presencia de los delfines sino de los taxones que se encuentran en este sistema.

Figura 6. Pescadores de La Macarena (Meta), desplegando un trasmallo a lo ancho del río Guayabero. Este tipo de arte de pesca es uno de los más lesivos para los delfines de río al generar el enmallamiento de individuos juveniles. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

En total se registraron entre 11 y 14 individuos de *I. g. humboldtiana* para los dos periodos hidrológicos evaluados en los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales, lo que representa valores relativamente bajos si se comparan con los reportados para la Amazonia (Gómez-Salazar *et al.* 2011), donde las cifras muestran densidades mucho mayores para hábitats como el canal 4,9 *Inia*/km², río principal 2,7 *Inia*/km² y confluencias 4,2 *Inia*/km². La diferencia en los valores registrados para los parámetros poblacionales reportados, se debe principalmente a que los individuos de la cuenca de los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales corresponden a la distribución más occidental y altitudinalmente más elevada para esta subespecie en la cuenca Orinoco (Figura 7).

El tamaño de grupo promedio para *I. g. humboldtiana* en los muestreos de aguas en descenso (2016) y ascenso (2018) para los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales,

coincide con lo reportado por Gómez-Salazar *et al.* (2011) y Mosquera-Guerra *et al.* (2015), para cuencas similares en los ríos Meta, Yucao y Manacacías. El tamaño de grupo para los delfines de río en la cuenca del río Orinoco está influenciado por factores etológicos, periodos hidroclimáticos, migraciones de los peces y periodos reproductivos (Trujillo 1997, 2000).

Barreras naturales y diversificación

El descenso en el nivel de los mares epicontinentales tuvo como efecto una disminución en la conectividad entre las subpoblaciones ancestrales del género *Inia* (Trujillo y Diazgranados 2012). Discontinuidades ecológicas asociadas a fallas de la placa Guayanesa como el Canal del Casiquiare, han resultado en la formación de raudales que se identifican como barreras geográficas, generando el aislamiento de las poblaciones de delfines de la cuenca del Orinoco de sus conspecíficos

Figura 7. Río Guayabero en inmediaciones de la sierra de La Macarena, distribución más occidental y altitudinalmente más elevada para *I. g. humboldtiana* en la cuenca Orinoco. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

en la cuenca del Amazonas (Trujillo y Diazgranados 2012). Producto de este aislamiento vicariante se reconocen las especies *I. g. geoffrensis* para la cuenca del Amazonas e *I. g. humboldtiana* para la cuenca del Orinoco. Procesos similares de especiación ocurrieron en la cuenca del Amazonas para la especie *I. boliviensis* ocasionado por el aislamiento generado por los rápidos de Madeira (Gravena *et al.* 2014) e *I. araguaiaensis* por el complejo hidrográfico conformado por los ríos Araguaia y Tocantins (Hrbek *et al.* 2014). Estos determinantes biogeográficos para la especie se encuentran presentes en el río Guayabero donde el raudal Angosturas I limita la distribución de esta población la más occidental de la cuenca Orinoco (Figura 8).

Aspectos de conservación y manejo

Los delfines de río suramericanos (*Inia* y *Sotalia*), se encuentran entre los cetáceos más amenazados del planeta (Trujillo *et*

al. 2010 Mosquera-Guerra *et al.* 2016). En las dos expediciones realizadas se documentaron tensores para los delfines de río y sus hábitats, destacando los efectos del cambio climático al balance hídrico de la cuenca, las afectaciones sobre los niveles de productividad de los ecosistemas acuáticos y la alteración en la migraciones de peces; la degradación de sus hábitats por el cambio en el uso del suelo principalmente por el establecimiento de la actividad ganadera en inmediaciones del cauce de los ríos Guayabero y Losada (Figura 9); el incremento en el tráfico de embarcaciones (principalmente asociado al aumento de la actividad turística) y conflictos operacionales y biológicos con pesquerías (Mosquera-Guerra *et al.* 2016). Sin embargo, en la actualidad se están implementando acciones para la conservación y manejo de esta importante población de delfines de río, realizadas por Cormacarena y la Fundación Omacha en las cuencas de los ríos Guayabero y Losada.

Figura 8. Río Guayabero, Raudal Angosturas I, La Macarena, Meta. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

Figura 9. Actividades ganaderas inadecuadas realizadas en inmediaciones de la ribera del río Guayabero, La Macarena, Meta. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

Para ello, se está haciendo la capacitación en observación responsable de delfines dirigido a operadores turísticos, estudiantes y autoridades ambientales y policiales, con base en la información de las dos expedi-

ciones científicas realizadas entre 2016 y 2018. Estas acciones se encuentran consignadas en el Plan de manejo de los delfines de río en el área de jurisdicción de Cormacarena (Mosquera-Guerra *et al.* 2016).

La categoría nacional de amenaza para *Inia geoffrensis* es Vulnerable (VU) (Trujillo *et al.* 2006). A pesar de estas categoría, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) había adoptado una clasificación diferente a nivel internacional, y todas las especies de delfines de río suramericanos estaban consideradas como Datos Insuficientes (DD) (IUCN 2018, Trujillo *et al.* 2010), desde 2017 se revaluó la categoría para *Inia geoffrensis* y se elevó en En Peligro (EN).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta investigación aporta información valiosa, describiendo la importancia de los diferentes tipos de hábitats acuáticos en la ecología de los delfines durante los períodos de aguas en descenso y ascenso, en los ríos Guayabero, Losada y caño Yarumales. Las confluencias constituyen los hábitats más importantes para *I. g. humboldtiana* en la cuenca del río Guayabero, siendo este tipo de hábitat uno de los de mayor importancia para los delfines, lugar donde realizan actividades como la alimentación, socialización, reproducción y crianza.

BIBLIOGRAFÍA

- Buckland, S. T., D. R. Anderson, K. P. Burnham y J. L. Laake. 2001. Introduction to Distance sampling: Estimating abundance of biological populations. *Oxford University Press*, New York, NY.
- Burnham, K. P y D. R. Anderson. 2002. Model selection and multimodel inference: A practical information-theoretic approach. *Springer-Verlag*, New York, NY.
- Caballero, S., F. Trujillo, A. Del Risco, O. Herrera y A. Ferrer. 2017. Genetic identity of *Sotalia* dolphins from the Orinoco River. *Marine Mammal Science* DOI: 10.1111/mms.12422

Se evidencia la importancia de los procesos geomorfológicos asociados al río Guayabero en las inmediaciones de la sierra de La Macarena, dada la delimitación de la distribución más occidental y altitudinalmente más elevada para *I. g. humboldtiana* en la cuenca del Orinoco. Esto confirma la importancia biogeográfica de estas formaciones en los procesos vicariantes de especiación para el género *Inia*.

En consecuencia, se propone el uso de los delfines de río como una herramienta valiosa, al ser empleados como especies sombrilla en las diferentes iniciativas de conservación para el área de manejo especial o como indicadores del estado de salud de los ecosistemas acuáticos asociados al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.

Se sugiere fortalecer el proceso de educación ambiental en aspectos como buenas prácticas de pesca, uso de combustibles y motores fuera de borda. Fundamental incluir especialmente a los pescadores y motoristas en estos procesos, e igualmente capacitarlos en observación responsable de los delfines. Por último, y no por ello menos importante, sería clave fomentar el estudio del movimiento y uso de hábitat de esta población a través de toda la cuenca empleando telemetría satelital.

- Carvajal-Castro, J. D., T. Velásquez-Roa, H. Mantilla-Meluk, F. Trujillo y F. Mosquera-Guerra. 2015. Modelación de nicho y aspectos biogeográficos del género *Sotalia* (Cetartiodactyla: Delphinidae) en los ríos Amazonas y Orinoco, Colombia. *Momentos de Ciencia*. 12 (2): 121-125.
- Gómez, C., F. Trujillo, M. Portocarrero-Aya y H. Whitehead. 2011. Population, density estimates, and conservation of river dolphins (*Inia* and *Sotalia*) in the Amazon and Orinoco river basins. *Marine Mammal Science* DOI: 10.1111/j.1748-7692.2011.00496.x

- Gómez-Salazar, C., F. Trujillo y H. Whitehead. 2011a. Ecological factors influencing groups sizes of river dolphins (*Inia* and *Sotalia*). *Marine Mammal Science* DOI: 10.1111/j.1748-7692.2011.00496.
- Gravena, W., P. F. Izeni, M. N. F. Da Silva, V. M. F. Da Silva y T. Hrbek. 2014. Looking to past and the future: were the Madeira River rapids a geographical barrier to the boto (Cetacea: Iniidae)?. *Conservation Genetics* 15: 619-629. DOI 10.1007/S10592-014-0565-4
- Hrbek, T., V. M. F. da Silva, N. Dutra, W. Gravena, A. R. Martin y I. P. Farias. 2014. A new species of river dolphin from Brazil or: how little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* 9 (1): e83623. doi:10.1371/journal.pone.0083623
- Lasso, C. A., G. Colonnello y A. Rial. 2014. Ríos de aguas blancas. Pp. 226-229. En: Lasso, C. A., A. Rial. G. Colonnello y F. Trujillo (Eds.). XI. *Humedales de la Orinoquia (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Mosquera-Guerra F., C. Parra, F. Trujillo, A. M. Jiménez-Ortega y H. Mantilla-Meluk. 2015. Valoración estacional de las amenazas contra la conservación de *Inia geoffrensis humboldtiana* (Cetartiodactyla Iniidae) en la cuenca del río Meta, Colombia. *Therya* 6 (2): 371-388.
- Mosquera-Guerra F., F. Trujillo, M. C. Díaz-Granados y H. Mantilla Meluk. 2015a. Conservación de delfines de río (*Inia geoffrensis* y *Sotalia fluviatilis*) en los ecosistemas acuáticos de la Amazonia y Orinoquia en Colombia. *Momentos de Ciencia* 12 (2): 77-86. ISSN 1692-5491.
- Mosquera-Guerra F., F. Trujillo, D. Caicedo-Herrera y S. Martínez-Callejas. 2015b. Indicadores de biomagnificación de Mercurio total (Hg) en las especies del género *Inia* (Cetartiodactyla: Iniidae) en los ríos Amazonas y Orinoco (Colombia). *Momentos de Ciencia* 12 (2): 145-149.
- Mosquera-Guerra, F., F. Trujillo, D. Caicedo-Herrera, J. Zoque-Cancelado y H. Mantilla Meluk. 2015c. Impactos de las pesquerías de *Calophysus macropterus* un riesgo para la salud pública y la conservación de los delfines de río en Colombia. *Momentos de Ciencia* 12 (2): 88-99.
- Mosquera-Guerra, F., F. Trujillo, B. Barrera y E. Sánchez (Eds.). 2016. Plan de manejo de los delfines de río en el área de jurisdicción de Cormacarena. Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena -Cormacarena-, Villavicencio, Meta y la Fundación Omacha. Bogotá, D. C., Colombia. 64 pp.
- Pavanato, H. J., G. Melo-Santos, D. S. Lima, M. Portocarrero-Aya, M. Paschoalini, F. Mosquera, F. Trujillo, R. Meneses, M. Marmontel y C. Maretti. 2016. Risks of dam construction for South American river dolphins: a case study of the Tapajós River. *Endangered Species Research* 31: 47-60.
- Rosas, F. C. W y K. L. Kesä. 1996. Nutritional and mercury content of milk of the Amazon river dolphin, *Inia geoffrensis*. *Comparative Biochemistry & Physiology* 115A (2): 117-119.
- Salinas, C., J. C. Cubillos, R. Gómez, F. Trujillo y S. Caballero. 2013. Pig in a poke (gato por liebre): The mota (*Calophysus macropterus*) Fishery, Molecular Evidence of Commercialization in Colombia and Toxicological Analyses. *Eco-Health* DOI: 10.1007/s10393-013-0893-8.
- Smith, B. 1993. Status and conservation of the Ganges River dolphin *Platanista gangetica* in the Karnali River, Nepal. *Biological Conservation* 66: 159-169.
- Thomas, L., S. T. Buckland., K. P. Burnham., D. R. Anderson., J. L. Laake, D. L. Borchers y S. Strindberg. 2002. Distance sampling. *Encyclopedia of Environmetrics* 1:544-552.
- Thomas, L., B. S. T. Buckland, E. A. Rexstad, J. L. Laake, S. Strindberg, S. Hedley, J. R. B. Bishop, T. Marques y K. P. Burnham. 2010. Distance software: Design and analysis of distance sampling surveys for estimating population size. *Journal of Applied Ecology* 47:5-14.
- Trujillo, F. 1997. The development of a research methodology to study the behaviour and the ecology of the fresh water dolphins *Inia*

- geoffrensis* and *Sotalia fluviatilis* in Colombian amazon. 1997. Tesis de MSc. Universidad de Greenwich, London. 125 pp.
- Trujillo, F. 2000. Habitat use and social behavior of freshwater dolphin *Inia geoffrensis* (de Blunville, 1817) in the Amazon and Orinoco basins. Ph.D. Thesis. Aberdeen University, Scotland.
- Trujillo, F., C. A. Lasso, M. C. Diazgranado, O. Farina, L. E. Pérez, A. Barbarino y M. González. 2005. Evaluación de la contaminación por mercurio en peces de interés comercial y de la concentración de organoclorados y organofos-forados en el agua y sedimentos de la Orinoquia. Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. 191 pp.
- Trujillo, F. y M. C. Diazgranados. 2004. Variación estacional en el uso del hábitat del delfín de río, *Inia geoffrensis humboldtiana*, en la Orinoquia Colombiana. Pp. 27-40. En: Diazgranados, M. C. y F. Trujillo (Eds.). *Fauna Acuática de la Orinoquia Colombiana*. Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D. C., Colombia.
- Trujillo, F., M. C. Diazgranados, A. Galindo y L. Fuentes. 2006. Delfín rosado, *Inia geoffrensis*. Pp. 433. En: Rodríguez- M., J. V., M. Alberico, F. Trujillo y J. Jorgenson (Eds.). 2006. *Libro Rojo de los mamíferos de Colombia*. Serie de Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Conservación Internacional Colombia y Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. Bogotá, D. C., Colombia. 433.
- Trujillo, F., E. Crespo, P. van Dammey S. Usma. 2010. The Action Plan for South American River Dolphins 2010-2020. WWF, WCS, WDSCS, Solamac, Fundación Omacha. 249 pp.
- Trujillo F. y M. C. Diazgranados. 2012. Delfines de río. Embajadores de la conservación en la Amazonia y Orinoquia. Fundación Omacha-CEPCOLSA. Bogotá, D. C., Colombia. 144 pp.
- Trujillo F., M.C. Diazgranados, C. Gómez-Salazar, M. Portocarrero, D. Caicedo, Cabañero, S. y M. Morales. 2013. Mamíferos acuáticos de la región Amazonia y Orinoquia. Pp. 60-93. En: Trujillo, F., A. Gärtner, D. Caicedo y M. C. Diazgranados (Eds.). 2013. *Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fundación Omacha, Conservación Internacional y WWF. Bogotá, D. C., Colombia.
- Trujillo, F., D. Caicedo y M. C. Diazgranados (Eds.). 2014. Plan de acción nacional para la conservación de los mamíferos acuáticos de Colombia (PAN mamíferos Colombia). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fundación Omacha, Conservación Internacional y WWF Bogotá, D. C., Colombia. 54 pp.
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN. 2018. <http://www.iucnredlist.org/details/10831/0>
- Ultreras, V., F. Trujillo y J. S. Usma. 2013. Plan de acción para la conservación de los mamíferos acuáticos de la Amazonía ecuatoriana. Ministerio del Ambiente, Wildlife Conservation Society, Fundación Omacha, World Wildlife Fund. Quito. 72 pp.
- Williams, R., J. E. Moore, C. Gómez-Salazar, F. Trujillo y L. Burt. 2016. Searching 438 for trends in river dolphin abundance: Designing surveys for looming threats, and 439 evidence for opposing trends of two species in the Colombian Amazon. *Biological Conservation* 195:136-145.

Río Guayabero, Cajón del Raudal de Angosturas I. Foto: Jorge E. García-Melo.

Mico ardilla (*Saimiri casiquiarensis*). Foto: Sasha Cárdenas.

Abundancia de primates diurnos y otros elementos de fauna en el Parque Nacional Natural Tinigua, sierra de La Macarena, Meta, Colombia: comparación de métodos y variación anual en los años 1990

Pablo R. Stevenson

Resumen. Datos sobre cambios en abundancia poblacional ayudan a conocer el estatus de conservación de las especies. El objetivo del trabajo fue analizar datos de abundancia poblacional de mamíferos y algunas aves de gran tamaño en el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena, para identificar especies dominantes, y documentar cambios temporales y preferencias de hábitat para las especies más abundantes. Estos datos fueron colectados en tres años de la década del noventa, con tres versiones del método de transectos lineales; y para un año, comparados con el método de tamaño de grupo y rangos de hogar. Los churucos (*Lagothrix lagothricha*) fueron los más abundantes, seguidos por otros primates (*Ateles belzebuth*, *Sapajus apella* y *Alouatta seniculus*). Los saínos (*Pecari tajacu*) fueron los mamíferos terrestres más abundantes, mientras que en aves fueron dos especies de pajiños (*Crax alector* y *Mitu salvini*). No se encontraron grandes diferencias temporales, aunque los saínos disminuyeron y los tintines aumentaron. Las ardillas (*Sciurus igniventris*) y los aulladores presentaron mayor densidad en bosques de dosel abierto. Las dantas, pajiños y pavas cuyuyas presentaron mayor densidad en planos de inundación. El método informal de transectos lineales fue más adecuado que el de transectos sistemáticos, por lograr mayor esfuerzo de muestreo.

Palabras clave. Abundancia poblacional. Aves de gran tamaño. Censos por transectos lineales. Mamíferos arbóreos y terrestres.

Abstract. Information on changes in density over time is needed to evaluate the conservation status of populations. The aim of this study was to analyze density estimates of diurnal mammals and some large birds in Tinigua Park (Colombia), to determine dominant species, and assess temporal changes and habitat preference for the common species. Data was taken using three variants of the line transect method in three years between 1990 and 2000, and for one year, estimates based on group size and home range were compared. Woolly monkeys were the most common, followed by other primates (brown capuchins, spider and howler monkeys), collard

Stevenson, P. R. 2018. Abundancia de primates diurnos y otros elementos de fauna en el Parque Nacional Natural Tinigua, sierra de La Macarena, Meta, Colombia: comparación de métodos y variación anual en los años 1990. Pp. 307-329. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

peccaries were the most abundant terrestrial mammals, while two curassows (*Craux alleator* and *Mitu salvini*) were the most common bird species. I did not find large differences in density estimates along time; however, peccaries decreased and green acouchis increased though time. The red squirrels (*Sciurus igniventris*) and red howler monkeys showed higher densities in open-canopy *terra-firme* forests. Tapirs and curassows preferred floodplains. An informal variant of the line transect method (using trails without predetermined order) showed the most similar result to the estimate on group and home range size, probably because of the large sampling effort.

Keywords. Arboreal and terrestrial mammals. Censuses by line transects. Large forest birds. Relative population abundance.

INTRODUCCIÓN

Estudios de tasas de deforestación en alta resolución han indicado una pérdida total de bosques en el planeta de 2,3 millones de km² entre los años 2000 y 2012, siendo los bosques tropicales los que muestran una tasa continua de alta deforestación (2101 km² deforestados anualmente) (Hansen *et al.* 2013). Estas altas tasas de deforestación en bosques tropicales pueden generar una pérdida importante de la biodiversidad para muchos grupos de organismos (Brook *et al.* 2003), lo que está influenciado por efectos de pérdida de área en el hábitat natural, fragmentación, cambio climático y otros tipos de modificaciones en las interacciones ecológicas (Brook *et al.* 2008, Krauss *et al.* 2010, Estes *et al.* 2011). La pérdida de especies o incluso la disminución en densidades poblacionales puede tener fuertes consecuencias en el funcionamiento de los bosques (Şekercioğlu *et al.* 2004, Stevenson 2011), con efectos que incluso pueden poner en peligro la vida humana (Cardinale *et al.* 2010, Díaz *et al.* 2016).

Para evitar estas consecuencias, una de las principales herramientas utilizadas es la creación/declaración de áreas protegidas de tipo gubernamental o privado, sin embargo, incluso teniendo en cuenta estas zonas de reserva, la cantidad de especies en peligro de extinción es muy alta (ter Steege *et al.* 2015). Por ejemplo, se estima que el 61% de las especies de primates están catalogadas con algún peligro de extinción (Estrada *et al.* 2017). Parte de esto se debe a que estas

áreas protegidas no son suficientemente amplias y numerosas, y no siempre son efectivas para disminuir los efectos de deforestación y otros efectos que disminuyen la diversidad, como la cacería de fauna (Peres y Palacios 2007). Así, actualmente factores como pérdida de hábitat, sobre-explotación, cambio climático, y fuegos pueden generar disminuciones considerables en las poblaciones naturales y ser las principales causas de pérdida de biodiversidad (Brook *et al.* 2008). Es importante tener en cuenta que generalmente estos factores se derivan directa o indirectamente de la densidad de las poblaciones humanas y por sus requerimientos (Estrada 2013). También suelen actuar sinérgicamente, por ejemplo, es más fácil llevar a la extinción una población por cacería, cuando los últimos individuos se encuentran en fragmentos pequeños. Dentro de los elementos que suelen estar asociados a la extinción de poblaciones animales están los grandes tamaños corporales, edades reproductivas elevadas, las tasas reproductivas lentas, cacería por humanos y tamaños poblacionales bajos (Cardillo *et al.* 2008).

Por esto, el conocimiento y monitoreo de los tamaños poblacionales de las especies en peligro es relevante para generar planes de acción y evitar pérdidas irrevocables de diversidad. A pesar de esto, no son muchos los casos en los que se tenga información de largo plazo sobre los tamaños poblacionales y donde se analicen las causas de esa variación (p. e. Chapman *et al.* 2018). Aunque este

tipo de datos son ideales para conocer las tendencias del cambio poblacional, también datos de un período corto de tiempo pueden ser de gran interés y han sido ampliamente utilizados para entender la composición de las comunidades. Por ejemplo, a partir de datos puntuales de densidad poblacional de primates se han logrado establecer los lugares de mayor diversidad, el efecto de disturbios y la importancia de la fertilidad de suelos y productividad de frutos determinando la abundancia de los ensamblajes de primates Neotropicales (Peres y Janson 1999, Peres 1999a, Stevenson 2001, 2016).

La estimación de las densidades poblacionales en animales suele tener bastante incertidumbre, dado que la cantidad de individuos en un área determinada suele cambiar en el tiempo y el espacio (dadas sus capacidades de movimiento). Esto implica que los estimativos deben hacerse a escalas espaciales adecuadas (generalmente muestrear un área grande y homogénea debería presentar menos variación en los estimativos) y de todas formas suelen presentar alta variación. El método más frecuentemente utilizado para cuantificar la abundancia de primates y otras especies de fauna en bosques tropicales es el de censos por transectos lineales (Peres 1999b, Buckland 2010). La idea básica de este método es que si se trazan zonas de muestreo (idealmente líneas rectas ubicadas aleatoriamente), el o los observadores pueden detectar distintos elementos de fauna durante un recorrido a baja velocidad (ej. 1 km. hr⁻¹). El observador registra el número de individuos o de grupos a lo largo del recorrido, y en el momento de cada encuentro, se toman datos sobre la especie observada, individuos (en el caso de grupos o subgrupos), y distancia horizontal del individuo al transecto (usualmente a partir del ángulo y distancia animal-observador) (Anderson 1979). De esta forma se calculan las densidades a partir del número de individuos observados en un área determinada (el largo del transecto pre-establecido y dos veces el ancho efectivo de observaciones). Este ancho, usualmente se establece a partir de los registros de distancias perpendicu-

lares de observación, como un compromiso, si el número de animales que están más lejos de la distancia efectiva y que son registrados es igual al número de los que están más cerca de esa distancia y no son detectados (Stevenson 1996). Por ejemplo, si al graficar la frecuencia de distancias perpendiculares contra la distancia resulta en una disminución gradual, es adecuado utilizar el promedio como ancho efectivo. Para otro tipo de funciones, se pueden evaluar varios modelos (p. e. funciones trigonométricas, series de Fourier) y también hay varios programas que pueden evaluar modelos y generar pautas para escoger el más adecuado (p. e. "Distance"). Sin embargo, el uso de estos acercamientos también depende de lograr un número adecuado de muestras. Por otra parte, para primates se ha propuesto que un gran método para cuantificar densidades poblacionales es conocer el tamaño de grupo, rango de hogar y patrones de superposición de los rangos (NRC 1981). Sin embargo, este tipo de aproximación requiere de información ecológica que no es fácil de conseguir, y en ocasiones datos precisos de tamaño de grupo y rango de hogar pueden ser complicados de obtener para algunas especies en ciertos contextos ecológicos (García *et al.* 2018).

El Parque Nacional Tinigua se estableció en el año 1989, en parte con miras a generar un amplio corredor biológico entre los bosques amazónicos y los bosques andinos (Garcés y De La Cerda 1994). Gran parte de los mamíferos de la región se incluyen en una guía ilustrada, cuya información proviene principalmente de datos tomados por investigadores en otras localidades neotropicales (Cabrera y Molano 1995). El conocimiento científico de su fauna ha estado sesgado a estudios en comportamiento y ecología de primates, debido a un convenio de investigación entre la Universidad de Los Andes y primatólogos japoneses. Este proyecto incluyó el establecimiento de varios campamentos para estudios de campo, hoy conocidos como el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM), que generaron más

de cien publicaciones científicas (Mojica-Valencia 2018). De este mismo lugar de estudio, se inspiró un libro sobre la Fauna de la Macarena, que incluye fotos de muchas especies y explicaciones sobre sus estrategias ecológicas (Mejía 1995). En cuanto a estimaciones de densidad, se cuenta con un trabajo en el que se utilizaron dos métodos de estimación a partir de una modificación de los tradicionales transectos lineales y para los primates más abundantes y conocidos, se realizaron aproximaciones a partir de datos de tamaños grupales y rangos de hogar (Stevenson 1996). En este estudio los transectos no tuvieron una longitud fija, y aunque se desarrollaron en trochas que fueron pre-establecidas y de longitud conocida, sus recorridos no tuvieron una rotación sistemática. De esta manera se generó información de densidades poblacionales de primates, otros mamíferos diurnos y algunas aves de gran tamaño, donde resultó evidente la dominancia de los micos churucos (*Lagothrix lagothricha*) en la zona de estudio, además de una alta diversidad y abundancia de otras especies.

Datos de censos similares por transectos, fueron colectados en dos estudios de un año de duración en el CIEM (Stevenson 2002), pero estos datos no fueron analizados en términos temporales. En la actualidad, existe la expectativa de volver a realizar trabajos de campo en este lugar y el principal objetivo de este trabajo es presentar la información de los estimativos de densidad, que quizás puedan servir de línea base para comparar con datos del futuro. En particular, las preguntas de investigación que se plantean para este trabajo son: 1) ¿Cuál es el efecto de realizar censos por transectos lineales bien definidos en comparación con transectos extensos y no pre-establecidos?; 2) ¿Cuáles son los mamíferos y aves diurnas que tuvieron mayores estimativos de densidad en el área de estudio?; 3) ¿Existió una tendencia de aumento o disminución poblacional durante la década de 1990?; y 4) ¿Qué especies tienen preferencias de hábitat de acuerdo a los estimativos de densidad?

MÉTODOS

Área de estudio

El trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM), en una zona del margen occidental del río Duda, a aproximadamente 12 km de su desembocadura en el río Guayabero, al interior del PNN Tinigua (Figura 1). Allí se ubicaron tres estaciones de investigación denominadas Puerto Agujo, Puerto Paujil y Puerto Chamuza, en donde el sistema de trochas utilizado (ca. 15 km. de largo) fue el de las dos últimas, con un centro de actividades en 02°37'3.4"N-74°02'8.8"O. Los caminos en este sistema están marcados cada 25 m y se distribuyen en una zona de topografía quebrada de cerca de 4 km² y en algunas zonas planas creadas recientemente por la sedimentación del Río Duda (Stevenson 2002).

El patrón de lluvias es estacional en la región, con un período de 1-3 meses secos al año, que suelen ocurrir entre diciembre y marzo. El promedio de precipitación en los años de estudio (marzo 1990-febrero 1991, agosto 1996-julio 1997, y todo el 2000) fue de 2.782 mm y la temperatura media de 25.4°C (Stevenson 2002). Los suelos del área de estudio tienen diferentes orígenes geológicos, incluyendo formas relativamente planas en las orillas del río Duda que fueron formadas en el Holoceno por la acumulación de sedimentos en la dinámica usual de los ríos meándricos de aguas blancas (Botero 1998). Estos suelos son menos ricos en nutrientes, que los de las zonas altas o de tierra firme (Flechas y Stevenson 2018). Los suelos de las terrazas altas de tierra firme son de origen complejo, con algunos componentes sedimentados durante el período Terciario y otros del Cuaternario temprano (Botero op. cit). Estas placas han sido erosionadas por los cursos de agua, que forman pequeños caños meándricos o valles estrechos, que son la causa de la topografía ondulada en los bosques de tierra firme y por su origen con el levantamiento de la cordillera Oriental, son relativamente jóvenes y más fértiles que la mayoría de los suelos en la Amazonia central (Botero op. cit.).

Figura 1. Ubicación general del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena en el contexto regional. Mapa realizado por: Christian Medina, Laboratorio de Cartografía (Universidad de los Andes).

Se reconocen dos tipos principales de bosque: los de tierra firme que no se inundan por los ríos cuando hay crecientes (por su elevada ubicación topográfica) y los planos de inundación. Los bosques de tierra firme a su vez se han dividido en dos tipos principales, los de dosel cerrado (principalmente en los filos y partes altas relativamente planas) y los de dosel abierto (cerca de caños grandes y frentes de erosión) (Stevenson 2002). En los planos de inundación también se tienen unas zonas de dique, ligeramente más elevadas topográficamente y que sufren inundaciones muy esporádicas, y otras más bajas (bacines), que pueden permanecer inundadas por varios meses todos los años. Las diferencias más grandes en composición florística están entre los planos de inundación estacionalmente indudables y los de

tierra firme (Stevenson 2002). En contraste, las plantas de bosques de dosel abierto y dosel cerrado tienden a ser más similares.

Transectos lineales

Para cuantificar las densidades poblacionales para los mamíferos diurnos y aves grandes, se utilizó una variante del método de transectos lineales (similar a Glanz 1991), durante tres ciclos anuales. Se estimaron las densidades a partir del número de individuos a lo largo de trochas de longitud conocida, y se estimó el ancho a partir de mediciones perpendiculares de detección según el método de King. Para el primer ciclo (mayo 1990-abril 1991), se utilizó un tamaño de muestra pequeño de distancias de detección (Stevenson 1996). Por esta razón, las

distancias animal-observador y la perpendicular entre el animal y el transecto fueron estimadas visualmente (p. e. Chapman *et al.* 2002), en dos años subsecuentes y los resultados de densidad del primer año fueron recalculados para cada especie de acuerdo a los nuevos datos (asumiendo que no han cambiado a lo largo del tiempo, cuando no hubo grandes alteraciones a la estructura del bosque).

En total durante el estudio se recorrieron 3.670 km en los senderos. Se utilizaron 3.015 km para efectos de censos de mamíferos, ya que se excluyeron los casos en que se repetía un sendero en menos de una hora, o cuando se adecuaban las trochas. Para abundancia de primates, se utilizó 1.365 km, cuando la tarea no era usar las trochas para buscar grupos de micos para su estudio. Para el primer ciclo de estudio, también se calculó la densidad poblacional de cuatro especies de primates, a partir de datos del tamaño de varios grupos y sus respectivas áreas de rango de hogar y sobreposición (Stevenson 1996). En este trabajo, se comparan estos datos que usualmente son considerados como muy precisos (NRI 1981, Hassel-Finnegan *et al.* 2008), con los estimativos de transectos basados en unos estimativos más robustos de distancia perpendicular y con un subgrupo de los datos en los que se recorrieron transectos particulares cuatro veces por mes. La longitud media de estos transectos fue de 3 km, e incluyeron bosques de dosel cerrado, abierto, planos de inundación y un pequeño parche de bosque secundario. Adicionalmente, se estimó la densidad para estos distintos tipos de bosque, con el propósito de inferir preferencias en el uso del hábitat.

Pruebas estadísticas

Para comparar la densidad de las cuatro especies de primates más abundantes, se utilizó una prueba de χ^2 , para verificar si los transectos no estandarizados y planificados diferían de los estimativos generados a partir de tamaño y rango de hogar. Adicionalmente, se utilizó una prueba T pareada

para determinar si los datos de los dos tipos de muestreo eran significativamente más variables, de acuerdo al porcentaje de variación en el estimativo de densidad (Sokal y Rohlf 1995). Para determinar tendencias temporales se realizó una prueba ANOVA entre los tres ciclos anuales de muestreo y teniendo como unidades de muestreo los estimativos mensuales de densidad de especies (para todas las frecuentes en los muestreos). De manera similar se analizaron las preferencias de hábitat, a partir de una prueba ANOVA entre los estimativos mensuales de densidad para cada uno de los cuatro principales tipos de bosque.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron 32 especies de mamíferos en los trayectos, representando ocho ordenes diferentes (Tabla 1, Anexo 1) y se cuantificaron las densidades poblacionales de seis especies de aves de gran tamaño (Anexo 1). El orden de mamíferos con más especies corresponde a Carnívora con nueve especies, seguido por Primates con siete especies. En ambos casos se registraron especies que pueden tener actividad nocturna, pero que fueron observados en recorridos diurnos (p. e. *Aotus cf. brumbacki* y *Puma concolor*).

Comparación de métodos

Los estimativos basados en tamaños grupales, rangos de hogar y sobreposición, no difieren de los de los transectos utilizando todos los recorridos ($\chi^2 = 1,1$; $p = 0,78$), pero si de los transectos más sistemáticos ($\chi^2 = 16,8$; $p = 0,001$). Por otra parte, al analizar el porcentaje de variación en el estimativo de densidad poblacional, una prueba de T pareada, indicó que hay más variación en los datos de los transectos sistemáticos, que en los de transectos totales (% de variación promedio de 126 vs. 103, $t = -3,1$; $p = 0,01$). El hecho de agrupar los transectos y analizarlos en unidades de 10 km, tampoco disminuyó considerablemente la variación (% de variación = 149), aunque si arrojó resultados más cercanos a los encontrados con el

Tabla 1. Especies de mamíferos encontrados en transectos recorridos en el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena-CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia). * Especies principalmente nocturnas. Fotos en el anexo 1.

Orden	Nombre Científico	Nombre común
Pilosa	<i>Choloepus didactylus</i>	Perezoso de dos dedos
	<i>Cyclopes didactylus</i>	Angelito, perezoso pigmeo
	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Oso colmenero
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Oso palmero, oso hormiguero
Cingulata	<i>Dasypus novemcinctus</i> *	Armadillo de nueve bandas
Primates	<i>Plecturocebus ornatus ornatus</i>	Mico titi, risotero
	<i>Aotus cf. brumbacki</i>	Mico nocturno, tutamono
	<i>Saimiri casiquiarensis</i>	Mono ardilla, mico titi
	<i>Sapajus apella</i>	Mico maicero
	<i>Alouatta seniculus</i>	Mico aullador
	<i>Ateles belzebuth belzebuth</i>	Marimba, mico araña
	<i>Lagothrix lagothricha lugens</i>	Churuco, mico barrigudo
Carnivora	<i>Nasua nasua</i>	Cusumbo, coatí suramericano
	<i>Speothos venaticus</i>	Perro vinagrero
	<i>Potos flavus</i> *	Kinkajou, marteja
	<i>Galictis vitata</i>	Hurón
	<i>Eira barbara</i>	Zorra ulamá
	<i>Puma yagouarundi</i>	Jaguarundi
	<i>Leopardus pardalis</i>	Tigrillo, ocelote
	<i>Puma concolor</i>	León sin melena, puma
	<i>Panthera onca</i>	Jaguar, tigre mariposo
Artiodactyla	<i>Pecari tajacu</i>	Saino de collar
	<i>Mazama americana</i>	Venado rojo
	<i>Mazama gouazoubira</i>	Venado gris
Perissodactyla	<i>Tapirus terrestris</i>	Danta, tapir
Rodentia	<i>Sciurus igniventris</i>	Ardilla roja
	<i>Myoprocta pratti</i>	Tintín verde
	<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Chigüiro, capibara
	<i>Dasypsecta fuliginosa</i>	Guara, agutí negro
	<i>Cuniculus paca</i> *	Borugo, paca
	<i>Coendu prehensilis</i> *	Puercoespín
Lagomorpha	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> *	Conejo brasileiro

método de tamaños y rangos de hogar ($\chi^2 = 6,9$; $p = 0,07$) (Tabla 2). Todo esto sugiere, que los resultados más adecuados son los que provienen de un esfuerzo de muestreo muy alto, independiente de si las observaciones se hagan o no sistemáticamente por los mismos transectos. Por esta razón, los siguientes análisis, se basan en los muestreos realizados sobre diferentes trochas.

A pesar de que el método de tamaño de hogar y rangos se suele tomar como el mejor, es importante mencionar que estos estimativos (especialmente el de rango de hogar), suelen depender del tamaño de la muestra. Por ejemplo, para el caso de los churucos, el tamaño del rango de hogar para el año 1990-91 fue estimado de 169 ha (Stevenson *et al.* 1994). Sin embargo, al aumentar el tamaño de muestreo se encontró que este mismo grupo utilizó cerca de 200 ha (Stevenson 2002) y este tipo de aspectos pueden tener implicaciones fuertes sobre estos estimativos, por afectar el tamaño y grado de sobreposición con otros grupos. Es decir, que de cualquier forma los estimativos de densidad poblacional con los métodos utilizados parecen tener una variabilidad inherente, y por eso la precisión no es alta.

Estimativos de densidad

Dentro de los mamíferos, los primates representados por siete especies, fueron los más frecuentes en términos de densidad.

Los churucos fueron los más abundantes dentro de este grupo (Tabla 3), mientras que las marimbas, maiceros y aulladores también presentan densidades altas (pero no tanto como los churucos). Los monos ardilla presentan densidades intermedias y los titíes risoteros fueron los que presentaron las más bajas densidades.

Una dominancia por parte de churucos también ha sido observada en otros lugares en el departamento de Guaviare, donde incluso en fragmentos logran tener unas densidades similares a las encontradas en Tinigua (ca. 50 individuos. km^{-2}) (Zárate y Stevenson 2014). Sin embargo, en zonas de Amazonia central, incluso en lugares muy poco intervenidos, sus densidades son bajas (Palacios y Peres 2004). No es frecuente encontrar a los micos churucos y las marimbas viviendo juntas y en densidades relativamente altas, y esto se ha explicado por una alta tasa de productividad de frutos en esta zona del parque Tinigua (ver p. e. Stevenson 2016). De esta manera, la alta abundancia de estos primates grandes se ha explicado debido a la alta producción de frutos, lo que puede estar asociado a unos suelos relativamente ricos en nutrientes cerca del piedemonte (Stevenson 2014), y quizás porque en estas condiciones la calidad de las hojas también tiende a ser mayor (Flechas y Stevenson 2018).

Dentro de los mamíferos terrestres, los saínos son los más comunes en la zona de estudio, aunque cusumbos, venados, guaras

Tabla 2. Comparación de densidades poblacionales (individuos. km^{-2}) para los primates más abundantes del CIEM durante un ciclo anual (mayo 1990-abril 1991). NRC (1981) sugiere que el método basado en tamaño de grupo y rango de hogar (Rangos) es el más preciso. Para el método de transectos no sistematizados (Total transectos), el de sistematizados (Transectos sistemáticos) y el de acumulación en 10 km, se calcula el χ^2 , como comparación con respecto al de tamaños grupales y rango de hogar.

Especie	Rangos	Total transectos	Transectos sistemáticos	Individuos/10 km
<i>Sapajus apella</i>	24	22	8	19
<i>Alouatta seniculus</i>	18	15	8	10
<i>Ateles belzebuth</i>	18	16	15	11
<i>Lagothrix lagothricha</i>	30	30	31	31
χ^2		1,1	16,8*	6,9

y tintines también se observaron frecuentemente (Tabla 4). Para estos casos, es posible que los valores de densidad poblacional estén subestimados, dado que estos animales suelen huir para evitar la proximidad de observadores, y por lo tanto algunos individuos pueden pasar desapercibidos en los recorridos. Además, a excepción de unos grupos de pajiiles (aves) que fueron habituados a la observación, casi todos los otros mamíferos terrestres evitan la presencia de humanos.

Dentro de las aves mayormente registradas en los transectos estuvieron las especies de pajiiles diurnos (*Mitu salvini* y *Crax alector*) (Anexo 1), que fueron especies que fueron habituadas a presencia humana y durante los muestreos no huían de la presencia de observadores. Otras especies registradas con alta frecuencia fueron trompeteros (*Psophia crepitans*) (Anexo 1) y las pavas carrozas (*Penelope jacquacu*) y cuyuyas (*Pipile cumanensis*) (Anexo 1) (Tabla 5).

Tabla 3. Densidad poblacional (individuos. km⁻²) para las especies más comunes de primates del CIEM, como promedios ponderados de las densidades en cuatro tipos de vegetación. Se muestran también la longitud y el ancho del transecto para cada especie, y los errores estándar a partir de los promedios mensuales.

Año	Muestra (km)	<i>Lagothrix lagotherica</i>	<i>Ateles belzebuth</i>	<i>Sapajus apella</i>	<i>Saimiri sciureus</i>	<i>Alouatta seniculus</i>
1990-91	349	30 ± 5	18 ± 2	22 ± 3	10 ± 4	15 ± 3
1996-97	482	30 ± 3	18 ± 3	18 ± 3	7 ± 2	12 ± 2
2000	534	44 ± 8	20 ± 4	25 ± 6	10 ± 2	20 ± 4
Ancho (m)		14,7 x 2	12,7 x 2	14,2 x 2	13,9 x 2	11,2 x 2

Tabla 4. Densidades poblacionales (individuos. km⁻²) estimadas para algunas especies de mamíferos comunes en el CIEM, a partir de promedios ponderados de las densidades en cuatro tipos diferentes de vegetación.

Año	Muestra (km)	<i>Pecari tajacu</i>	<i>Mazama americana</i>	<i>Mazama gouazoubira</i>	<i>Nasua nasua</i>	<i>Myoprocta pratti</i>	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Sciurus igniventris</i>
1990	821	20,4 ± 14	1,1 ± 1,8	0,4 ± 2	2,3 ± 3,8	1,8 ± 3,0	2,9 ± 3,4	0,3 ± 0,2	2,0 ± 0,9
1996	482	2,5 ± 4	1,8 ± 2	0,5 ± 1	1,7 ± 6	4,1 ± 3	1,6 ± 2	0,4 ± 1	1,8 ± 1
2000	534	4,0 ± 0,9	0,8 ± 0,4	0,2 ± 0,1	0,8 ± 0,4	7,3 ± 1,7	1,9 ± 0,6	0,2 ± 0,1	2,9 ± 0,8
Ancho (m)		5,0 x 2	9,4 x 2	16,4 x 2	11,6 x 2	7,2 x 2	7,3 x 2	17,7 x 2	7,3 x 2

Tabla 5. Densidades poblacionales (individuos. km⁻²) para algunas aves grandes del CIEM, a partir de promedios ponderados para cuatro tipos de bosques. El error estándar de los estimativos mensuales también se indica.

Año	Longitud (km)	<i>Mitu salvini</i>	<i>Crax alector</i>	<i>Penelope jacquacu</i>	<i>Psophia crepitans</i>	<i>Pipile cumanensis</i>
1990-91	349	7,4 ± 2,6	3,5 ± 0,9	1,6 ± 1,0	1,7 ± 0,9	2,8 ± 1,0
1996-97	482	5,4 ± 1,5	6,3 ± 2,0	2,7 ± 1,7	1,7 ± 1,7	5,1 ± 1,2
2000	534	5,3 ± 1,7	7,9 ± 2,4	3,9 ± 1,2	1,0 ± 0,5	2,3 ± 0,9
Ancho (m)		6,5 x 2	6,2 x 2	9,8 x 2	15,3 x 2	7,1 x 2

Cambios temporales

En el caso de los primates, se notó una tendencia al aumento poblacional de los churucos a través de los años de muestreo, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa en general ($F = 2,0$; $n = 3$; $p = 0,15$). Los dos grupos que fueron más intensivamente estudiados de churucos durante estos años, si mostraron tendencias apreciables de aumento poblacional (Stevenson y Castellanos 2001, Nishimura com. pers.). Algo similar ocurrió para los micos aulladores ($F = 1,8$; $n = 3$; $p = 0,18$). Las otras especies de primates no mostraron diferencias importantes entre años (Tabla 2). Dentro de los mamíferos terrestres, los saínos mostraron una baja significativa en sus densidades poblacionales entre 1990 y 1996 ($F = 16,5$; $n = 3$; $p < 0,001$; Figura 2a). Es bien sabido que las poblaciones de los cerdos de monte pueden tener cambios drásticos en el tiempo (Fragoso 2004, Wyatt y Silman 2004). Sin embargo, la mayoría de estos reportes provienen de la especie de labio blanco, que de hecho nunca fue vista en los transectos y desde hace algunos años es común en la zona de estudio (observaciones personales). En contraste, los tintines mostraron una tendencia de aumento ($F = 5,4$; $n = 3$; $p = 0,01$; Figura 2b) y no hay una razón evidente para explicar este incremento. De hecho,

para las guaras (que también son roedores de un tamaño un poco menor, pero con un nicho ecológico similar), no se encontró la misma tendencia. Igualmente, el resto de los mamíferos y aves registradas, no mostraron cambios consistentes en sus poblaciones.

Preferencias por tipo de bosque

Según los datos mensuales de transectos, la especie de primate con mayor diferencia en densidad entre tipos de bosque correspondió a los aulladores ($F = 3,6$; $n = 144$; $p = 0,01$). Esta especie fue observada con mayor frecuencia en bosques de tierra firme de dosel abierto (Figura 3a). La densidad más alta de los aulladores en lugares de dosel abierto, quizás se pueda entender como un efecto de competencia con los primates más grandes, ya que ellos son de los primates más bajos en la jerarquía inter-específica, y los churucos y marimbas prefieren el bosque de dosel cerrado (Stevenson *et al.* 2000). Los pocos registros para los titíes risoteros, también ocurrieron principalmente en bosques de dosel abierto ($F = 4,2$; $p = 0,008$; Figura 3b), y también pueden estar evitando competencia con primates grandes. De hecho, los más grandes (las marimbas y los churucos) mostraron una mayor densidad en bosques de dosel cerrado y en un parche de bosque

Figura 2. Densidad poblacional (individuos. km⁻²), estimada para los tres años de muestreo, para las especies que tuvieron tendencias temporales significativas en los transectos del CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia). a) *Pecari tajacu* y b) *Myoprocta pratti*.

Figura 3. Densidad poblacional (individuos. km⁻²), estimada para distintas especies de mamíferos en cuatro tipos de bosque del CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia).

secundario. En el caso de las marimbas esta diferencia fue marginal ($F = 2,6$; $p=0,05$; Figura 3c) y cercana a la significancia para churucos ($F = 2,2$; $p = 0,09$), que se vieron con más frecuencia en bosque inundable que las marimbas. Una posible hipótesis para explicar la elevada frecuencia del uso del bosque secundario por churucos -que corresponde al área de nuestro campamento-, es que era escogido con mucha frecuencia

como dormitorio y tal vez esto pueda ocurrir porque depredadores nocturnos no se acercan tanto a esta zona. Para los maiceros la mayor abundancia se registró en el bosque de plano de inundación (Figura 3d), también mostrando una diferencia cercana al límite de significancia ($F = 2,2$; $p = 0,09$). Sin embargo, en el estudio de comportamiento de Stevenson *et al.* (2000), se encontró que los maiceros utilizan el ambiente de manera

homogénea. Una posible explicación a esta discrepancia es que el estudio de dieta no tuvo en cuenta un grupo que estaba siendo provisionado en el área de estudio. Dado que el lugar de aprovisionamiento estaba ubicado al borde del plano de inundación, es posible que este dato se deba a las condiciones poco naturales de uso de hábitat de dicho grupo. Los micos ardilla mostraron densidades altas en bosques inundables y secundarios de manera similar a los maiceros, pero no se encontraron diferencias significativas ($F = 1,8$; $p = 0,15$). Estudios en otras localidades han sugerido que los monos ardilla tienen bastante preferencia por estos tipos de bosque (Peres 1999a, Carretero-Pinzón *et al.* 2017).

Las ardillas mostraron una densidad mayor en bosques de tierra firme de dosel abierto ($F = 13,9$; $n = 144$; $p < 0,001$; Figura 3e). Para ninguno de los mamíferos terrestres con un buen número de registros, se

encontró con mayor abundancia en algún tipo de bosque, a excepción de las dantas que fueron principalmente encontradas en bosques del plano inundable ($F = 6,4$; $p = 0,0004$; Figura 3f). Para los saínos, se observó una tendencia de mayor densidad en bosques de tierra firme y evitó el bosque secundario ($F = 2,5$; $p = 0,06$).

Las pavas cuyuyas ($F = 3,7$; $n = 144$; $p = 0,01$; Figura 4a), los paujiles camaranos ($F = 4,7$; $p = 0,004$; Figura 4b), los paujiles patirruccios ($F = 2,9$; $p = 0,04$; Figura 4c) mostraron ser más abundantes en bosques inundables. Estudios realizados con paujiles mostraron que estas especies pueden tener bastante uso de los planos de inundación, porque es utilizado como lugar de anidación y porque hay bastantes recursos alimenticios para ellos (p. e. frutos y semillas de bilibil (*Guarea guidonia*) (Santamaría y Franco 2000, Parra *et al.* 2001).

Figura 4. Densidad poblacional (individuos. km⁻²), estimada para distintas especies de aves en cuatro tipos de bosque del CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia).

Para esta zona de estudio, se encontró que las tasas de encuentro de fauna en los transectos es casi el doble a las primeras horas (6:00 - 7:00 h), que en el resto del día (Stevenson 1996). Dado que la mayoría de las especies detectadas no migran a otras zonas durante el día, se sugiere que la mayoría de los organismos diurnos son muy activos en buscar comida después de la noche y esta mayor actividad permite más registros (Janson y Terborgh 1986). Si esto es cierto, muchos de los estimativos que se presentan acá estarían subestimados. Sin embargo, esto es algo que posiblemente pase en otros lugares donde se emplee este método (Hassel-Finnegan *et al.* 2008), haciendo que los estimativos sean comparables con los de otros estudios e idealmente para futuro monitoreo de la zona. Análisis futuros podrían indicar diferentes estimativos, si los patrones de actividad particulares de cada especie son tenidos en cuenta. Así, debido a que los animales arbóreos habituados a la observación directa no reaccionan ante la presencia del observador, es factible que estos pasen desapercibidos cuando están descansando, lo que usualmente ocurre hacia las horas del mediodía (ver p. e. Stevenson *et al.* 1994). Por esta razón las observaciones presentes pueden estar subestimando las densidades de los animales. Sin embargo, es posible que algunas de estas diferencias en detectabilidad se puedan corregir por estimaciones menores del ancho del transecto y nuevos análisis serán necesarios para probar estas posibilidades.

La composición de la comunidad de mamíferos estudiada contiene la mayoría de los elementos que se suelen encontrar utilizando este método en otros bosques neotropicales de la Amazonia, Orinoquia o las Guayanas (Peres y Palacios 2007, de Thoisy *et al.* 2008). La mayoría de las especies encontradas tienen áreas extensas de distribución geográfica (Cabrera y Molano 1995), pero también hay especies tienen distribución restringida y por lo tanto son bastantes particulares de la zona. Por ejemplo, el tití risotero (*Plecturocebus ornatus*), es endémico del piedemonte del

Meta, pero en otras comunidades se suele encontrar alguna otra especie emparentada de tití (Byrne *et al.* 2016). Lo que es más particular de este lugar es la gran densidad de primates, especialmente los de gran tamaño como churucos y marimbas, que lo ubica en el lugar 15 con mayor biomasa dentro de un compendio de casi 150 sitios neotropicales (Stevenson 2016). Las razones principales de tener unas comunidades de fauna abundantes, son la alta productividad de plantas (en particular de frutos) que a su vez obedece a estar en zonas del piedemonte con una estación seca corta y suelos relativamente fértiles. Adicionalmente, y muy importante, es el hecho de que han sido lugares donde la cacería ha sido prácticamente nula y esto es imprescindible, especialmente para las especies de gran tamaño y tasas demográficas lentas (Peres y Palacios 2007). Por lo tanto, para el mantenimiento de estas comunidades es indispensable el control de la cacería en el parque, al igual que el mantenimiento de las coberturas boscosas.

CONCLUSIONES

El uso de transectos lineares no sistematizados, es una buena opción para lograr los tamaños de muestra requeridos para estimativos de densidad poblacional (de Thoisy *et al.* 2008), siempre y cuando se mantenga el rigor al tomar los registros de campo propios del método. De hecho, los resultados demuestran que en lo posible, es importante hacer muchos y largos recorridos diarios, más que transectos cortos y sistematizados, aunque lo ideal es recorridos largos y sistematizados, para controlar por la heterogeneidad espacial y temporal. La comunidad estudiada tiene una composición similar de fauna -a menos a nivel de las familias y géneros-, en comparación con otros bosques de tierras bajas del Neotropico. Destaca la alta abundancia de primates de gran tamaño como churucos y monos araña, que para que estén coexistiendo, requieren de una alta productividad de frutos. Aunque las tendencias grupales de los churucos

mostraron indicios de aumento -no solo por los datos de densidad, sino por estudios de grupos particulares-, la mayoría de las especies registradas presentaron poblaciones relativamente constantes a través de los tres años de muestreo, siendo excepciones la disminución de los saínos y el aumento de los tintines. Adicionalmente, hay observaciones preliminares de una población de pecaríes de labio blanco, que no existían en la década del noventa. El método, a pesar de su inherente alta variabilidad de estimativos, también permite algunos acercamientos a las preferencias de hábitat. Por ejemplo, las ardillas rojas, monos aulladores y titíes risoteros, prefieren los bosques de

tierra firme de dosel abierto; las dantas, los paujiles y pavas cuyas prefieren los planos de inundación; y los churucos y marimbas prefieren los bosques de dosel cerrado. Además, se reporta para ellos una preferencia por bosques secundarios en donde parecen encontrar protección contra depredadores nocturnos. Sin embargo, también vale la pena mencionar que la mayoría de las especies tienen cambios en sus patrones de uso, dependiendo de la estacionalidad en la producción de sus recursos (Stevenson *et al.* 2000). De esta forma, el mantenimiento de estas comunidades hacia el futuro depende de no permitir la deforestación y la cacería en estas zonas de Parque.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, D. R., J. L. Laake, B. R. Crain y K. P. Burnham. 1979. Guidelines for line transect sampling of biological populations. *The Journal of Wildlife Management* 43 (1): 70-78.
- Botero, P. 1998. Paisajes fisiográficos de la Orinoquia-Amazonia (ORAM), Colombia. *Análisis Geográficos* 27-28: 1-317.
- Brook, B. W., N. S. Sodhi y P. K. Ng. 2003. Catastrophic extinctions follow deforestation in Singapore. *Nature* 424 (6947): 420-423.
- Brook, B. W., Sodhi, N. S. y C. J. Bradshaw. 2008. Synergies among extinction drivers under global change. *Trends in Ecology & Evolution* 23 (8): 453-460.
- Buckland, S. T., A. J. Plumptre, L. Thomas y E. A. Rexstad. 2010. Design and analysis of line transect surveys for primates. *International Journal of Primatology* 31(5): 833-847.
- Byrne, H., A. B. Rylands, J. C. Carneiro, J. W. L. Alfaro, F. Bertuol, M. N. da Silva, M. Messias, C.P. Groves, R.A. Mittermeier, I. Farias, T. Hrbek, H. Schneider, I. Sampaio y J.P. Boubli. 2016. Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (*Callicebus*): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (1): 10.
- Cabrera, J. A. y F. Molano. 1995. *Mamíferos Macarena*. Asociación para la Defensa de La Macarena, Giro Editores. Bogotá D. C., Colombia. 140 pp.
- Cardillo, M., G. M. Mace, J. L. Gittleman, K. E. Jones, J. Bielby y A. Purvis, 2008. The predictability of extinction: biological and external correlates of decline in mammals. *Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences* 275 (1641): 1441-1448.
- Cardinale, B. J., J. E. Duffy, A. Gonzalez, D. U. Hooper, C. Perrings, P. Venail, A. Narwani, G.M. D. Tilman, D.A. Wardle, A.P. Kinzing, G.C. Daily, M. Loreau, J.B. Grace, A. Lari-gauderie, D. S. Srivastava y S. Naeem. 2012. Biodiversity loss and its impact on humanity. *Nature* 486 (7401): 59-67.
- Carretero-Pinzón, X., T. R. Defler, C. A. McAlpine y J. R. Rhodes. 2017. The influence of landscape relative to site and patch variables on primate distributions in the Colombian Llanos. *Landscape Ecology* 32 (4): 883-896.
- Chapman, C. A., S. R. Balcomb, T. R. Gillespie, J. P. Skorupa y T. T. Struhsaker. 2000. Long-term effects of logging on African primate communities: a 28-year comparison from Kibale National Park, Uganda. *Conservation Biology* 14: 207-217.

- Chapman, C. A., S. Bortolamiol, I. Matsuda, P. A. Omeja, F. P. Paim, R. Reyna-Hurtado, R. Sengupta y K. Valenta. 2018. Primate population dynamics: variation in abundance over space and time. *Biodiversity and Conservation* 27 (5): 1221-1238.
- de Thoisy, B., S. Brosse y M. A. Dubois. 2008. Assessment of large-vertebrate species richness and relative abundance in Neotropical forest using line-transect censuses: what is the minimal effort required? *Biodiversity and Conservation* 17 (11): 2627-2644.
- Díaz, S., J. Fargione, F. S. Chapin III y D. Tilman. 2006. Biodiversity loss threatens human well-being. *PLoS Biology* 4 (8): e277.
- Estes, J. A., J. Terborgh, J. S. Brashares, M. E. Power, J. Berger, W. J. Bond, S. R. Carpenter, T. E. Essington, R. D. Holt, J. B. C. Jackson, R. J. Marquis, L. Oksanen, T. Oksanen, R. T. Paine, E. K. Pikitch, W. J. Ripple, S. A. Sandin, M. Scheffer, T. W. Schoener, J. B. Shurin, A. R. E. Sinclair, M. E. Soule, R. Virtanen y D. A. Wardle. 2011. Trophic downgrading of planet Earth. *Science* 333 (6040): 301-306.
- Estrada, A. 2013. Socioeconomic contexts of primate conservation: population, poverty, global economic demands, and sustainable land use. *American Journal of Primatology* 75 (1): 30-45.
- Estrada, A., P. A. Garber, A. B. Rylands, C. Roos, E. Fernandez-Duque, A. Di Fiore, K. I. Nekaris, V. Nijman, E. W. Heymann y J. E. Lambert. 2017. Impending extinction crisis of the world's primates: Why primates matter. *Science Advances* 3 (1): e1600946.
- Flechas, N. A. y P. R. Stevenson. 2018. Relación entre la calidad de hojas, fertilidad del suelo y biomasa de primates atélidos en Colombia. Tesis de Maestría. Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de Los Andes. Bogotá D. C., Colombia. 32 pp.
- Fragoso, J. M. 2004. A long-term study of white-lipped peccary (*Tayassu pecari*) population fluctuation in northern Amazonia. Pp. 286-296. *En*: Silvius, K., R. E. Bodmer y J. M. V. Fragoso (Eds.). *People in nature, wildlife conservation in South and Central America* Columbia University Press, New York.
- Garcés, D. M. y S. De La Zerda. 1994. *Gran Libro de los Parques Nacionales de Colombia*. Intermedio Editores/ Circulo de Lectores. Bogotá D. C., Colombia. 230 pp.
- García, C., A. Link, J. Páez, P. R. Stevenson. 2018. Home range and daily traveled distances of Colombian woolly monkeys (*Lagothrix lagothricha lugens*) in a sub-andean forests of South-western Colombia: Comparing spatial data from gps-collars and direct focal follows. Capítulo 12 *En*: Reyna R. y C.A. Chapman (Eds.). *Movement Ecology of Neotropical Forest Mammals*. Springer, Nueva York. En prensa.
- Glanz, W. E. 1991. Mammalian densities at protected versus hunted sites in central Panama. Pp. 163-173. *En*: Robinson, J. y K. Redford (Eds.). *Neotropical Wildlife Use and Conservation*. University of Chicago Press, Chicago.
- Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice y J. R. G. Townshend. 2013. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science* 342 (6160): 850-853.
- Hassel-Finnegan, H. M., C. Borries, E. Larney, M. Umponjan y A. Koenig. 2008. How reliable are density estimates for diurnal primates? *International Journal of Primatology* 29 (5): 1175-1187.
- Janson, C. H. y J. Terborgh. 1986. Censusing primates in rainforests (with reference to the primate community at Cocha Cashu Biological Station, Manu National Park, Peru). Pp. 1-48. *En*: Ríos, M. A. (Ed.) *Reporte Manu*. Centro Datos para la Conservación. Lima, Perú.
- Krauss, J., R. Bommarco, M. Guardiola, R. K. Heikkinen, A. Helm, M. Kuussaari, R. Lindborg, E. Öckinger, M. Pärtel, J. Pino, J. Pöyry, K.M. Raatikainen, A. Sang, C. Stefanescu, T. Teder, M. Zobel, I.S. Dewenter. 2010. Habitat fragmentation causes immediate and time-delayed biodiversity loss at different trophic levels. *Ecology IMADs* 13 (5): 597-605.
- Mejía, C. A. 1995. *Fauna de la Serranía de La Macarena*. Amazonas Editores-Ediciones Uniandes. Bogotá D. C., Colombia. 174 pp.

Capítulo 11. ABUNDANCIA DE PRIMATES

- Mojica-Valencia, L. 2018. El legado investigativo del Campamento del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena de la Universidad de los Andes en el Parque Nacional Natural Tinigua. Tesis de pregrado. *Departamento de Ciencias Biológicas*. Universidad de Los Andes. Bogotá D. C., Colombia. 42 pp.
- National Research Council. 1981. *Techniques for the study of primate population ecology*. National Academies. 233 pp.
- Palacios, E. y C. A. Peres. 2005. Primate population densities in three nutrient-poor Amazonian terra firme forests of south-eastern Colombia. *Folia Primatologica* 76 (3): 135-145.
- Parra, J. L., M. Agudelo Y. Molina y G. Londoño. 2001. Use of space by a pair of Salvin's Curassows (*Mitu salvini*) in northwestern Colombian Amazon. *Ornitología Neotropical* 12 (3): 189-204.
- Peres, C. A. 1999a. Effects of subsistence hunting and forest types on the structure of Amazonian primate communities. Pp. 268-283. *En*: Fleagle, J. G., C. H. Janson, y K. E. Reed (Eds.). *Primate communities*. Cambridge University Press, Cambridge. New York.
- Peres, C. A. 1999b. General guidelines for standardizing line-transect surveys of tropical forest primates. *Neotropical primates* 7 (1): 11-16.
- Peres, C. A. y C. H. Janson. 1999. Species coexistence, distribution, and environmental determinants of neotropical primate richness: A community-level zoogeographic analysis. Pp. 55-74. *En*: Fleagle, J. G., C. H. Janson, y K. E. Reed (Eds.). *Primate communities*. Cambridge University Press, Cambridge. New York.
- Peres, C. A. y E. Palacios. 2007. Basin-wide effects of game harvest on vertebrate population densities in Amazonian forests: implications for animal-mediated seed dispersal. *Biotropica* 39 (3): 304-315.
- Santamaría, M. y A. M. Franco. 2000. Frugivory of Salvin's Curassow in a rainforest of the Colombian Amazon. *The Wilson Bulletin* 112 (4): 473-481.
- Şekercioğlu, Ç. H., G. C. Daily y P. R. Ehrlich. 2004. Ecosystem consequences of bird declines. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101 (52): 18042-18047.
- Sokal, R. R. y F. J. Rohlf. 1995. *Biometry*. W.H. Freeman and Company, New York. 887 pp.
- Stevenson, P. R. 1996. Censos diurnos de mamíferos y algunas aves de gran tamaño en el Parque Nacional Tinigua, Colombia. *Universitas Scientiarum* 3: 67-81.
- Stevenson, P. R. 2001. The relationship between fruit production and primate abundance in Neotropical communities. *Biological Journal of the Linnean Society* 72 (1): 161-178.
- Stevenson, P. R. 2002. Frugivory and seed dispersal by woolly monkeys at Tinigua National Park, Colombia. Ph D thesis, State University of New York at Stony Brook, New York. 411 pp.
- Stevenson, P. R. 2011. The abundance of large Ateline monkeys is positively associated with the diversity of plants regenerating in Neotropical forests. *Biotropica* 43 (4): 512-519.
- Stevenson, P. R. 2014. Potential determinants of the abundance of woolly monkeys in neotropical forests. Pp. 207-226. *En*: Deffler, T. y P. R. Stevenson (Eds.). *The woolly monkey: behavior, ecology, systematics, and captive research*. Springer.. Springer, New York, NY.
- Stevenson, P. R. 2016. Neotropical primate communities: Effects of disturbance, resource production and forest type heterogeneity. *American Journal of Primatology* 78 (4): 391-401.
- Stevenson, P. R. y M. C. Castellanos. 2000. Feeding rates and daily path range of the Colombian woolly monkeys as evidence for between-and within-group competition. *Folia Primatologica* 71 (6): 399-408.
- Stevenson, P. R., M. J. Quinones y J. A. Ahumada. 1994. Ecological strategies of woolly monkeys (*Lagothrix lagotricha*) at Tinigua National Park, Colombia. *American Journal of Primatology* 32 (2): 123-140.

- Stevenson, P. R., M. J. Quiñones y J. A. Ahumada. 2000. Influence of fruit availability on ecological overlap among four Neotropical primates at Tinigua National Park, Colombia. *Biotropica* 32 (3): 533-544.
- Ter Steege, H., N. C. Pitman, T. J. Killeen, W. F. Laurance, C. A. Peres, J. E. Guevara, R. P. Salomão, C. V. Castilho, I. L. Amaral, F. D. de Almeida Matos, L. de Souza Coelho, W. E. Magnusson, O. L. Phillips, D. de Andrade Lima Filho, M. J. Veiga Carim, M. V. Irumé, M. Pires-Martins, J-F. Molino, D. Sabatier, F. Wittmann, D. Cárdenas-López, J. R. da Silva Guimarães, A. Monteagudo, P. Núñez, A. Gilberto, N. Farias, J. Terborgh, K. Regina, J. C. Montero, T. R. Feldpausch, E. N. Honorio, A. J. Duque, C. Eugene, B. Mostacedo, R. Vasquez, R. L. Assis, M. Brilhante, M. Fragomeni, A. Andrade, J. L. Camargo, S. G. W. Laurance, H. E. Mendonça, B. S. Marimon, B. H. Marimon Jr., F. Costa, N. Targhetta, I. C. Guimarães, R. Brien, H. Castellanos, J. F. Duivenvoorden, H. F. Mogollón, M. T. Fernandez, G. A. Aymard, J. A. Comiskey, G. Damasco, N. Dávila, R. García-Villacorta, P. R. Stevenson, A. Vincenzini, T. Emilio, C. Levis, J. Schietti, P. Souza, A. F. Dallmeier, L. Valle, D. Neill, A. Araujo-Murakami, L. Arroyo, F. Antunes Carvalho, F. Coelho Souza, D. Dantas do Amaral, R. G. B. Garcia, M. Petrati, E. Venticinque, P. Fine, M. Toledo, C. Baraloto, C. Cerón, J. Engel, T. W. Henkel, E. M. Jimenez, P. Maas, M. C. Peñuela, P. Petronelli, J. D. Cardenas, M. Silveira, J. Stropp, R. Thomas-Caesar, T. R. Baker, D. Daly, M. Ríos, N. Ferreira da Silva, A. Fuentes, P. Møller, J. Schöngart, M. R. Silman, N. Castaño, B. Barçante L. Cintra, F. Cornejo, A. Di Fiore, J. F. Phillips, T. R. van Ande, P. von Hildebrand, E. Marques, L. C. de Matos Bonates, D. de Castro, E. de Sousa, T. Gonzales, J. Guillaumet, B. Hoffman, Y. Malhi, I. P. de Andrade, A. Prieto, A. Rudas, A. R. Ruschell, Natalino, C. I. A. Vela, V. A. Vos, E. L. Zent, A. Cano, M. Trindade, A. A. Oliveira, H. Ramirez-Angulo, J. Ferreira, R. Sierra, M. Tirado, M. N. Umaña, G. van der Heijden, E. Vilanova, C. Vriesendorp, O. Wang, K. R. Young, C. Baider, H. Balslev, N. de Castro, W. Farfan-Rios, C. Ferreira, C. Mendoza, I. Mesones, A. Torres-Lezama, L. E. Urrego, D. Villarroel, R. Zagt, M. N. Alexiades, K. Garcia-Cabrera, L. Hernandez, I. Huamtupa-Chuquimaco, W. Milliken, W. Palacios, S. Pansini, D. Pauletto, F. Ramirez, A. F. Sampaio, E. H. Valderrama y L. Valenzuela. 2015. Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. *Science Advances* 1 (10): e1500936.
- Wyatt, J. L. y M. R. Silman. 2004. Distance-dependence in two Amazonian palms: effects of spatial and temporal variation in seed predator communities. *Oecologia* 140: 26-35.
- Zárate, D. A. y P. R. Stevenson. 2014. Ecological strategies of woolly monkeys (*Lagothrix lagothricha*) in a forest fragment (Guaviare, Colombia). Pp. 227-245. *En: Defler, T. y P. R. Stevenson (Eds). The woolly monkey: behavior, ecology, systematics, and captive research. Springer.* Springer, New York, NY.

Capítulo 11. ABUNDANCIA DE PRIMATES

Anexo 1. Catálogo de especies.

1. Perezoso de dos dedos (*Choloepus didactylus*).

2. Angelito, perezoso pigmeo (*Cyclopes didactylus*).

3. Oso colmenero (*Tamandua tetradactyla*).

4. Oso palmero, oso hormiguero (*Myrmecophaga tridactyla*).

5. Armadillo de nueve (*Dasypus novemcinctus*).

6. Mico titi, risotero (*Plecturocebus ornatus*).

Lamina 1. Fotos: 1. Fernando Trujillo; 2, 3. Pablo Stevenson; 4, 5, 6. Sasha Cárdenas.

Anexo 1. Continuación.

7. Mico nocturno, tutamono (*Aotus cf. brumbacki*).

8. Mono ardilla, mico titi (*Saimiri casiquiarensis*).

9. Mico maicero (*Sapajus apella*).

10. Mico aullador (*Alouatta seniculus*).

11. Marimba, mico araña (*Ateles belzebuth*).

12. Churuco, mico barrigudo (*Lagothrix lagothricha*).

Lamina 2. Fotos: 7, 8. Federico Mosquera-Guerra; 9, 10, 11. Sasha Cárdenas; 12. Pablo Stevenson.

Capítulo 11. ABUNDANCIA DE PRIMATES

Anexo 1. Continuación.

13. Cusumbo, coatí (*Nasua nasua*).

14. Perro vinagrero (*Speothos venaticus*).

15. Hurón (*Galictis vittata*).

16. Zorra ulamá (*Eira barbara*).

17. Jaguarundi (*Puma yagouarundi*).

18. Tigrillo, ocelote (*Leopardus pardalis*).

Lamina 3. Fotos: 13. Sasha Cárdenas; 14, 16, 17. Angélica Díaz-Pulido; 15, 18. Federico Mosquera-Guerra.

Anexo 1. Continuación.

19. León sin melena, puma (*Puma concolor*).

20. Jaguar, tigre mariposo (*Panthera onca*).

21. Saino de collar (*Pecari tajacu*).

22. Venado rojo (*Mazama americana*).

23. Venado gris (*Mazama gouazoubira*).

24. Danta, tapir (*Tapirus terrestris*).

Lamina 4. Fotos: 19, 21. Pablo Stevenson y Sofia Argüello; 20, 22, 24. Pablo Stevenson; 23. Federico Mosquera- Guerra.

Capítulo 11. ABUNDANCIA DE PRIMATES

Anexo 1. Continuación.

25. Ardilla roja (*Sciurus igniventris*).

26. Tintín verde (*Myoprocta pratti*).

27. Chigüiro, capibara (*Hydrochaeris hydrochaeris*).

28. Guara, agutí negro (*Dasyprocta fuliginosa*).

29. Borugo, paca (*Cuniculus paca*).

30. Puercoespín (*Coendu prehensilis*).

Lamina 5. Fotos: 25, 27. Sasha Cárdenas; 26, 28-30. Pablo Stevenson.

Anexo 1. Continuación.

31. Conejo brasileiro (*Sylvilagus brasiliensis*).

32. Paujil (*Crax alector*).

33. Paujil (*Mitu salvini*).

34. Trompetero (*Psophia crepitans*).

35. Cuyuya (*Pipile cumanensis*).

Lamina 6. Fotos: 31. Camila Durán-Prieto; 32, 34. Pablo Stevenson; 33. Marcela Santamaría y Ana María Franco; 35. Nancy Flechas.