

**Anexo 1.** Numeración de referencia de fuentes bibliográficas consultadas con listados de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Referencias bibliográficas	Número
Álvarez-López y Heredia (1989)	1
Álvarez-López y Kattan (1995)	2
Angarita-Martínez (2002)	3
Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia-CALIDRIS (2015)	4
Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia-CALIDRIS (2016)	5
Bacon <i>et al.</i> (1985)	6
Calvert (2016)	7
Cantera-K. (2010)	8
Cárdenas y Vidal-Astudillo (2010)	9
Chapman (1917)	10
Cifuentes-Sarmiento y Ruiz-Guerra (2016)	11
Consortio C.S.C.-2009 (2011)	12
Contreras-Rengifo (2006)	13
Contreras-Rengifo <i>et al.</i> (2006)	14
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC y Fundación Mundo Ambiental (2006)	15
Departamento Administrativo de Planeación Municipal-DAPM (1996)	16
Downer (1978)	17
Downer (1979a)	18
Downer (1979b)	19
eBird 2016.	20
Fuentes-Pardo (2010)	21
Gniadek (1973)	22
Hernández-C <i>et al.</i> (2015)	23
Jordán-Muñoz <i>et al.</i> (Sin año)	24

Cont. **Anexo 1.** Numeración de referencia de fuentes bibliográficas consultadas con listados de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Referencias bibliográficas	Número
Kattan <i>et al.</i> (1991)	25
López-Carvajal (2012)	26
López-Carvajal (2014)	27
López-Carvajal (2016)	28
Miller (1963)	29
Montealegre-Talero (2009)	30
Muñoz <i>et al.</i> (2007)	31
Muñoz-A y Carmona-T. (Sin año a)	32
Muñoz-A y Carmona-T. (Sin año b)	33
Muñoz-A y Carmona-T. (Sin año c)	34
Naranjo y Estela (1999)	35
Orejuela-Gartner <i>et al.</i> (2007)	36
Orejuela-Gartner <i>et al.</i> (2011)	37
Ramírez-Lamus <i>et al.</i> (2001)	38
Reyes-Gutiérrez y Restrepo-Calle (2005)	39
Reyes-Gutiérrez <i>et al.</i> (2002)	40
Riascos-Vallejo (2001)	41
Rivera-Gutiérrez (2006)	42
Salazar-Mancipe <i>et al.</i> (2006)	43
Sarria-Salas (1993)	44
Universidad del Valle (2014 -)	45
Vargas <i>et al.</i> (2007)	46
Vidal-Astudillo y Wagner (2010)	47
Vidal-Astudillo <i>et al.</i> (2008)	48
Registros adicionales	49

**Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

La clasificación taxonómica y secuencia lineal, así como la categorización de especies Residentes (R) e Introducidas con poblaciones establecidas (In) siguen a Remsen *et al.* (2017). Las especies con rango restringido se clasifican de acuerdo a su estatus de endemidad según Chaparro-Herrera *et al.* (2013): Endémica de Colombia (E), Casi-endémica de Colombia (CE), Interés para Colombia (EI) e Información Insuficiente (II). Los hábitos de migración se asignan según las características de orientación geográfica según Naranjo *et al.* (2012): Migración Altitudinal (Mal), Migración Longitudinal (Mlo) y Migración Latitudinal (Mla) del tipo neártico-neotropical. Las categorías de amenaza a nivel regional siguen a Castillo-Crespo y González-Anaya (2007): Amenazadas (S1-S1S2), Medianamente Amenazadas (S2-S2S3) y Presuntamente Extinto (SX). Las categorías de amenaza a nivel nacional siguen a Renjifo *et al.* (2014, 2016): En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD) a la cual se adiciona la categoría No Evaluado (NE). Las mismas categorías de amenaza se emplean a nivel global según IUCN (2016). El rango de elevación sigue a Hilty y Brown (2001) con modificación de acuerdo a los documentos de la recopilación de listas.

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Tinamiformes</b>						
<b>Tinamidae</b>						
<i>Nothocercus julius</i> (Bonaparte, 1854)	1700-3100	R, CE	S1-S1S2, NE, LC	1, 17, 20, 22, 46	2016	
<i>Nothocercus bonapartei</i> Gray, 1867	500-2200	R	LC, LC	20, 24, 29	2016	
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	0-1900	R	LC, VU	10, 24, 36, 49	2013	Bosque de San Antonio/ Km-18 (V. Vidal-A. obs. pers. 2013)
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	0-2162	R	NE, LC	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 45	2016	
<b>Anseriformes</b>						
<b>Anhimidae</b>						
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	0-1000	R	S1-S1S2, NE, LC	10, 38	2001	Puede haber desaparecido para Cali. Relativamente común a principios del siglo XX (Chapman 1917), afectada por desecación de humedales y cacería (Lehman 1957).
<b>Anatidae</b>						
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	0-2600	R	S2-S2S3, NE, LC	10, 20, 33, 37, 38, 43	2016	
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	S1-S1S2, NE, LC	4, 5, 8, 20, 23, 37	2016	
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mal, Mlo	S2-S2S3, NE, LC	4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 32, 35, 37, 38, 40	2016	
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	R	S1-S1S2, NE, LC	8, 9, 20, 23, 27, 33, 37, 43	2016	Es posible que haya desaparecido en estado silvestre para el VGRC. Afectada por pérdida de hábitat hacia mediados del siglo XX (Lehman 1957). Sobreviven poblaciones domésticas.
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pennant, 1769)	0-3500	Mal	S1-S1S2, EN, LC	20, 38	2013	Para mediados del siglo XX ya era escasa por desecación de humedales (Lehman 1957).
<i>Merganetta armata</i> Gould, 1842	1500-3500	R	S2-S2S3, NE, LC	1, 7, 16, 20, 24, 45, 46	2016	
<i>Anas discors</i> Vieillot, 1816	0-3600	Mla	S2-S2S3, NE, LC	10, 13, 14, 20, 35, 37, 38, 46	2016	Relativamente común a principios de siglo, asociada generalmente con <i>A. cyanoptera</i> (Chapman 1917).
<i>Anas cyanoptera</i> (Vieillot, 1816)	0-3100	R, Mla	S1-S1S2, EN, LC	10, 20, 38, 41	2016	Poblaciones residentes de ssp. tropica. Abundante en el VGRC a principios del siglo XX (Chapman 1917).

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Anseriformes</b>						
<b>Anhimidae</b>						
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	0-2600	Mla	SX, NE, LC	38	2001	Registros recientes para el VGRC (eBird 2017). En el VGRC se veían con regularidad grupo de 40 o más individuos (Lehman 1957).
<i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832)	0-2600	R	SX, CR, LC	10, 41	2001	Afectada por cacería y pérdida de hábitat; grupos de hasta 200 individuos entre septiembre y mayo. Resto del año 20-40 (Lehman 1957).
<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	0-1000	Mla	SX, NE, LC	10	1911	Puede haber desaparecido para Cali, registros recientes por José Luna en Laguna de Sonso. Especie común con poblaciones residentes en el VGRC a principios de siglo XX (Chapman 1917), afectada por cacería (Lehman 1957).
<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	S1-S1S2, NE, LC	10, 38	2001	Relativamente común a mediados del siglo XX, afectados por cacería (Lehman 1957).
<b>Galliformes</b>						
<b>Cracidae</b>						
<i>Chamaepetes goudotii</i> (Lesson, 1828)	500-3000	R	S2-S2S3, NE, LC	7, 10, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 41, 45, 46	2016	
<i>Penelope perspicax</i> Bangs, 1911	1300-2000	R, E	S1-S1S2, EN, EN	10, 16, 20, 24, 45, 46	2015	
<i>Ortalis columbiana</i> Hellmayr, 1906	100-2500	R, E	S2-S2S3, NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 48	2016	
<b>Odontophoridae</b>						
<i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	0-3100	R	NE, LC	8, 10, 13, 20, 21, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45	2016	
<i>Odontophorus hyperythrus</i> Gould, 1858	1600-2700	R, E	S2-S2S3, LC, NT	1, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 45, 46	2016	
<b>Podicipediformes</b>						
<b>Podicipedidae</b>						
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	S1-S1S2, NE, LC	4, 10, 20, 37, 38	2016	
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	0-3100	R	S2-S2S3, NE, LC	3, 4, 10, 13, 20, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 46	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Columbiformes</b>						
<b>Columbidae</b>						
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	985-985	In	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 37, 48	2016	Introducida.
<i>Patagioenas fasciata</i> Say, 1823	500-3000	Mal	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 45, 46, 47	2016	
<i>Patagioenas cayennensis</i> Bonnatere, 1792	0-2100	R	NE, LC	3, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42	2016	
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	0-2800	Mal	NE, VU	10, 20, 37, 39	2016	
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	R	NE, LC	10, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 37, 39, 42	2016	
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	0-2700	R	NE, LC	1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 39, 42, 46	2016	
<i>Leptotila plumbeiceps</i> Sclater & Salvin, 1868	1000-2600	R	NE, LC	4, 9, 13, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 47	2016	
<i>Zentrygon frenata</i> (Tschudi, 1843)	900-2500	R	NE, LC	1, 10, 17, 20, 22, 25, 29, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Zenaida auriculata</i> (des Murs, 1847)	600-3000	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	0-2100	R	NE, LC	5, 20, 41	2016	
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	0-1400	R	NE, LC	20, 33	2016	Pasa desapercibida por confusión con <i>C. passerina</i> o hembra de <i>C. talpacoti</i> .
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1809)	0-2400	R	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Pérez, 1886)	0-1800	R	S1-S1S2, NE, LC	20, 42, 45	2016	Para mediados del siglo XX ya era escasa (Lehman 1957).
<b>Cuculiformes</b>						
<b>Cuculidae</b>						
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	0-2600	R	S2-S2S3, NE, LC	3, 4, 5, 8, 13, 14, 20, 26, 32, 35, 37, 38, 40, 41	2016	
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	0-2700	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	2016	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Cuculiformes</b>						
<b>Cuculidae</b>						
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	0-1800	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46	2016	
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870		R	NE, LC	20	2014	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Coccyzua minuta</i> (Vieillot, 1817)	0-1600	R	NE, LC	3, 8, 10, 20, 32, 37, 38, 39, 41	2011	Expandió su distribución al VGRC a mediados del siglo XX (Lehman 1957).
<i>Coccyzua pumila</i> Strickland, 1852	0-2600	R, CE	NE, LC	3, 8, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 48	2016	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	0-2700	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	0-2400	R	NE, LC	8, 10, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 48	2016	
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mla	NE, LC	3, 8, 20, 23, 25, 31, 37, 38, 40, 45, 48	2016	
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Wilson, 1811)	0-1600	Mla	NE, LC	1, 17, 22	1989	
<b>Steatornithiformes</b>						
<b>Steatornithidae</b>						
<i>Steatornis caripensis</i> Humboldt, 1817	0-3000	R	S2-S2S3, NE, LC	20, 29, 41, 45	2016	
<b>Nyctibiiformes</b>						
<b>Nyctibiidae</b>						
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	0-2162	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48	2016	
<b>Caprimulgiformes</b>						
<b>Caprimulgidae</b>						
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	0-1000	Mla	NE, LC	41, 45	2001	
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	0-2600	Mla	NE, LC	3, 8, 20, 23, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Caprimulgiformes</b>						
<b>Caprimulgidae</b>						
<i>Lurocalis rufiventris</i> Taczanowski, 1884	0-3000	R	NE, LC	17, 20	2016	Requiere extensión del rango de distribución. Presente también en el cerro Tatamá (C. Occidental).
<i>Systellura longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	1600-3600	R	NE, LC	1, 17, 19, 20, 22, 45	2016	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	0-2300	R	NE, LC	1, 3, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46	2016	
<i>Uropsalis segmentata</i> (Cassin, 1849)	2500-3500	R	NE, LC	45	1973	
<i>Uropsalis lyra</i> (Bonaparte, 1850)	800-2500	R	S2-S2S3, NE, LC	7, 16, 20, 24, 44, 45	2016	
<i>Hydropsalis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)		R	NE, LC	3, 8, 9, 10, 16, 20, 31, 35, 37, 42	2016	
<i>Antrostomus carolinensis</i> (Gmelin, 1789)	1000-2600	Mla	NE, LC	41, 45	2001	
<b>Apodiformes</b>						
<b>Apodidae</b>						
<i>Cypseloides cryptus</i> Zimmer, 1945	300-1200	R	NE, LC	20	1995	
<i>Cypseloides lemosi</i> Eisenmann & Lehmann, 1963	1000-1300	Mal, II	S1-S1S2, DD, LC	20	2016	Especie poco conocida.
<i>Streptoprocne rutila</i> (Vieillot, 1817)	800-3300	R	NE, LC	7, 10, 11, 20, 25, 29, 41, 45	2016	
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	0-3500	R	NE, LC	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46	2016	
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	0-1500	R	NE, LC	20	2013	
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	0-1800	R	NE, LC	20	2016	
<i>Chaetura pelagica</i> (Linnaeus, 1758)		Mla	NE, NT	20, 25, 29	2015	
<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	100-1600	R	NE, LC	20	1975	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Apodiformes</b>						
<b>Apodidae</b>						
<i>Aeronautes montivagus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	500-2500	R	NE, LC	20	2012	
<b>Trochilidae</b>						
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	0-2015	R	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 48	2016	
<i>Eutoxeres aquila</i> (Bourcier, 1847)	0-1400	Mal	NE, LC	1, 10, 17, 20, 22, 25, 41, 45	2015	
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	0-1000	R	NE, LC	3, 8, 10, 20, 32, 41, 45	2016	
<i>Phaethornis guy</i> (Lesson, 1833)	900-2015	Mal	NE, LC	7, 10, 11, 12, 16, 20, 24, 25, 36, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Phaethornis syrmatophorus</i> Gould, 1851	800-2400	R	NE, LC	1, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 45, 46, 47,	2016	
<i>Doryfera ludovicae</i> (Bourcier & Mulsant, 1847)	900-2700	Mal	NE, LC	1, 17, 20, 22, 24, 41, 45, 46	2016	
<i>Schistes geoffroyi</i> (Bourcier, 1843)	800-2500	R	NE, LC	7, 10, 19, 20, 25, 29, 41, 45, 46	2016	Registros de ssp. <i>albobularis</i> .
<i>Colibri delphinae</i> (Lesson, 1839)	100-2600	Mal	NE, LC	7, 20, 25, 36	2016	
<i>Colibri thalassinus</i> (Swainson, 1827)	600-2800	Mal	NE, LC	1, 7, 16, 17, 22, 24, 30, 45	2016	
<i>Colibri coruscans</i> (Gould, 1846)	1300-3600	R	NE, LC	1, 5, 16, 17, 20, 22, 24, 30, 46	2016	
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	0-1750	Mal	NE, LC	3, 20, 35, 37, 45	2016	
<i>Anthracothorax prevostii</i> (Lesson, 1832)	0-1000	R	NE, LC	20, 45	2005	Local en el corregimiento de Pance, sur de Cali (L. Mazariegos com. pers.) (Hilty y Brown 2001).
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	0-2015	Mal	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Heliangelus exortis</i> (Fraser, 1840)	1500-3400	R, CE	NE, LC	20, 41	2016	
<i>Adelomyia melanogenys</i> (Fraser, 1840)	1000-2500	Mal	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46, 47	2016	
<i>Agelaiocercus kingii</i> (Bourcier, 1843)	1400-3000	Mal	NE, LC	1, 7, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Apodiformes</b>						
<b>Trochilidae</b>						
<i>Ramphomicron microrhynchum</i> (Boissonneau, 1839)	1700-3400	R	NE, LC	49	2016	Poco conocida. Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PPN Farallones de Cali, Alto del Buey).
<i>Chalcostigma herrani</i> (deLattre & Bourcier, 1846)	2700-3600	R, EI	S2-S2S3, NE, LC	19, 20, 45	2016	
<i>Metallura tyrianthina</i> (Loddiges, 1832)	600-3600	Mal	S2-S2S3, NE, LC	17, 20, 41, 45	2016	
<i>Haplophaedia aureliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1846)	900-3100	Mal, CE	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Eriocnemis vestita</i> (Lesson, 1838)	2250-3850	R	NE, LC	17, 45	1978	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PPN Farallones de Cali, Alto del Buey).
<i>Eriocnemis mosquera</i> (deLattre & Bourcier, 1846)	1200-3600	Mal, CE	NE, LC	20, 36	2015	
<i>Aglaeactis cupripennis</i> Bourcier, 1843	2900-3400	R	NE, LC	20, 41	2014	Migratoria altitudinal (del Hoyo <i>et al.</i> 2017).
<i>Coeligena coeligena</i> (Lesson, 1833)	1500-2600	Mal	NE, LC	1, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Coeligena wilsoni</i> (deLattre & Bourcier, 1846)	700-2015	Mal, CE	NE, LC	7, 20	2016	
<i>Coeligena torquata</i> (Boissonneau, 1840)	1500-3000	R	NE, LC	1, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 45, 46	2016	
<i>Lafresnaya lafresnayi</i> (Boissonneau, 1840)	1500-3000	Mal	NE, LC	17, 18, 19, 20, 45	2016	
<i>Ensifera ensifera</i> (Boissonneau, 1839)	1700-3300	R	S2-S2S3, NE, LC	18, 20, 46	2015	
<i>Pterophanes cyanopterus</i> (Fraser, 1839)	2600-3600	R	NE, LC	19	1979	
<i>Boissonneaua flavescens</i> (Loddiges, 1832)	850-2800	R	NE, LC	1, 5, 7, 20, 22, 25, 29, 41, 45, 46	2016	
<i>Boissonneaua jardini</i> (Bourcier, 1851)	350-2200	R, CE	S2-S2S3, NE, LC	20	2015	
<i>Ocreatus underwoodii</i> (Lesson, 1832)	900-3100	Mal	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Urochroa bougueri</i> (Bourcier, 1851)	500-2500	R, CE	NE, LC	1, 17, 20, 22, 24, 44, 45, 46	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Apodiformes</b>						
<b>Trochilidae</b>						
<i>Heliodoxa rubinoides</i> (Bourcier & Mulsant, 1846)	1000-2600	Mal	NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45	2016	
<i>Heliodoxa jacula</i> Gould, 1850	500-1500	R	NE, LC	19, 20	2016	Errante.
<i>Heliomaster longirostris</i> (Audebert & Vieillot, 1801)	0-2015	R	NE, LC	3, 7, 10, 16, 19, 20, 21, 24, 37, 41, 42, 45	2016	
<i>Calliphlox mitchellii</i> (Bourcier, 1847)	0-2015	Mal, CE	NE, LC	7, 20, 24, 29, 36,	2016	
<i>Chlorostilbon melanorhynchus</i> (Linnaeus, 1758)	0-2200	Mal, CE	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Chalybura buffonii</i> (Lesson, 1832)	0-2000	R	NE, LC	3, 12, 20, 24, 32	2016	
<i>Thalurania colombica</i> (Bourcier, 1843)	0-2015	Mal, CE	NE, LC	7, 10, 16, 20, 46	2016	
<i>Amazilia tzacatl</i> (de la Llave, 1833)	0-2015	Mal	NE, LC	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Amazilia franciae</i> (Bourcier & Mulsant, 1846)	1000-2162	Mal	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 41, 45, 46	2016	
<i>Amazilia saucerottei</i> (deLattre & Bourcier, 1846)	0-2015	R, CE	NE, LC	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48	2016	
<i>Hylocharis grayi</i> (deLattre & Bourcier, 1846)	0-2600	Mal, CE	NE, LC	10, 20, 25, 29, 36, 41	2016	
<b>Gruiformes</b>						
<b>Aramidae</b>						
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	0-985	R	NE, LC	4, 8, 20, 23, 34, 35, 37, 38, 40, 45	2016	
<b>Rallidae</b>						
<i>Aramides cajaneus</i> (Müller, 1776)	0-2300	R	S2-S2S3, NE, LC	4, 5, 11, 20, 26, 27, 32, 39, 41, 42	2016	
<i>Laterallus albigularis</i> (Lawrence, 1861)	0-1600	R	NE, LC	10, 20	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Gruiformes</b>						
<b>Rallidae</b>						
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	0-1200	R	S2-S2S3, NE, LC	20, 35	1999	
<i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783)	0-1000	R	NE, LC	10	1911	Especie poco conocida. Podría estar amenazada o posiblemente Extinguida (SX) en el VGRC.
<i>Porzana carolina</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mla	NE, LC	45	1983	
<i>Mustelirallus colombianus</i> Bangs, 1898	0-2100	R, CE	S2-S2S3, DD, DD	29	1959	Especie poco conocida.
<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	400-2000	R	NE, LC	14, 20, 45	2006	
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	800-2200	R	NE, LC	3, 7, 8, 13, 20, 23, 24, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 46	2016	
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	0-3100	R	NE, LC	3, 4, 5, 10, 13, 20, 32, 35, 37, 38, 43, 45	2016	
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	Mla, Mlo	NE, LC	4, 13, 14, 20, 32, 35, 37, 38, 45	2016	
<i>Fulica americana</i> Gmelin, 1789	0-3400	R, Mla	NE, LC	3, 20, 38, 43	2016	
<b>Charadriiformes</b>						
<b>Charadriidae</b>						
<i>Pluvialis dominica</i> (Müller, 1776)	0-2600	Mla	NE, LC	10	1911	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	0-3100	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48	2016	
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825		Mla	NE, LC	38	2001	
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	0-1000	Mla	NE, LC	10, 38	2001	
<b>Recurvirostridae</b>						
<i>Himantopus mexicanus</i> (Müller, 1776)	0-2600	R, Mla	NE, LC	10, 20, 37, 38, 45	2014	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Charadriiformes</b>						
<b>Scolopacidae</b>						
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	0-2600	Mla	NE, LC	29	1959	Individuo errante.
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	0-1000	Mla	NE, LC	10, 38	2001	
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	0-3100	Mla	NE, LC	38	2001	
<i>Gallinago delicata</i> (Ord, 1825)	0-3900	Mla	NE, LC	19, 38	2001	
<i>Actitis macularius</i> Linnaeus, 1766	0-3300	Mla	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 20, 35, 37, 38, 39, 40	2016	
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	0-2600	Mla	NE, LC	10, 20, 21, 38, 41	2016	
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	0-300	Mla	NE, LC	10, 20, 38, 41	2014	
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	0-3300	Mla	NE, LC	3, 4, 13, 20, 38	2016	
<b>Jacanidae</b>						
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	NE, LC	4, 10, 13, 14, 15, 20, 32, 33, 35, 37, 38, 41	2016	
<b>Suliformes</b>						
<b>Phalacrocoracidae</b>						
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	0-2600	Mal, Mlo	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 32, 34, 37, 38, 40, 43, 48	2016	
<b>Anhingidae</b>						
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	985	R	S1-S1S2, NE, LC	3, 4, 5, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 34, 37, 38	2016	
<b>Pelecaniformes</b>						
<b>Ardeidae</b>						
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	0-2600	R	NE, LC	20, 38	2001	
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	0-3100	R	S1-S1S2, NE, LC	38	2001	
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mla	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43	2016	
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Pelecaniformes</b>						
<b>Ardeidae</b>						
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mal, Mla, Mlo	NE, LC	3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48	2016	Expandió su distribución en el VGRC a mediados del siglo XX (Lehman 1957).
<i>Ardea herodias</i> Linnaeus, 1758	0-2600	Mla	NE, LC	15, 20	2016	
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	0-1500	R	S2-S2S3, NE, LC	4, 13, 14, 20, 23, 32, 35, 37, 38, 45	2016	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	0-2600	Mal, Mlo	NE, LC	3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41	2016	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	0-2600	Mal, Mla, Mlo	NE, LC	3, 4, 5, 8, 13, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39	2016	
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mal, Mla	S2-S2S3, NE, LC	4, 20, 32, 34, 35, 37, 38	2016	
<b>Threskiornithidae</b>						
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	0-500	R	SX, NE, LC	32, 38	2001	
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	0-100	Mla	NE, LC	3, 5, 20, 38	2016	
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	0-2600	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 20, 23, 26, 27, 32, 37, 38, 40, 41, 43	2016	
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	0-1600	R	S1-S1S2, NE, LC	20	2016	En aumento de sus poblaciones en el VGRC. Cazado localmente por su carne en el pasado.
<i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758)	0-1000	R	S1-S1S2, NE, LC	10	1911	Puede haber desaparecido del VGRC donde era residente permanente (Chapman 1917).
<b>Cathartiformes</b>						
<b>Cathartidae</b>						
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	0-3000	R, Mla	NE, LC	1, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 46	2016	
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	0-1000	R	NE, LC	49	1957	Residente permanente a mediados del siglo XX (Lehman 1957), puede haber desaparecido del VGRC.
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1783)	0-2700	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Accipitriformes</b>						
<b>Pandionidae</b>						
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	0-3300	Mla	S2-S2S3, NE, LC	3, 5, 8, 20, 21, 26, 32, 35, 37, 38, 39, 40	2016	
<b>Accipitridae</b>						
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	0-2600	R	S2-S2S3, NE, LC	2, 3, 8, 20, 31, 37, 40, 42, 48	2016	Considerado de estatus incierto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	0-1100	R	NE, LC	2, 8, 20, 40	2016	Expansión de la distribución para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	0-2700	R	S1-S1S2, NE, LC	2, 24, 41	2010	Considerado extinto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mla	NE, LC	1, 10, 17, 20, 22, 24, 32	2015	
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	0-2015	R	S2-S2S3, NE, NT	7, 20, 24, 36	2016	
<i>Spizaetus isidori</i> (des Murs, 1845)	1600-2800	R	S1-S1S2, EN, EN	41	2001	
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	0-1100	R	S2-S2S3, NE, LC	2, 8, 13, 14, 20, 31, 34, 38, 40, 45	2016	Considerado en peligro para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	0-2600	R	S2-S2S3, LC, LC	8, 10, 17, 20	2012	
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	0-1500	R	S2-S2S3, NE, LC	20	2004	Poco conocida.
<i>Accipiter collaris</i> Sclater, 1860	600-1800	R, CE	S2-S2S3, NT, NT	20	2014	
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1807	900-2700	R	S2-S2S3, NE, LC	10, 20, 45, 46	2014	Registros de ssp. <i>ventralis</i> .
<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	0-1100	R	S1-S1S2, NE, LC	2, 20	2016	Considerado extinto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	0-1100	R	S2-S2S3, NE, LC	2	1995	
<i>Buteogallus solitarius</i> (Tschudi, 1844)	750-2200	R	S1-S1S2, CR, NT	18	1979	
<i>Morphnarchus princeps</i> (Sclater, 1865)	50-1800	R	S2-S2S3, NE, LC	20	2016	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	0-2500	R	NE, LC	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Accipitriformes</b>						
<b>Accipitridae</b>						
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	0-1500	R	S1-S1S2, NE, LC	2, 20	2016	Considerado extinto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	0-1800	R	S1-S1S2, NE, LC	2, 9, 20, 21, 37, 41, 42	2015	Considerado en peligro para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995)
<i>Geranoaetus polyosoma</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	1800-3200	R	NE, LC	17, 20, 41	2014	
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	0-2015	R	NE, LC	7, 20	2016	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	0-2800	Mla	S2-S2S3, NE, LC	1, 3, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 24, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48	2016	
<i>Buteo albigula</i> Philippi, 1899	1700-3500	R	NE, LC	20, 41	2001*	Posibles movimientos migratorios. Requiere de mayores estudios.
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	0-1800	R	S2-S2S3, NE, LC	8, 20, 48	2016	
<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	0-2600	Mla	S2-S2S3, NE, LC	20	2004	Individuos errantes.
<b>Strigiformes</b>						
<b>Tytonidae</b>						
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	0-300	R	NE, LC	20, 36, 37, 39, 41, 45	2016	
<b>Strigidae</b>						
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	0-3000	R	NE, LC	3, 8, 11, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46	2016	
<i>Megascops colombianus</i> Traylor, 1952		R, CE	S1-S1S2, LC, NT	20	2016	
<i>Megascops albogularis</i> (Cassin, 1850)	2000-3000	R	NE, LC	16, 20	2016	
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	0-1000	R	NE, LC	41	2001*	Lehman (1957) reporta varios registros para Cali y alrededores.
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	0-4000	R	S1-S1S2, NE, LC	8, 40	2010	
<i>Ciccaba virgata</i> (Cassin, 1850)	0-2015	R	NE, LC	7, 10, 16, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 37, 39, 45, 46	2016	
<i>Ciccaba nigrolineata</i> (Sclater, 1859)	0-2400	R	NE, LC	20	2015	Relativamente común para el VGRC a mediados del siglo XX, conocido como "mota" (Lehman 1957).

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Strigiformes</b>						
<b>Strigidae</b>						
<i>Ciccaba albitarsis</i> (Bonaparte, 1850)	1700-3000	R	NE, LC	19	1979	
<i>Glaucidium nubicola</i> Robbins & Stiles, 1999	1400-2200	R, CE	S1-S1S2, VU, VU	20, 29	2016	
<i>Glaucidium jardinii</i> (Bonaparte, 1855)	2100-2800	R	NE, LC	1, 17, 20, 22, 45	2016	
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	1700-3000	R	NE, LC	8, 20	2016	Lehman (1957) reporta varios registros para Cali.
<b>Trogoniformes</b>						
<b>Trogonidae</b>						
<i>Pharomachrus auriceps</i> (Gould, 1842)	1400-2700	R	S1-S1S2, NE, LC	1, 4, 5, 10, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 41, 46	2016	
<i>Pharomachrus antisanus</i> (d'Orbigny, 1837)	1400-2800	Mal	S1-S1S2, NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 41	2016	
<i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817	400-2700	R	S2-S2S3, NE, LC	4, 7, 10, 20, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Trogon personatus</i> Gould, 1842	700-2900	R	NE, LC	1, 17, 20, 22, 29, 45	2016	
<b>Coraciiformes</b>						
<b>Alcedinidae</b>						
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48	2016	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	0-1200	R	NE, LC	3, 5, 8, 10, 13, 20, 31, 32, 38	2016	
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	0-1500	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 45	2016	
<b>Momotidae</b>						
<i>Momotus aequatorialis</i> Gould, 1857	0-3100	R	NE, LC	1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47	2016	
<b>Galbuliformes</b>						
<b>Bucconidae</b>						
<i>Malacoptila mystacalis</i> (Lafresnaye, 1850)	800-2100	R	NE, LC	20, 46	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Galbuliformes</b>						
<b>Bucconidae</b>						
<i>Hapaloptila castanea</i> (Verreaux, 1866)	750-2400	R, EI	NE, LC	29, 45	1970	Especie local.
<b>Piciformes</b>						
<b>Capitonidae</b>						
<i>Eubucco bourcierii</i> (Lafresnaye, 1845)	400-2400	Mal	NE, LC	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46, 47	2016	
<b>Semnornithidae</b>						
<i>Semnornis ramphastinus</i> (Jardine, 1855)	1000-2400	R, CE	S1-S1S2, NT, NT	1, 10, 17, 20, 22, 29, 41	2014	Puede haber desaparecido para Cali. Vendidas como aves de jaula (Lehman 1957).
<b>Ramphastidae</b>						
<i>Ramphastos ambiguus</i> Swainson, 1823	100-2400	R	NE, NT	10	1911	Extirpado en el VGRC (del Hoyo <i>et al.</i> 2017).
<i>Aulacorhynchus prasinus</i> (Gould, 1834)	1600-3700	Mal	NE, LC	1, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Aulacorhynchus haematopygus</i> (Gould, 1835)	800-2162	R, CE	NE, LC	1, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 41, 46, 47	2016	
<i>Andigena nigrirostris</i> (Waterhouse, 1839)	1600-3200	R, CE	S1-S1S2, NT, LC	1, 10, 18, 20, 24, 45, 46	2016	
<b>Picidae</b>						
<i>Picumnus granadensis</i> Lafresnaye, 1847	800-2100	R, E	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48	2016	
<i>Melanerpes formicivorus</i> (Swainson, 1827)	1400-3300	R	NE, LC	1, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 36, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Melanerpes rubricapillus</i> (Cabanis, 1862)	0-1700	R	NE, LC	4, 5, 8, 9, 11, 20, 23, 27, 37, 48	2016	Expansión de distribución en el VGRC a partir del 2000 (Garcés-Restrepo <i>et al.</i> 2012).
<i>Picoides fumigatus</i> (d'Orbigny, 1840)	600-3000	R	NE, LC	1, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46	2016	
<i>Veniliornis dignus</i> (Sclater & Salvin, 1877)	700-2700	R, CE	NE, LC	1, 7, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Colaptes rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	900-3100	R	NE, LC	1, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Piciformes</b>						
<b>Picidae</b>						
<i>Colaptes rivolii</i> (Boissonneau, 1840)	1800-3500	R	NE, LC	18, 46	2007	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PNN Farallones de Cali, Alto del Buey).
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	0-1500	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48	2016	
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	0-2100	R	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48	2016	
<i>Campephilus pollens</i> (Bonaparte, 1845)	900-3600	R	NE, LC	1, 16, 17, 18, 20, 22, 24	2016	
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	0-3100	R	NE, LC	3, 5, 10, 20, 24, 29, 39, 41, 46	2016	
<b>Falconiformes</b>						
<b>Falconidae</b>						
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	0-2400	R	S2-S2S3, NE, LC	20, 24, 29, 41	2016	
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	0-2500	R	S2-S2S3, NE, LC	10, 18, 20, 25	2015	
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	0-1000	R	NE, LC	41	2001*	
<i>Caracara cheriway</i> Jacquin, 1784	0-3000	R	NE, LC	2, 3, 4, 5, 8, 20, 23, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 46	2016	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	0-2600	R	NE, LC	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48	2016	
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	0-3200	R	NE, LC	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	0-3400	Mla	S2-S2S3, NE, LC	20, 38, 48	2015	
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	0-1600	R	S2-S2S3, NE, LC	2, 8, 20, 48	2016	Considerado extinto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	0-1700	R	S1-S1S2, NE, LC	2, 3, 4, 8, 10, 20, 23, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 48	2016	Considerado de estatus incierto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Falconiformes</b>						
<b>Falconidae</b>						
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	0-2800	R, Mla	S2-S2S3, NE, LC	3, 5, 8, 20, 35, 40, 41	2016	
<b>Psittaciformes</b>						
<b>Psittacidae</b>						
<i>Bolborhynchus lineola</i> (Cassin, 1853)	1100-2600	Mal	S1-S1S2, NE, LC	1, 17, 18, 20, 22, 29, 41	2016	
<i>Brotogeris jugularis</i> (Müller, 1776)	0-1000	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 20, 21, 23, 28, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 48	2016	
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	0-1500	R	S2-S2S3, NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48	2016	
<i>Pionus chalcopterus</i> (Fraser, 1841)	400-2800	R, CE	S1-S1S2, NE, LC	7, 20	2016	
<i>Amazona autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	0-1000	R	NE, LC	4, 5, 8, 20, 35, 37, 40, 45, 48	2016	
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	0-985	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 20, 23, 39, 40	2016	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Amazona mercenarius</i> (Tschudi, 1844)	500-3600	R	S1-S1S2, NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24	2016	
<i>Forpus conspicillatus</i> (Lafresnaye, 1848)	200-2600	R, CE	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48	2016	Poblaciones en disminución. Podría estar amenazada.
<i>Eupsittula pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	0-1000	R	NE, LC	8, 20, 23, 37	2016	Expansión de distribución en el VGRC a partir de finales de los 90 (Cárdenas 1998).
<i>Ara militaris</i> (Linnaeus, 1766)	0-2000	Mal	S2-S2S3, VU, VU	17	1978	Poco conocida. Puede haber desaparecido para el VGRC.
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	0-1000	R	S2-S2S3, NE, LC	4, 5, 8, 9, 10, 20, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 48	2016	Común en el VGRC a principios del siglo XX (Chapman 1917).
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (Massena & Souancé, 1854)	1200-3400	R, CE	SX, EN, EN	19	1979	Presuntamente extinto (SX) en el VGRC.
<i>Psittacara wagleri</i> (Gray, 1845)	350-2800	R	S1-S1S2, NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Thamnophilidae</b>						
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	0-1800	R	NE, LC	3, 8, 20, 32, 40	2016	
<i>Thamnophilus multistriatus</i> Lafresnaye, 1844	400-2200	R, CE	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48	2016	
<i>Thamnophilus unicolor</i> (Sclater, 1859)	0-2162	R	NE, LC	1, 10, 20, 22, 25, 29, 30, 36, 41	2016	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	300-2200	Mal	NE, LC	1, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 44, 45	2016	
<i>Dysithamnus occidentalis</i> (Chapman, 1923)	900-2200	R, CE	S1-S1S2, VU, VU	18, 20	2016	
<i>Myrmotherula schisticolor</i> (Lawrence, 1865)	400-2162	R	NE, LC	1, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 45	2016	
<i>Drymophila striaticeps</i> Chapman, 1912	1200-2700	R	NE, LC	20, 45	2016	
<i>Cercomacra nigricans</i> Sclater, 1858	0-1500	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	2016	
<i>Hafferia zeledoni</i> (Ridgway, 1909)	100-2015	Mal	NE, LC	7, 20	2016	
<b>Conopophagidae</b>						
<i>Conopophaga castaneiceps</i> Sclater, 1857	1200-1800	R	NE, LC	49	2017	Registro fotográfico por Albeiro Uribe, corregimiento de Pance, al sur de Cali.
<b>Grallariidae</b>						
<i>Grallaria guatemalensis</i> Prévost & des Murs, 1842	300-2162	R	S1-S1S2, NE, LC	6, 20, 25, 29, 30, 47	2016	
<i>Grallaria ruficapilla</i> Lafresnaye, 1842	1200-2800	R	NE, LC	10, 16, 20, 24, 29, 30, 45	2016	
<i>Grallaria nuchalis</i> Sclater, 1859	2200-3000	R	NE, LC	20	2016	
<i>Grallaricula flavirostris</i> (Sclater, 1858)	500-2100	R	NE, NT	10	1911	
<i>Grallaricula nana</i> (Lafresnaye, 1842)	1900-2100	R	NE, LC	20	2015	
<b>Rhinocryptidae</b>						
<i>Scytalopus latrans</i> Hellmayr, 1924	1700-2300	R	NE, LC	5, 20, 24	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Rhinocryptidae</b>						
<i>Scytalopus vicinior</i> Zimmer, 1939	450-3700	R, CE	NE, LC	10, 20, 25, 29, 30, 41	2016	
<b>Formicariidae</b>						
<i>Formicarius rufipectus</i> Salvin, 1866	1100-2200	R	LC, LC	10, 20	2016	
<i>Chamaeza mollissima</i> Sclater, 1855	1400-3100	R	LC, LC	17	1978	
<b>Furnariidae</b>						
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	0-2000	R	NE, LC	10, 20, 45	2016	
<i>Dendrocincla tyrannina</i> (Lafresnaye, 1851)	1900-3000	R	NE, LC	20	2016	
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	0-1500	R	NE, LC	16, 20, 37, 39, 45, 46, 48	2014	
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	0-2100	R	NE, LC	20	2014	
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	1300-2800	R	NE, LC	20, 45	2016	
<i>Xiphorhynchus susurrans</i> (Jardine, 1847)	0-1100	R	NE, LC	20, 41	2016	
<i>Xiphorhynchus erythropygius</i> (Sclater, 1859)	0-2100	R	NE, LC	20	2016	Pasa desapercibida por confusión con <i>X. triangularis</i> .
<i>Xiphorhynchus triangularis</i> (Lafresnaye, 1842)	800-2700	R	NE, LC	10, 20, 24, 25, 29, 41, 45, 46	2016	
<i>Campylorhamphus pusillus</i> (Sclater, 1860)	50-2100	Mal	NE, LC	10	1911	
<i>Drymotoxeres pucheranii</i> (des Murs, 1849)	900-2500	R	S1-S1S2, LC, NT	20	2011	Especie poco conocida. Registro fotográfico por Juan Ortiz (PNN Farallones de Cali).
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (des Murs, 1849)	0-1500	R	NE, LC	3, 4, 5, 10, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48	2016	
<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i> (des Murs, 1849)	1200-3400	R	NE, LC	1, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 44, 45	2016	
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	0-2162	R	NE, LC	20, 24, 30, 36	2016	En el bosque seco. Reemplazado por <i>X. rutilans</i> en bosques nublados.

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Furnariidae</b>						
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	1500-2800	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 36, 41, 44, 45	2016	
<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i> (Lafresnaye, 1840)	1800-3200	R	NE, LC	20	2016	
<i>Premnornis guttuliger</i> (Sclater, 1864)	1600-2500	R	NE, LC	1, 10, 16, 20, 22, 25, 29, 30, 36, 41, 45	2016	
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	1300-2100	R	NE, LC	11, 16, 20, 42	2016	
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	900-1800	R	NE, LC	20, 44	2016	Podría estar amenazada.
<i>Anabacerthia striaticollis</i> Lafresnaye, 1840	1000-2400	R	NE, LC	1, 10, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 41, 45	2016	
<i>Syndactyla subalaris</i> (Sclater, 1859)	900-2400	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 36, 41, 45	2016	
<i>Thripadectes virgaticeps</i> Lawrence, 1874	1200-2500	R, CE	NE, LC	10, 17, 20, 25, 29, 30, 36, 41	2016	
<i>Premnoplex brunnescens</i> (Sclater, 1856)	1200-2600	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 41, 45	2016	
<i>Margarornis stellatus</i> Sclater & Salvin, 1873	1200-2200	R, CE	S1-S1S2, LC, NT	10, 20	1999	
<i>Margarornis squamiger</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	1500-3000	R	NE, LC	20	2016	
<i>Hellmayrea gularis</i> (Lafresnaye, 1843)	2400-3800	R	NE, LC	18, 45	1979	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 PNN Farallones de Cali, Alto del Buey).
<i>Cranioleuca erythroptus</i> (Sclater, 1860)	700-2162	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45	2016	
<i>Synallaxis brachyura</i> Lafresnaye, 1843	0-2015	R	NE, LC	1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48	2016	
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	0-2100	R	NE, LC	5, 6, 8, 10, 20, 21, 28, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41	2016	
<i>Synallaxis azarae</i> d'Orbigny, 1835	900-3000	R	NE, LC	4, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Synallaxis unirufa</i> Lafresnaye, 1843	1700-3100	R	NE, LC	6, 10, 18, 20, 41, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tyrannidae</b>						
<i>Phyllomyias griseiceps</i> (Sclater & Salvin, 1871)		R	NE, LC	20	2016	
<i>Phyllomyias nigrocapillus</i> (Lafresnaye, 1845)	1600-3400	R	NE, LC	16, 19, 20	2016	
<i>Phyllomyias cinereiceps</i> (Sclater, 1860)	1800-2700	R	NE, LC	7, 20, 30	2016	Especie de dosel. Generalmente pasa desapercibida.
<i>Phyllomyias plumbeiceps</i> (Lawrence, 1869)	1300-2200	R	NE, LC	10, 20	2016	
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	0-1000	R	NE, LC	4, 5, 8, 10, 20, 23, 37, 41, 45	2016	
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	0-1300	R	NE, LC	20	2016	
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	0-2100	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	0-2200	Mal, Mla	NE, LC	1, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 28	2016	
<i>Elaenia frantzii</i> Lawrence, 1865	900-3600	Mal	NE, LC	3, 5, 7, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 30, 37, 39, 45, 46	2016	
<i>Elaenia pallatangae</i> Sclater, 1861	1600-2500	R	NE, LC	29, 41, 45	2001	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	0-2162	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 48	2016	
<i>Mecocerculus poecilocercus</i> Sclater & Salvin, 1873	1600-2700	R	NE, LC	20	2015	
<i>Mecocerculus stictopterus</i> (Sclater, 1858)	1800-3600	R	NE, LC	17, 20	2016	
<i>Mecocerculus leucophrys</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1500-3800	R	NE, LC	3, 17, 19, 20, 43, 45	2016	
<i>Serpophaga cinerea</i> (Tschudi, 1844)	100-3200	R	NE, LC	1, 5, 6, 7, 16, 17, 20, 24, 35, 37, 44, 45, 46	2016	
<i>Phaeomyias murina</i> (von Spix, 1825)	0-2162	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tyrannidae</b>						
<i>Pseudotriccus ruficeps</i> (Lafresnaye, 1843)	1400-3600	R	NE, LC	20	2016	
<i>Zimmerius chrysops</i> (Sclater, 1859)	300-2700	R	NE, LC	1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48	2016	
<i>Phylloscartes poecilotis</i> (Sclater, 1862)	1500-2300	R	NE, LC	1, 10, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29, 36, 41, 45	2016	
<i>Phylloscartes ophthalmicus</i> (Taczanowski, 1874)	600-2400	R	NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 36, 45	2016	
<i>Mionectes striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1600-2700	R	NE, LC	1, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30	2016	
<i>Mionectes olivaceus</i> Lawrence, 1868	0-1800	R	NE, LC	11, 16, 20, 41, 45	2016	
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	0-1700	R	NE, LC	5, 11, 17, 20, 21, 33, 37, 39, 41, 42, 46	2016	
<i>Leptopogon superciliaris</i> Tschudi, 1844	120-2100	R	NE, LC	1, 16, 17, 20, 22, 37, 39	2016	
<i>Leptopogon rufipectus</i> (Lafresnaye, 1846)	1600-2700	R, CE	NE, LC	20, 45	2016	
<i>Myiotriccus ornatus</i> (Lafresnaye, 1853)	400-2300	R	NE, LC	4, 20, 45	2016	
<i>Lophotriccus pileatus</i> (Tschudi, 1844)	300-2300	R	NE, LC	7, 10, 16, 20, 21, 24, 30, 46	2016	
<i>Hemitriccus granadensis</i> (Hartlaub, 1843)	1500-3100	R	NE, LC	20, 25, 29, 30, 45	2016	
<i>Poecilotriccus ruficeps</i> (Kaup, 1852)	1600-2700	R	NE, LC	46	2007	
<i>Poecilotriccus sylvia</i> (Desmarest, 1806)	0-1100	R	NE, LC	5, 8, 20, 37, 39, 44	2016	
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	0-1900	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	0-1800	R	NE, LC	1, 4, 5, 8, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 48	2016	Se confunde por <i>T. assimilis</i> .
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	900-2162	R	NE, LC	1, 12, 20, 22, 29, 30, 41, 42, 45, 46	2016	Podría estar amenazada.

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tyrannidae</b>						
<i>Myiophobus flavicans</i> (Sclater, 1860)	1500-2700	R	NE, LC	3, 10, 12, 20, 25, 26, 37, 39, 42, 43, 46	2016	
<i>Myiophobus phoenicomitra</i> (Taczanowski & Berlepsch, 1885)	0-1100	R	NE, LC	41	2001*	Especie poco conocida. Pasa desapercibida por confusión con <i>M. flavicans</i>
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Müller, 1776)	600-2600	R	NE, LC	1, 4, 9, 10, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 33, 37, 38, 39, 42, 45	2016	
<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863	0-1400	R	NE, LC	3	2001	
<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	600-3100	R	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Nephelomyias pulcher</i> (Sclater, 1860)	800-2600	R, CE	NE, LC	3, 20	2012	
<i>Empidonax virescens</i> (Vieillot, 1818)	0-2700	Mla	NE, LC	1, 3, 8, 10, 11, 20, 23, 29, 37, 38, 41, 45	2016	
<i>Empidonax traillii</i> (Audubon, 1828)	0-2600	Mla	NE, LC	20, 22	2016	
<i>Empidonax alnorum</i> Brewster, 1895		Mla	NE, LC	20	2012	
<i>Contopus cooperi</i> (Swainson, 1832)	0-3300	Mla	NT, NT	1, 17, 20, 22, 29, 30, 37	2016	Podría estar amenazada.
<i>Contopus fumigatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	300-3000	R	NE, LC	1, 4, 10, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 41, 46	2016	
<i>Contopus sordidulus</i> Sclater, 1859	0-2600	Mla	NE, LC	5, 20, 29	2016	
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	0-1700	Mla	NE, LC	3, 5, 8, 11, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 45	2016	
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	0-1000	R	NE, LC	20	2016	
<i>Sayornis nigricans</i> (Swainson, 1827)	100-2800	R	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 37, 39, 44, 45, 48	2016	
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	0-2600	R, Mla	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48	2016	
<i>Knipolegus poecilurus</i> (Sclater, 1862)	1600-3100	R	NE, LC	1, 20, 22, 25, 29, 30	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tyrannidae</b>						
<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	0-1000	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 45	2016	
<i>Ochthoeca frontalis</i> (Lafresnaye, 1847)	2300-3600	R	NE, LC	17, 45	1978	
<i>Ochthoeca diadema</i> (Hartlaub, 1843)	1700-3100	R	NE, LC	19, 20, 45	2016	
<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i> (Lafresnaye, 1843)	900-3000	R	NE, LC	1, 20, 24, 45	2016	
<i>Ochthoeca rufipectoralis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	2000-3100	R	NE, LC	18, 20, 45, 46	2015	
<i>Ochthoeca fumicolor</i> Sclater, 1856	2500-3600	R	NE, LC	17, 45	1978	
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	0-985	R	NE, LC	4, 5, 8, 20, 23, 24, 34, 35, 37, 38, 48	2016	Expansión de distribución en el VGRC.
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	0-1700	R	NE, LC	3, 5, 8, 10, 20, 32, 37, 40, 42, 45, 48	2016	
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	0-2100	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48	2016	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	0-1500	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48	2016	
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i> (Tschudi, 1844)	400-2400	R	NE, LC	1, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Myiodynastes luteiventris</i> Sclater, 1859	400-2600	Mla	NE, LC	39, 42, 45	2005	
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	0-1500	R, Mla	NE, LC	4, 5, 8, 9, 20, 23, 37, 48	2016	
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	985-2162	Mal, Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	0-2600	R, Mla	NE, LC	3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 48	2016	
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)	0-2600	Mla	NE, LC	3, 5, 8, 20, 23, 31, 33, 37, 38, 40	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tyrannidae</b>						
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	0-2400	R	NE, LC	1, 5, 8, 10, 11, 17, 20, 22, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48	2016	
<i>Myiarchus apicalis</i> Sclater & Salvin, 1881	400-2300	R, E	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45	2016	
<i>Myiarchus cephalotes</i> Taczanowski, 1879	1500-2700	R	NE, LC	9, 20	2016	
<i>Myiarchus crinitus</i> (Linnaeus, 1758)	0-1100	Mla	NE, LC	8, 11, 20, 48	2016	
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Müller, 1776)	0-1000	R	NE, LC	20, 48	2014	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	0-2162	R	NE, LC	4, 20, 25, 29, 30, 36, 41	2016	
<b>Cotingidae</b>						
<i>Pipreola riefferii</i> (Boissonneau, 1840)	1500-2700	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Pipreola arcuata</i> (Lafresnaye, 1843)	1500-3100	R	NE, LC	18, 20	2016	Poco conocida.
<i>Ampelioides tschudii</i> (Gray, 1846)	650-2700	R	NE, LC	7, 10, 18, 20, 25	2016	
<i>Ampelion rubrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	2200-3700	R	NE, LC	1, 17, 20, 22, 45	1995	
<i>Ampelion rufaxilla</i> (Tschudi, 1844)	1900-2700	R	VU, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22	2016	
<i>Rupicola peruvianus</i> (Latham, 1790)	500-2400	R	S1-S1S2, LC, LC	1, 4, 5, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 41, 45, 46	2016	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	1600-2900	R	VU, LC	1, 10, 17, 20, 22, 24, 46	2016	
<b>Pipridae</b>						
<i>Chloropipo flavicapilla</i> (Sclater, 1852)	1200-1400	R, CE	S1-S1S2, VU, VU	1, 10, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 41, 45	2016	
<i>Masius chrysopterus</i> (Lafresnaye, 1843)	1200-2300	R	NE, LC	10, 20, 24, 25, 29, 30, 36	2016	
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	0-1200	R	NE, LC	3, 4, 5, 20, 37, 39, 41, 42, 45	2016	Presencia de ssp. <i>vitellinus</i> .
<i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819)	0-1500	R	NE, LC	5, 20, 26, 37, 39, 42	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Tityridae</b>						
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	0-1700	R	NE, LC	20	2015	
<i>Pachyramphus versicolor</i> (Hartlaub, 1843)	1600-2600	R	NE, LC	1, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Pachyramphus rufus</i> (Boddaert, 1783)	0-1500	R	NE, LC	3, 8, 20, 21, 23, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 45	2016	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	0-2700	R	NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 45	2016	
<b>Vireonidae</b>						
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	0-1800	R	NE, LC	11, 17, 20, 45	2016	
<i>Cyclarhis nigristrotris</i> Lafresnaye, 1842	1600-2700	R, CE	NE, LC	1, 4, 5, 10, 11, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36	2016	
<i>Pachysylvia semibrunnea</i> (Lafresnaye, 1845)	1000-2162	R, CE	NE, LC	1, 10, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 44, 45	2016	
<i>Vireo flavifrons</i> Vieillot, 1808	900-1600	Mla	NE, LC	20, 29	2014	Podría estar amenazada.
<i>Vireo philadelphicus</i> (Cassin, 1851)		Mla	NE, LC	37, 39, 41	2011	
<i>Vireo leucophrys</i> (Lafresnaye, 1844)	1400-2800	R	NE, LC	1, 3, 5, 10, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37, 39, 41, 45	2016	
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	0-3600	R, Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48	2016	
<i>Vireo flavoviridis</i> (Cassin, 1851)	0-3600	Mla	NE, LC	20, 41	2016	Residente en el Valle del Cauca. Requiere extensión del rango de distribución.
<b>Corvidae</b>						
<i>Cyanocorax affinis</i> Pelzeln, 1856	0-2200	R, CE	NE, LC	6, 20	2015	
<i>Cyanocorax yncas</i> (Boddaert, 1783)	900-3000	R	NE, LC	3, 7, 11, 20, 22, 24, 28, 36, 46	2016	
<b>Hirundinidae</b>						
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	0-3000	R, Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Orochelidon murina</i> (Cassin, 1853)	2100-3500	R	NE, LC	5, 19, 20, 32, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Hirundinidae</b>						
<i>Orochelidon flavipes</i> (Chapman, 1922)		R	NE, LC	45	1973	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	0-3600	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46	2016	
<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	0-3000	R, Mla	NE, LC	4, 20	2016	Residente en Valle del Cauca. Posibles movimientos migratorios hacia Cali.
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	0-1200	R	NE, LC	3, 8, 10, 20, 33, 35, 37, 40, 41, 45	2016	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	0-3000	Mla	NE, LC	7, 10, 20	2016	Pasa desapercibida.
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	0-2800	Mla	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 27, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 48	2016	
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> Vieillot, 1817	0-3000	Mla	NE, LC	7, 20	2016	Pasa desapercibida por confusión con <i>Hirundo rustica</i> .
<b>Troglodytidae</b>						
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	0-1200	R	NE, LC	20	1985	
<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	0-3400	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Troglodytes solstitialis</i> Sclater, 1859	1500-3600	R	NE, LC	20, 25, 30, 45, 46	2016	
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	1400-4000	R	NE, LC	17	1978	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PNN Farallones de Cali, Alto del Buey).
<i>Pheugopedius mystacalis</i> (Sclater, 1860)	1000-2800	R, CE	NE, LC	1, 5, 7, 10, 11, 17, 20, 22, 29, 30	2016	
<i>Cinnycerthia unirufa</i> (Lafresnaye, 1840)	2200-3800	R, CE	NE, LC	20	2016	
<i>Cinnycerthia olivascens</i> Sharpe, 1881	900-3100	R, CE	NE, LC	5, 20	2016	
<i>Hemicorhina leucosticta</i> (Cabanis, 1847)	0-2015	R	NE, LC	1, 7, 17, 20, 22, 41	2016	
<i>Hemicorhina leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	600-3600	R	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Troglodytidae</b>						
<i>Cyphorhinus thoracicus</i> Tschudi, 1844	700-2600	R	LC, LC	1, 4, 5, 7, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<b>Poliopitilidae</b>						
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	0-2162	R	NE, LC	20, 29, 30	2016	
<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	0-1600	R	NE, LC	3, 20, 23	2016	Podría estar amenazada en el VGRC.
<b>Cinclidae</b>						
<i>Cinclus leucocephalus</i> Tschudi, 1844	100-3900	R	NE, LC	1, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 44, 45, 46	2016	
<b>Turdidae</b>						
<i>Myadestes ralloides</i> (d'Orbigny, 1840)	1200-2700	R	NE, LC	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Catharus aurantiirostris</i> (Hartlaub, 1850)	600-2200	R	NE, LC	1, 6, 11, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 44, 45	2016	
<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	0-2600	Mla	NE, LC	20	2009	
<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	0-2700	Mla	NE, LC	1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2016	
<i>Entomodestes coracinus</i> (Berlepsch, 1897)	400-2015	R, CE	S2-S2S3, NE, LC	1, 7, 17, 20, 22	2016	
<i>Turdus leucops</i> (Taczanowski, 1877)	1300-2015	R	NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 25, 45	2016	Posible migratoria longitudinal.
<i>Turdus obsoletus</i> Lawrence, 1862	0-1900	Mal, CE	NE, LC	10, 17, 20, 21, 22, 29, 42, 44, 45	2016	Podría estar amenazada.
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1857	0-2800	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Turdus fuscater</i> Lafresnaye & d'Orbigny, 1837	1400-4100	R	NE, LC	7, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 36, 45, 46	2016	
<i>Turdus serranus</i> Tschudi, 1844	1400-2800	R	NE, LC	1, 4, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Mimidae</b>						
<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1808)	0-2600	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 8, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 40	2016	
<b>Thraupidae</b>						
<i>Paroaria nigrogenis</i> (Lafresnaye, 1846)	0-500	R	NE, LC	3, 8, 20, 33, 35, 37, 38, 40	2011	Introducida. Sin registros antes del 2000.
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	0-1700	R	NE, LC	20, 28, 42	2016	
<i>Creurgops verticalis</i> Sclater, 1858	1600-2700	R	VU, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 45	2016	
<i>Hemispingus atropileus</i> (Lafresnaye, 1842)	1800-3600	R	NE, LC	20, 45	2016	
<i>Hemispingus superciliaris</i> (Lafresnaye, 1840)	2100-3300	R	NE, LC	7, 20, 30	2016	
<i>Hemispingus frontalis</i> (Tschudi, 1844)	1500-2700	R	NE, LC	7, 20, 45	2016	
<i>Cnemoscopus rubrirostris</i> (Lafresnaye, 1840)	2000-3300	R	NE, LC	20	2016	Registros adicionales en el páramo del Duende.
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	0-2200	R	NE, LC	6, 20	2016	
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	0-2700	R	NE, LC	4, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Ramphocelus dimidiatus</i> Lafresnaye, 1837	0-1500	R, CE	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45	2016	
<i>Ramphocelus flammigerus</i> (Jardine & Selby, 1833)	800-2015	R	NE, LC	1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Bangsia edwardsi</i> (Elliot, 1865)	400-2100	R, CE	NT, LC	19	1979	
<i>Buthraupis montana</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	2200-3300	R	NE, LC	20	2016	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PNN Farallones de Cali, Alto del Buey). Registros adicionales en el páramo del Duende.
<i>Chlorornis riefferii</i> (Boissonneau, 1840)	1700-3300	R	NE, LC	18, 20, 45	2016	
<i>Anisognathus lacrymosus</i> (du Bus de Gisignies, 1846)	2000-3800	R	NE, LC	7, 20, 45	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Thraupidae</b>						
<i>Anisognathus somptuosus</i> (Lesson, 1831)	1200-3300	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Dubusia taeniata</i> (Boissonneau, 1840)	2400-3600	R	NE, LC	49	2016	Registro fotográfico por Danny Leandro Mora en 2016 (PNN Farallones de Cali, Alto del Buey). Registros adicionales en páramo del Duende.
<i>Iridosornis porphyrocephalus</i> (Sclater, 1856)	1500-2700	R, CE	S1-S1S2, LC, NT	10, 20, 25, 46	2016	
<i>Iridosornis rufivertex</i> (Lafresnaye, 1842)	2300-3800	R	NE, LC	17, 18, 19, 20, 45, 46	2016	
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	1400-3000	R	NE, LC	1, 7, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41	2016	
<i>Chlorochrysa nitidissima</i> Sclater, 1873	1400-2162	R, E	S1-S1S2, VU, VU	1, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41	2016	
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	0-2600	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Thraupis cyanocephala</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	1400-3000	R	NE, LC	1, 5, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 36, 45, 46	2016	
<i>Tangara ruficervix</i> (Prévost & des Murs, 1846)	1500-2400	R	NE, LC	1, 4, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Tangara heinei</i> (Cabanis, 1850)	700-2700	R	NE, LC	1, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Tangara vitriolina</i> (Cabanis, 1850)	500-3000	R, CE	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Tangara larvata</i> (du Bus de Gisignies, 1846)	0-1800	Mal	NE, LC	16, 20	2016	
<i>Tangara cyanicollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	0-2015	R	NE, LC	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Thraupidae</b>						
<i>Tangara rufigula</i> (Bonaparte, 1851)	400-2100	R, CE	NE, LC	16, 20, 22	2016	Individuos errantes.
<i>Tangara vassorii</i> (Boissonneau, 1840)	1900-3400	R	NE, LC	1, 7, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 30, 33, 45, 46	2016	
<i>Tangara nigroviridis</i> (Lafresnaye, 1843)	900-3000	R	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Tangara labradorides</i> (Boissonneau, 1840)	500-2400	R, CE	NE, LC	1, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46, 47	2016	
<i>Tangara gyrola</i> (Linnaeus, 1758)	0-2162	R	NE, LC	1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Tangara xanthocephala</i> (Tschudi, 1844)	1300-3100	R	NE, LC	1, 4, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Tangara parzudakii</i> (Lafresnaye, 1843)	700-2500	R	NE, LC	20	2016	
<i>Tangara arthus</i> Lesson, 1832	700-2500	R	NE, LC	1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 39, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Tangara icterocephala</i> (Bonaparte, 1851)	400-2100	R	NE, LC	20	2016	
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	50-2100	R	NE, LC	4, 5, 10, 18, 20, 23, 37, 39, 42	2016	
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	0-2300	R	NE, LC	1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	100-2000	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 48	2016	
<i>Conirostrum sitticolor</i> Lafresnaye, 1840	2600-3700	R	NE, LC	20	2015	
<i>Conirostrum albifrons</i> Lafresnaye, 1842	1800-3000	R	NE, LC	12, 46	2011	Presencia de spp. <i>atrocyaneum</i> .
<i>Diglossa lafresnayii</i> (Boissonneau, 1840)	2000-2700	R	NE, LC	20, 45	2015	
<i>Diglossa humeralis</i> (Fraser, 1840)	2200-4000	R	NE, LC	1, 16, 17, 19, 20, 22	2016	
<i>Diglossa albilatera</i> Lafresnaye, 1843	1600-3100	R	NE, LC	1, 7, 10, 17, 20, 22, 24, 25, 30, 36, 45, 46	2016	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Thraupidae</b>						
<i>Diglossa sittoides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	1700-2800	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 45, 46	2016	
<i>Diglossa caerulea</i> Sclater, 1856	1700-3100	R	NE, LC	20	2016	
<i>Diglossa cyanea</i> (Lafresnaye, 1840)	1800-3600	R	NE, LC	1, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 36, 45, 46	2016	
<i>Catamblyrhynchus diadema</i> Lafresnaye, 1842	2100-3300	R	NE, LC	18	1979	
<i>Phrygilus unicolor</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)	2700-4500	R	NE, LC	20	2016	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Haplopiza rustica</i> (Tschudi, 1844)	1200-2500	R	NE, LC	18, 20, 42, 45	2016	
<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	50-3300	R	NE, LC	3, 8, 10, 20, 31, 37, 39, 40, 43	2015	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	0-2015	R	NE, LC	3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48	2016	
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	0-1800	R	NE, LC	8, 20, 45	2016	Podría estar amenazada en el VGRC.
<i>Saltator atripennis</i> Sclater, 1856	400-2200	R, CE	NE, LC	1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 45, 46, 47	2016	
<i>Saltator striatipectus</i> Lafresnaye, 1847	0-2700	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	0-2200	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46	2016	
<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	0-2300	R	NE, LC	3, 6, 8, 10, 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	2016	
<i>Sporophila funerea</i> Sclater, 1859		R	NE, LC	20, 32, 35, 41	2016	
<i>Sporophila crassirostris</i> (Gmelin, 1789)	0-1000	R	NE, LC	3, 4, 5, 9, 20, 37, 39, 42	2016	
<i>Sporophila intermedia</i> Cabanis, 1851	0-2300	R	NE, LC	1, 3, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Thraupidae</b>						
<i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843)	100-3200	R	NE, LC	3, 5, 20, 24	2016	
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	0-2300	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48	2016	
<i>Sporophila schistacea</i> Lawrence, 1862	0-2200	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 24, 31, 32, 37, 39, 40, 42, 48	2016	
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	0-2015	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48	2016	
<i>Tiaris olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	300-2300	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46	2016	
<i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	0-2100	R	NE, LC	20, 42, 45	2016	Pasa desapercibida.
<b>Emberizidae</b>						
<i>Oreothraupis arremonops</i> (Scater, 1855)	1700-2500	R, CE	S1-S1S2, LC, VU	18, 20	2014	Poco conocida.
<i>Chlorospingus flavigularis</i> (Scater, 1852)	300-1400	R	NE, LC	20	2016	
<i>Chlorospingus canigularis</i> (Lafresnaye, 1848)	1200-2600	R	NE, LC	1, 4, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Chlorospingus semifuscus</i> Scater & Salvin, 1873	900-2400	R, CE	NE, LC	20, 25	2016	
<i>Ammodramus savannarum</i> (Gmelin, 1789)	1000-1000	R	SX, EN, LC	10, 20	2015	Amenazada en el VGRC. ssp. <i>caucaae</i> descrita por Chapman (1911) para el municipio de Cali.
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	0-1000	R	NE, LC	10, 20	2014	
<i>Arremon assimilis</i> (Boissonneau, 1840)	1700-3100	R	NE, LC	19, 20, 45, 46	2016	
<i>Arremon brunneinucha</i> (Lafresnaye, 1839)	800-3000	R	NE, LC	1, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46, 47	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Emberizidae</b>						
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	1000-3700	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Atlapetes albinucha</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1838)	1500-2200	R	NE, LC	1, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46, 47	2016	
<i>Atlapetes schistaceus</i> (Boissonneau, 1840)	1900-3700	R	NE, LC	7, 19, 20, 45, 46	2016	
<i>Atlapetes latinuchus</i> (du Bus de Gisignies, 1855)	1600-3700	R	NE, LC	7, 18, 19, 20, 24, 30, 36	2016	
<b>Cardinalidae</b>						
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	200-2200	Mal	NE, LC	1, 3, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48	2016	
<i>Piranga rubra</i> (Linnaeus, 1758)	0-2700	Mla	NE, LC	1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48	2016	
<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, 1789)	0-3000	Mla	NE, LC	8, 20, 26, 37	2016	
<i>Piranga rubriceps</i> Gray, 1844	1700-3000	R, EI	NE, LC	20	2016	Especie muy local. Poco conocida.
<i>Habia cristata</i> (Lawrence, 1875)	700-2015	R, E	NE, LC	1, 4, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 32, 44, 45, 46	2016	
<i>Pheucticus ludovicianus</i> (Linnaeus, 1766)	0-3800	Mla	NE, LC	1, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 45	2016	
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	300-1600	R	NE, LC	3, 8, 12, 32, 37, 38, 39, 40	2011	
<i>Passerina cyanea</i> (Linnaeus, 1766)		Mla	NE, LC	20	2015	Requiere extensión del rango de distribución.
<i>Spiza americana</i> (Gmelin, 1789)	0-1000	Mla	NE, LC	20	2005	Requiere extensión del rango de distribución.
<b>Parulidae</b>						
<i>Parkesia noveboracensis</i> (Gmelin, 1789)	0-3000	Mla	NE, LC	3, 4, 8, 11, 20, 23, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 48	2016	
<i>Vermivora chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	1000-2700	Mla	LC, NT	1, 7, 17, 20, 22, 24, 25	2016	
<i>Mniotilta varia</i> (Linnaeus, 1766)	0-2162	Mla	NE, LC	1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Parulidae</b>						
<i>Protonotaria citrea</i> (Boddaert, 1783)	0-1000	R, Mla	NE, LC	3, 8, 20, 23, 31, 32, 37, 39, 40, 48	2016	
<i>Leiothlypis peregrina</i> (Wilson, 1811)	0-2600	Mla	NE, LC	3, 20, 23, 25	2015	
<i>Oporornis agilis</i> (Wilson, 1812)	0-4200	Mla	NE, LC	20	2016	
<i>Geothlypis philadelphia</i> (Wilson, 1810)	0-3000	Mla	NE, LC	1, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45	2016	
<i>Geothlypis semiflava</i> Sclater, 1861	0-1800	R	NE, LC	8, 10, 20, 35, 37, 39, 40, 45	2011	
<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	0-2800	Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 29, 32, 37, 38, 39, 41, 42	2016	
<i>Setophaga cerulea</i> (Wilson, 1810)	500-2000	Mla	VU, VU	20, 25, 42	2016	
<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	0-2600	Mal	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2016	
<i>Setophaga castanea</i> (Wilson, 1810)	0-1200	Mla	NE, LC	8, 16, 17, 20, 23, 39, 40, 41	2016	
<i>Setophaga fusca</i> (Müller, 1776)	0-3600	Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	2016	
<i>Setophaga petechia</i> (Linnaeus, 1766)	0-2015	R, Mla	NE, LC	1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 23, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48	2016	
<i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)	0-2600	Mla	NE, LC	20, 23, 37, 39	2016	
<i>Myiothlypis luteoviridis</i> (Bonaparte, 1845)	1700-3400	R	NE, LC	1, 17, 20, 22	2016	ssp. <i>richardsoni</i> , muy local (del Hoyo et al. 2017).
<i>Myiothlypis fulvicauda</i> (Spix, 1825)	0-2015	R	NE, LC	1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45	2016	
<i>Myiothlypis coronata</i> (Tschudi, 1844)	1400-3100	R	NE, LC	1, 7, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	300-2015	R	NE, LC	4, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 37, 39, 42, 44, 45, 47	2016	
<i>Basileuterus tristriatus</i> (Tschudi, 1844)	300-2500	R	NE, LC	1, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	

Cont. **Anexo 2.** Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Parulidae</b>						
<i>Cardellina canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	Mla	NE, LC	1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 48	2016	
<i>Cardellina pusilla</i> (Wilson, 1811)		Mla	NE, LC	17, 20, 22	2016	
<i>Myioborus miniatus</i> (Swainson, 1827)	500-2700	R	NE, LC	1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Myioborus ornatus</i> (Boissonneau, 1840)	1800-3400	R, CE	NE, LC	18, 20, 41, 46	2016	
<b>Icteridae</b>						
<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, 1824)	400-2400	R	NE, LC	1, 5, 7, 10, 17, 20, 22, 45	2016	
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	0-2600	R	NE, LC	20, 41	2016	Extirpado en el VGRC (del Hoyo <i>et al.</i> 2017). Lehman reporta nidos parasitados por <i>Molothrus oryzivorus</i> (1960).
<i>Cacicus uropygialis</i> Lafresnaye, 1843	700-2300	R	S1-S1S2, DD, LC	3, 20, 32	2011	
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	0-985	R	NE, LC	3, 5, 8, 20, 23, 26, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 48	2016	
<i>Cacicus chrysonotus</i> Lafresnaye & d'Orbigny, 1838	1700-3200	R	NE, LC	20	2016	
<i>Icterus spurius</i> (Linnaeus, 1766)	0-1000	Mla	NE, LC	20, 38, 41	2005	
<i>Icterus chrysater</i> (Lesson, 1844)	50-2700	R	NE, LC	1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 40, 41, 44, 45, 46, 47	2016	
<i>Icterus galbula</i> (Linnaeus, 1758)	0-1600	Mla	NE, LC	20, 35, 37, 38, 42	2016	
<i>Icterus nigrogularis</i> (Hahn, 1819)	0-985	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 14, 20, 23, 26, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 48	2016	
<i>Gymnomystax mexicanus</i> (Linnaeus, 1766)	0-985	R	NE, LC	20, 23	2015	Expansión de distribución en el VGRC a partir de los 90 (Cárdenas 1998).
<i>Chrysomus icterocephalus</i> (Linnaeus, 1766)	0-2600	R	NE, LC	4, 5, 10, 15, 20, 38, 41, 45	2016	
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	0-2200	R	NE, LC	8, 12, 20, 23, 24, 32, 37, 40, 41	2016	

Cont. Anexo 2. Listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Elevación	Categoría de Residencia	Categoría de Amenaza	Referencias	Último año de registro*	Observaciones
<b>Passeriformes</b>						
<b>Icteridae</b>						
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	0-2000	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1771)	0-1600	R	NE, LC	8, 20, 31, 37, 38, 41, 45	2016	Expansión de la distribución en el VGRC a mediados del siglo XX (Lehman 1957).
<b>Fringillidae</b>						
<i>Spinus spinescens</i> (Bonaparte, 1851)	1800-3700	R, CE	NE, LC	1, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 46	2016	
<i>Spinus xanthogastrus</i> (du Bus de Gisignies, 1855)	1000-3000	R	NE, LC	7, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 41, 45	2016	
<i>Spinus psaltria</i> (Say, 1823)	200-3100	R	NE, LC	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48	2016	
<i>Euphonia saturata</i> (Cabanis, 1860)	700-1300	R	NE, LC	10, 20, 38, 45	2016	
<i>Euphonia lanirostris</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	0-1800	R	NE, LC	3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48	2016	
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	1400-2600	R	NE, LC	1, 5, 7, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 36, 41, 44, 45, 46	2016	
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	0-2600	R	NE, LC	4, 5, 8, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 41, 45	2016	
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	600-2100	R	NE, LC	1, 5, 7, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 41, 45, 46	2016	
<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i> (Sclater, 1851)	1400-3600	R	NE, LC	1, 7, 17, 20, 22, 25, 29, 30	2016	
<i>Chlorophonia flavirostris</i> Sclater, 1861	1100-2015	R, CE	NE, LC	5, 7, 20	2016	
<b>Estrildidae</b>						
<i>Lonchura malacca</i> (Linnaeus, 1766)		In	NE, LC	20, 45	2016	Especie introducida por comercio de aves de jaula.
<b>*corresponde al año de publicación y no de muestreo</b>						

**Anexo 3.** Especies de aves potenciales y excluidas del listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Clasificación	Observación de Exclusión	Elevación	Referencias
<b>Anseriformes</b>				
<b>Anatidae</b>				
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Excluida	Doméstico.		8, 23, 37
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	Excluida	Doméstico.	0-500	37
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	Excluida	Doméstico.		27
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Excluida	Doméstico.		8, 23, 27, 33, 37
<b>Galliformes</b>				
<b>Cracidae</b>				
<i>Aburria aburri</i> (Lesson, 1828)	Excluida	Registro dudoso y necesita confirmación. VC: C. Central. No VGRC.	600-2500	16
<b>Odontophoridae</b>				
<i>Rhynchortyx cinctus</i> (Salvin, 1876)	Excluida	Confusión con <i>Odontophorus hyperythrus</i> o <i>Colinus cristatus</i> .	0-1000	16
<b>Columbiformes</b>				
<b>Columbidae</b>				
<i>Claravis mondetoura</i> (Bonaparte, 1856)	Excluida	Confusión con hembra de <i>C. pretiosa</i> .	2000-2600	16
<b>Caprimulgiformes</b>				
<b>Caprimulgidae</b>				
<i>Setopagis parvula</i> (Gould, 1837)	Excluida	Error de identificación. La distribución no incluye a Colombia.		45
<b>Apodiformes</b>				
<b>Trochilidae</b>				
<i>Threnetes ruckeri</i> (Bourcier, 1847)	Excluida	No corresponden la distribución y altitud. Localidad El Engano-Dagua. atl. max. 1750. (Riascos-Vallejo 2001).	0-1050	41
<i>Aglaiocercus coelestis</i> (Gould, 1861)	Potencial	Confusión con <i>A. kingii</i> (juvenil).	300-2100	20
<i>Lesbia nuna</i> Lesson, 1832	Excluida	Confusión con <i>A. kingii</i> .	2200-2800	18
<i>Eriocnemis godini</i> (Bourcier, 1851)	Excluida	Por distribución y confusión con <i>E. vestita</i> .	2100-2300	19
<i>Urosticte benjamini</i> (Bourcier, 1851)	Excluida	Error de Identificación.	700-1500	19
<i>Heliodoxa imperatrix</i> (Gould, 1856)	Potencial		400-1800	20
<i>Chlorostilbon russatus</i> (Salvin & Godman, 1881)	Excluida	Error de identificación y por distribución.	600-2600	17
<i>Chalybura urochrysis</i> Gould, 1861	Excluida	Confusión con <i>C. buffoni</i> .	0-900	3

Cont. **Anexo 3.** Especies de aves potenciales y excluidas del listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Clasificación	Observación de Exclusión	Elevación	Referencias
<b>Gruiformes</b>				
<b>Rallidae</b>				
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	Excluida	Por distribución y Confusión con <i>L. albigularis</i> .	0-500	35
<i>Mustelirallus erythroptus</i> (Sclater, 1867)	Excluida	Confusión con <i>M. colombianus</i> y por distribución.	2500-2600	17, 22, 45
<b>Charadriiformes</b>				
<b>Scolopacidae</b>				
<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857)	Excluida	Costero. Confusión con <i>C. fuscicollis</i> , <i>C. minutilla</i> , <i>C. bairdi</i> (Y. Cifuentes-Sarmiento com. pers.).		38
<b>Laridae</b>				
<i>Leucophaeus atricilla</i> Linnaeus, 1758	Potencial	Registros fuera de Cali en VC.	0-3100	38
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	Potencial	Registros fuera de Cali en VC.	0-500	38
<b>Pelecaniformes</b>				
<b>Ardeidae</b>				
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	Potencial	Por distribución.	120-1800	20
<i>Egretta tricolor</i> (Müller, 1776)	Potencial		0-1000	38
<b>Accipitriformes</b>				
<b>Accipitridae</b>				
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Excluida	VGRC: mapa IUCN (2016) medio Hilty y Brown (2001). Extinto para el VGRC (Álvarez-López y Kattan 1995).	300-1000	2
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	Potencial	Por distribución.	0-2000	20
<i>Parabuteo leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Potencial		1700-2900	20
<b>Piciformes</b>				
<b>Picidae</b>				
<i>Picumnus olivaceus</i> Lafresnaye, 1845	Potencial	Confirmar presencia. Posible por distribución o confusión con <i>P. granadensis</i> .	0-2500	17, 22
<i>Veniliornis kirkii</i> (Malherbe, 1845)	Potencial	Confirmar presencia.	0-1300	32
<i>Campephilus haematogaster</i> (Tschudi, 1844)	Excluida	Por distribución.	0-1100	39
<b>Psittaciformes</b>				
<b>Psittacidae</b>				
<i>Amazona farinosa</i> Boddaert, 1783	Excluida	Fuga, por confirmar si está establecida.	0-1100	37
<i>Cacatua galerita</i> (Latham, 1790)	Excluida	Fuga.		8

Cont. Anexo 3. Especies de aves potenciales y excluidas del listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Clasificación	Observación de Exclusión	Elevación	Referencias
<b>Passeriformes</b>				
<b>Thamnophilidae</b>				
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	Excluida	No en distribución conocida o esperada. Colección UV. alt. max. 2100.	0-500	45
<i>Epinecrophylla fulviventris</i> (Lawrence, 1862)	Excluida	Por distribución.	0-2000	41
<b>Furnariidae</b>				
<i>Anabacerthia variegaticeps</i> (Sclater, 1857)	Potencial	Confusión con <i>A. striaticollis</i> , de cordillera occidental. Confirmar presencia.	700-2000	20
<i>Thripadectes ignobilis</i> (Sclater & Salvin, 1879)	Potencial		200-2500	20
<i>Thripadectes holostictus</i> (Sclater & Salvin, 1876)	Potencial		1800-2700	20
<i>Asthenes fuliginosa</i> (Lafresnaye, 1843)	Potencial	Registrado en el páramo del Duende.	2300-3600	20
<b>Tyrannidae</b>				
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	Excluida	Confusión con otras especies de Elaenias.	0-1800	45
<i>Elaenia obscura</i> (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Excluida	La distribución de esta especie no incluye a Colombia.		22
<i>Conopias cinchoneti</i> (Tschudi, 1844)	Potencial		900-2100	20
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	Excluida	Error de identificación.	0-1400	24
<b>Pipridae</b>				
<i>Corapipo altera</i> Hellmayr, 1906	Excluida	Por distribución.	200-1500	10
<b>Tityridae</b>				
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	Excluida	Por distribución.	0-1400	17
<i>Pachyramphus cinnamomeus</i> Lawrence, 1861	Excluida	Por distribución. Confusión con hembras de <i>P. rufus</i> .	0-1300	3, 43
<b>Troglodytidae</b>				
<i>Pheugopedius spadix</i> Bangs, 1910	Potencial	Por distribución. Restringida al Pacífico.	800-1800	20
<b>Turdidae</b>				
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	Excluida	Error de identificación. No en VC, mapa IUCN (2016).	0-1600	24
<i>Turdus grayi</i> Bonaparte, 1838	Potencial	Por ampliación de su distribución, o confusión con <i>T. obsoletus</i> .	0-300	20
<b>Turdidae</b>				
<i>Turdus fulviventris</i> Sclater, 1857	Excluida	Por distribución.	1700-2300	41
<b>Thraupidae</b>				
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	Potencial	VC: C. Occidental, mapa IUCN (2016), Cali, Hilty y Brown (2001).	0-1700	20

Cont. **Anexo 3.** Especies de aves potenciales y excluidas del listado de aves del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Taxón	Clasificación	Observación de Exclusión	Elevación	Referencias
<b>Passeriformes</b>				
<b>Thraupidae</b>				
<i>Cnemathraupis eximia</i> (Boissonneau, 1840)	Potencial	Por ampliación de distribución.	2000-3800	20
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Excluida	Confusión con <i>T. vitriolina</i> posiblemente juvenil.	0-500	6
<i>Tangara xanthogastra</i> (Sclater, 1851)	Excluida	Por distribución.	0-600	41
<i>Tangara cyanotis</i> (Sclater, 1858)	Excluida	Confusión con <i>T. labradorides</i> . No en VC, mapa IUCN (2016).	1600-2200	44
<i>Tangara lavinia</i> (Cassin, 1858)	Excluida	Por distribución y confusión con <i>T. gyrola</i> .	0-1000	39
<i>Dacnis hartlaubi</i> (Sclater, 1855)	Potencial	Por distribución. Registrado en CO-Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco.	300-2200	20
<i>Saltator maximus</i> (Müller, 1776)	Potencial		0-1700	20
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	Potencial		0-1300	6
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	Excluida	VC: Pacífico.	0-1200	3
<i>Sporophila corvina</i> (Sclater, 1859)	Excluida	Por distribución. VC: Pacífico, costera.	0-1200	40, 41
<i>Catamenia homochroa</i> Sclater, 1858	Potencial		2800-3800	19
<b>Emberizidae</b>				
<i>Chlorospingus flavopectus</i> (Lafresnaye, 1840)	Excluida	Confusión con <i>C. canigularis</i> . VC: C. Central, mapa IUCN (2016), Hilty y Brown (2001).	1000-2700	7
<i>Atlapetes tricolor</i> (Taczanowski, 1874)	Excluida	Error de identificación.	800-2000	12
<i>Atlapetes pallidinucha</i> (Boissonneau, 1840)	Potencial	Registrado en el páramo del Duende.	2400-3600	20
<b>Cardinalidae</b>				
<i>Piranga leucoptera</i> Trudeau, 1839	Potencial		1500-2200	20
<i>Chlorothraupis olivacea</i> (Cassin, 1860)	Excluida	Error de localidad para Cali (2 individuos.).	0-1500	45
<i>Amaurospiza concolor</i> Cabanis, 1861	Excluida	Error de identificación y distribución.	1100-1200	44
<b>Icteridae</b>				
<i>Psarocolius wagleri</i> (Gray, 1845)	Excluida	Error de identificación por <i>P. angustifrons</i> .	0-1000	24
<i>Icterus icterus</i> (Linnaeus, 1766)	Excluida	Registro ocasional, posible fuga. Posible confusión con <i>I. galbula</i> .	0-700	37
<b>Estrildidae</b>				
<i>Lonchura oryzivora</i> (Linnaeus, 1758)	Excluida	Introducida, con duda de establecimiento. Parque Capri, sur de Cali. (G. Cárdenas obs. pers. mayo 2014).		8, 45